

পাস্ (Polipus) ; চক্ উহার কোটরে বেন ডুবিয়া থাকে এবং চক্ বেন নীলবর্ণ চক্ৰদ্বারা আবৃত হয় ।

কর্ণ । কানে কম শুনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে টনসিলের (Tonsils) ক্ষীতি, প্রধানতঃ পারার অপব্যবহারের পর (নাইটিক্-আস্) ।

নাসিকা । সর্দি এবং উহার দরুণ নাসারন্ধ্রে ক্ষত ; সর্দি এবং তদরূপ প্রথমতঃ নাকদিয়া একবল গাঢ় স্লেয়া ও তৎপর জলবৎ তরল স্লেয়া নির্গত হওয়া ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের হাড়ের প্রদাহ ; বাম গালে স্চী কিধানেক জায় আলায়ুক্ত ভীক্ বেদনা, বাহার দরুণ চুলকানির উদ্বেক হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । হস্তাহির নিম্নস্থিত গ্রন্থি বেদনাযুক্ত হয় এবং উহাতে কখন বেদনা থাকে, কখন বা বেদনা থাকে না ; দীর্ঘ কাল হয়, ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং উহা হইতে দাঁতের কুচা পড়ে (মার্ক্) ; দাঁতের উপর দিয়া আড়ে কাল রেখা পড়ে ; ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতে ছিঁড়িয়া ফেলার হার বেদনা, আহারের পর (ল্যাক্) এবং কোন দ্রব্য চিবাইলে বাহার বৃদ্ধি হয় (অণ্টি-ক্রুড্) ; ঠাণ্ডা কোন দ্রব্য পান করিলে দাঁতে বেদনা (অণ্টি-ক্রুড্, ক্যাল্-ক্-কার্ক্, কোকাস্, সাল্ফ্) ; বহির্বায়াতে দাঁতে বেদনা ; স্পর্শ করিলে দাঁতে বেদনা ; রাত্রি এবং প্রাতঃকালেই দাঁত অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় ; মুখের মধ্যে অনবরত লালের সঞ্চার ; মাড়ি ক্ষীত, ক্ষত-যুক্ত এবং তলতলে যাহা স্পর্শ করিলেও রক্ত পড়ে (কার্কো-বেজ্, মার্ক্, নাইটিক্-আস্, ফস্) ; মাড়িতে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ফুস্ফুড়ী এবং কঠিন ক্ষীতি । গলার মধ্য শুষ্ক এবং খশ্-খশে ও কথা বলিবার সময় বা গিলিবার সময় উহাতে টাটানি ; ক্ষীত হইলে বা প্ৰেঁতলিয়া গেলে যেরূপ হয়, হস্তাহির নিম্নস্থিত গ্রন্থিগুলি সেরূপ বেদনাযুক্ত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । পিপাসা শূন্যতা ; বারম্বার হিকা ; উদরে হুর্লগীবোণ, বাহার দরুণ মনে হয় যেন পেটে পিটে লাগিয়া বাইবে ; কুঁচকির গ্রন্থির ক্ষীতি এবং উহাতে বেদনা (ক্যাল্-ক্-কার্ক্, আয়োড্, নাইটিক্-আস্, রাস্টিজ্) ; সমুদয় উদরে কামড়ানি বা মোচড়াইয়া ধরার জায় বেদনা ; উদরে দূষিত বাস্কু বদ্ধ হইয়া থাকে ; শিশু বা ছোট বালক

বালিকাগণের উদর ক্ষীত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শূল বেদনার জ্বর বেদনা বর্তমান থাকে ।

মল এবং মলদ্বার । মলত্যাগের পর শুষ্কের মধ্যে চিড়িকমারী এবং আলায়ুক্ত টাটানি; বসিয়া থাকিলে শুষ্কভাবে চুলকানি; কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন এবং পরিমাণে অল্প; তরলভেদ এবং উহার সঙ্গে উদরে প্রচুর দূষিত বায়ুর সঞ্চার (আলোজ) ।

মূত্রযন্ত্র । বারবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে খুব সঙ্কটে মূত্র নির্গমন, অথবা ফোঁটাফোঁটা কাল্পে মূত্র নির্গমন (একন্, বেল, ক্যাহ্); মূত্রত্যাগের সময় এবং উহার পর মূত্রনালীতে আলা (আন্টি-টার্ট, ক্যাহ্, ক্যানাবিস্-স্কাট্, কোনারাম্); মূত্রত্যাগের পর মূত্র-ত্যাগের বারবার ইচ্ছা, বাহার দ্রুগ মনে হয় যেন মূত্রাধার একবারে খালি হয় নাই এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত মূত্র গড়াইয়া পড়া (একন্, কষ্ট্, ট্রায়মন্); প্রচুর পরিমাণে জলবৎ ফিকা মূত্র নিঃসরণ (নেট্রাম্-মিউর, কস্-আস্, সিকেল) ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের স্ত্রীসংবাসের ইচ্ছার বৃদ্ধি; মুখমণ্ডল বসিয়া বায়, সর্বদা লজ্জিত, রাত্রিতে স্বপ্নে অনিচ্ছাপূর্বক ধাতুনিঃসরণ, পৃষ্ঠে বেদনা, পায় দুর্বলবোধ এবং জননেন্দ্রিয় শিথিল ইত্যাদি হস্তমৈথুন মহা কু-অভ্যাসের কুফলের লক্ষণাদি; ধাতু নিঃসরণ এবং তৎপর অত্যন্ত বলক্ষয় (আগারিকাশ্, চায়না, ক্যালী-কার্ক, কস্-আস্); চলিয়া বেড়ানোর সময় বাম অণ্ডকোষে চাপিয়া ধরার জ্বর বেদনা, স্পর্শনে বাহার বৃদ্ধি হয়; পুরুষ-যন্ত্রের মাধার উপর এবং উহার পশ্চাৎভাগে কোমল, কলতানি বিশিষ্ট ফুস্ফুড়ী (নাইট্রিক্-আস্, থুজা); স্ত্রীসংবাসের পরই শ্বাসকষ্ট, জ্বীলোকের জননেন্দ্রিয়ে অত্যন্ত কষ্টদায়ক টাটানি, বসিয়া থাকিলেই বাহার বৃদ্ধি হয়; ঘোনিদ্বারের উপর দানায়ুক্ত ফুস্ফুড়ী ।

শ্বাসযন্ত্র । কাশি এবং গলা দিয়া হরিত্রাবর্ণের পুঁয় সম্বলিত শ্লেষ্মা নির্গমন, রাত্রিতেই বাহা সচরাচর অধিক হয় (সাইলিসি, লাইকোপ্); পাঞ্জরার হাড়ের উপস্থিতিতে স্ত্রীবিধানের জ্বর চুলকানি ।

হৃৎপিণ্ড । সামান্য নড়াচড়াতেই হৃৎস্পন্দন (মার্ক) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবা গলার মধ্য এবং বোঁগলের গ্রন্থির অত্যন্ত কষ্টদায়ক ক্ষীতি (মার্ক্, ক্যাল্-কার্ক্, আয়োড্); ভাদিলে বা থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে ঘেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎভাগে সেরূপ বেদনা, বিশ্রাণ কালীন, বসে অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে, শরীর খুঁচাইলে যাহার হৃদ্বি হয়; রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালেই বেদনা অতীব হয় (রডোড্, রাস্টেজ্) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । হাঁত পায়ে কনিয়া ধরা বা স্থচী বিধানের জ্বার বেদনা; আঙ্গুলে সন্ধিবাৎ জনিত গ্রন্থির জ্বার কঠিন ক্ষীতি; হাতের আঙ্গুলের হাড়ের প্রদাহ; বলিয়া থাকিলে কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনার উদ্রেক হয় ।

চর্ম্ম । শরীরের স্থানে স্থানে দাঁদের জ্বার ফুসুড়ী, চুলকাইলে যাহাতে জ্বালার উদ্রেক হয় (আল্, রাস্টেজ্); গায় হামের জ্বার পুণ্ড্রান আকারের ফুসুড়ী; গ্রন্থির অত্যন্ত কষ্টদায়ক ক্ষীতি (ক্যাল্-কার্ক্, আয়োড্) ।

নিদ্রা । সমুদয় দিনই যুগ্মের ইচ্ছা বা ঘুমের ভাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁহিতোলা; সমুদয় রাত্রিতেই ঘুম হয় না; সমুদয় শরীর কন্ কন্ করে; জ্বী বা পুরুষ সহবাস সম্বন্ধীয় নানা প্রকারের বিজ্রী স্বপ্ন দেখিয়া অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূৰ্ব্বক ধাতুনিঃসরণ ।

ব্যবহার । পারা (Mercury) বা থুজা (Thuja) নামক ঔষধের অপব্যবহার জনিত অস্থ্য; অতিরিক্ত জ্বী বা পুরুষ সহবাস বা হস্ত মৈথুন জনিত অস্থ্য; গ্রন্থি এবং গ্রন্থির অস্থ্য; গৌণ উপদংশ (Secondary Syphilis); পক্ষাঘাত; গায় দাঁদের জ্বার ফুসুড়ী (Herpes); বিকচ (Eczema); নাসা বা নাকড়া বা অস্ত্রাণ স্থানে উক্ত প্রকারের আব বা ক্ষীতি; জাঁচিল; সন্ধিবাৎ; গণ্ডমালা বা কাশি জনিত অস্থ্য; অঙ্গ দ্বারা কাটার দরুণ অস্থ্য; দন্তশূল; হিষ্টিরিয়া; আপন কোন বিষয়ে অনবরত অনর্থক চিন্তার দরুণ অস্থ্য; শুক্রক্ষরণ বা অনিচ্ছা পূৰ্ব্বক ধাতু নিঃসরণ; সমুদ্রপথে জাহাজাদিতে বেড়াইলে বমন বা বমনোদ্বেষ (Sea-sickness); গর্ভাবস্থার রমন; চক্ষু প্রদাহ; পুণ্ড্রান আকারের রঙ্গরোধ; গ্রন্থির আবরক কঠিন পর্দার প্রদাহ (Periostitis); অস্থিতে বেদনা বাহা এক

স্থান হইতে অল্প স্থানে সরিয়া পড়ে ইত্যাদি অন্তর্থে ঠাকিসেগ্রিরা ব্যবহার্য। ডাক্তার বেয়ারের (Dr. Bæhr) মতে চক্ষুর পাতার পুরাতন আকারের প্রদাহ এবং আঙ্গনীতে (Stye) এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। পুরাতন আকারের ক্ষুদ্রসন্ধিবাত (Chronic Gout), অস্থি পোকায় ধরা (Caries), দ্রাবু শূল, পুরাতন আকারের টনসিল্ প্রদাহ (Chronic Tonsillitis) এবং মূত্রনালীর পশ্চাত্তাগস্থিত প্রোষ্টেট গ্রন্থির প্রদাহ (Prostatitis) ইত্যাদি অন্তর্থেও ইহা উপকারী।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় শরীরের দুর্বলতা, প্রধানতঃ চলিবার সময়, হাঁটুর সন্ধিতেই বাহা অধিক অল্পত হয়; প্রাতঃকালে বিছানায় থাকিতে থাকিতে অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিজার ভাব; খেতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বা শক্তি না থাকিলে ঘেরূপ হয়, অল্প প্রত্যঙ্গে সেরূপ বেদনা (আর্দিকা, চার্না); আহ্বারের পর শ্রান্তিবোধ এবং নিজার ভাব, বাহার দরূণ রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়; অস্থি এবং অস্থির আবরক কঠিন পর্দার ক্ষীতি ও উহাতে বেদনা ও পূর্ব উৎপন্ন হওয়া (আসাকিটিডা, হিপ্-সাল্‌ফ্‌, ফস্-আস্); কোন প্রকার ধারাল অস্ত্রবরা কাটিয়া যাওয়ার দরূণ অস্থখ; খেঁতলিয়া গেলে ঘেরূপ হয়, চলিবার সময় সমুদয় শরীরে সেরূপ অল্পত হয়; মারিলে ঘেরূপ হয়, গায় সেরূপ বেদনা, বাহার দরূণ রোগী কমাচিত পা টানিয়া চলিতে পারে; রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে, রক্তপূর্বাদি নিঃসরণের পর, স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের পর, হস্তমৈষুনের পর এবং স্পর্শনে অস্থখের রুচি ইত্যাদি ঠাকিসেগ্রিয়ার কতক স্তলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। টেষ্টের (Teste) মতে ঠাকিসেগ্রিরা, কষ্টিকাম্, ককিয়া এবং ককিউলাসের এক শ্রেণীভুক্ত। ডাক্তার হিউজের (Dr. Hughes) মতে ক্রিয়াজেট্ এবং ডাক্তার হেরিংয়ের (Dr. Hering) মতে কলোসিড্, ঠাকিসেগ্রিয়ার এক শ্রেণীভুক্ত। এতত্তির ইহার কার্যের সঙ্গে আর্চু, ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা, চায়না, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াম্, ফফরিক্ আসিড্, পাল্‌সেটিলা, থুজা এবং সাল্‌ফারের কার্যেরও সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ কাম্ফার ।

ডাইলুশন বিচার । ৬ষ্ঠ, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন সচরাচর ব্যবহার্য ।

ষ্টিলিজিয়া সিল্‌ব্যাটিকা, - ষ্টিলিজ

(STILLINGIA SYLVATICA, - STILLING.)

আমেরিকাতে এই গাছের জন্ম । ইহার শিকড় যথানিয়মে প্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । অস্থির আবরক কঠিন পর্দা (Periosteum) এবং শরীরের আশাল অংশের উপর ইহার কার্য্য প্রবল, বাহার দরুণ শরীরের স্থানে স্থানে গ্রন্থির কঠিন স্ফীতি, হাড় বেদনা এবং বাতরোগের এমনত লক্ষণ গুলি প্রকাশ পায় যাহা গৌণ উপদংশ (Secondary Syphilis) এবং পুরাতন আকারের বাতরোগে বর্তমান থাকে । অতএব উক্ত দুই প্রকার অস্থিথেই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী । কঠিনালীর উপস্থিতি এবং ঋসবস্ত্রের মৈত্রিক বিম্বীও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়, বাহার দরুণ কঠিনালী এবং বায়ু উপনলের উত্তেজনা ও প্রদাহের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে । লিম্ফেটিক গ্রন্থিগুলি (Lymphatic glands) বর্দ্ধিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহার নিঃসরণের বৃদ্ধি হয় এবং উহা বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয় । চর্ম্ম বিকচের স্থায় (Eczematous) আকার প্রাপ্ত হয় ও উহাতে ক্ষত বা দা হয় এবং বা হইতে কল্‌তানি পড়ে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । . মানসিক অবসন্নতা এবং ভবিষ্যতে যে সকল অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, সর্বদা সে বিষয়ে চিন্তা ।

মস্তক । মাথার দীপ্পদপানি এবং মাথাঘোরা ও কপালের হাড়ের স্ফীতি ; মাথার হাড়ের আবরক কঠিন পর্দার পার্শ্ব অপব্যবহার জনিত প্রদাহ ।

চক্ষু । সর্দি লাগিলে যেকপ হয়, চক্ষু নেকপ প্রদাহযুক্ত ও জলপূর্ণ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরের পেশীতে বেদনা ও টাটানি ।

নাসিকা । নাকদিয়া স্লেষ্মার জ্বায় পদার্থ নিঃসরণ যাহা প্রথমতঃ জলের জ্বায় থাকে এবং তৎপর পূঁষ মিশ্রিত স্লেষ্মার পরিণত হয় ; নাসারন্ধ্রের মধ্যদেশে ক্ষত এবং তদ্বকণ উহাতে চড়্‌চড়ানী ও জ্বালায়-
তব ; নাকের হাড়ের ক্ষয় বা উহাতে ক্ষত এবং প্রদাহ (অরাম্) ।

গলার মধ্য । মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বায় জ্বালা এবং চিড়িক মারা ও শুকাতেব ।

পাকস্থলী । অপবাহে মুখ দিয়া জলউঠা যাহা রাত্রিতে শয়ন না করা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে ; পাকস্থলী এবং অস্ত্রের মধ্যে জ্বালায়তব (অস্, আইরিস্, ক্যাস্) ; উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশে যাতনা এবং কামড়ানীর জ্বায় বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের মধ্যে গড়্‌গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া এবং উদরাময় (আলোজ্) ।

মল । উদরাময় ; অনিয়মিতরূপে দান্ত হওয়া ও মল গাঢ়, ফেণাযুক্ত, উগ্র জ্বালা উৎপাদক এবং পিত্তযুক্ত ; কোষ্ঠবদ্ধ ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রকোষ প্রদেশে ঘৃণ্‌ঘৃণে আঁকিবের প্রথর বেদনা ; মূত্র লালবর্ণ, ফেণাযুক্ত গাঢ় এবং ছুধের জ্বায় (ফস্-অস্) ; মূত্রত্যাগেব পরই মূত্রের নীচে প্রচুর পরিমাণে সাদা তলানি পড়ে ; মূত্রে সাদা গোলাবির জ্বায় অথবা ইটের গুঁড়ার জ্বায় তলানি পড়ে (পাইকোপ্) ; মূত্রের নিচে দিক্ করা মাংসের গুঁড়ার জ্বায় লাল্‌চে কটা বর্ণের তলানি পড়ে ; মূত্রনালীতে আগাগোড়া চিড়িক মাথা এবং তীক্ষ্ণ জ্বালাযুক্ত বেদনা, প্রস্রাব করিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে মূত্রত্যাগে অত্যন্ত কষ্টাভব ও মূত্রকোষ প্রদেশে ঘৃণ্‌ঘৃণে বেদনা ; মূত্রনালীতে যাতনা এত প্রবল হয় যে, উহার দরুণ রোগীর ঘৰ্ম্ম হয় ।

জ্ঞানেন্দ্রিয় । জ্ঞীলোকের প্রচুর পরিমাণে শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরে বাতের বেদনার জ্বায় বেদনা ।

শ্বাসযন্ত্র । শেষ বেলা বা সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত শুষ্ক কাশি, বায়ু-
নলের মধ্যে হৃৎস্পৃষ্ঠীর দরুণ যাহার উজ্জেক হয় ; মনে হয় যেন বায়ুনলের

উপস্থিতে কোন প্রকারের শক্তি নাই; কঠনালী প্রদেশে অঁটাবোধ এবং উহার সঙ্গে মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে হস্ত কুটানের ত্রায় জালাবুল্ল যাতনা; ক্ষণস্থায়ী গভীর তরল রকমের খুশ্‌ খুশে কাশি।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে ছিদ্র করার ত্রায় বেদনা (সেনিগা) ; নাড়ী অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । সন্ধার সময় ডাইন কহুই এবং ডাইন পায়ে কনকনিয়া বা দপদুপিয়া বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত অঙ্গে টাটানি; বাহ্যতে খোঁচাবিধার ত্রায় প্রথর বেদনা, আঙ্গুল পর্য্যন্ত বাহ্য বিস্তৃত হয়; উরুর সন্ধি, পা এবং পায়ের পাতায় কনকনানি, ডাইন পার্শ্বেই বাহ্য অধিক অল্পভূত হয়; পায়ের হাঁটু নীচে জালা এবং চুলকানি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হাড়ের আবরক কঠিন পর্দার বিবুদ্ধি এবং উহাতে ফুসুড়ী ও ক্ষত।

জ্বর । সর্দিতে যেক্রপ হয়, গায়, প্রধানতঃ মুখমণ্ডলে, দেক্রপ উৎপন্নভব।

ব্যবহার । গৌণ উপদংশ (Secondary Syphilis); গরমীর ব্যারাম জনিত অস্থির আবরক কঠিন পর্দায় বাতের ত্রায় বেদনা; শরীরের স্থানে স্থানে গ্রন্থির ত্রায় কঠিন ক্ষতি; পুৰাতন আকারের বাতরোগ; গরমীর ব্যারাম আক্রান্ত রোগীব সায়েটিকা (Sciatica) রোগ; কঠনালী প্রদাহ, যদি উক্ত প্রদাহ গরমীর ব্যারাম জনিত হয়; পারার অপব্যবহাব জনিত অস্থির আবরক কঠিন পর্দার প্রদাহ; মূত্রনালী প্রদাহ; তরুণ প্রমেহ রোগ; পুৰাতন আকারের প্রমেহ রোগ বা গ্লিট্‌ (Gleet); শ্বেত প্রদর; গায় গরমীর ব্যারাম বা গণ্ডমালা জনিত ক্ষত এবং ফুসুড়ী ইত্যাদি অস্থখে ষ্টিলিজিয়া ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । গা মাটি মাটি করা, নিদ্রাবেশ; সার্বাঙ্গিক যাতনা; অপরোহে, আর্দ্র বাতাসে এবং নড়া চড়াতে অস্থখের বৃদ্ধি ইত্যাদি ষ্টিলিজিয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । অবাম, অার্জেটাম্‌, হিপার-সাল্‌ফিউবিস্‌, ক্যালী আয়োডাইড্‌, ফাইটোলাকা, মার্কিউরিয়ান্‌, মেজিরিয়াম্‌, রাস্‌-টল্‌, সাল্‌ফার।

ডাইলুশন বিচার । ইহার ডাইলুশন সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই।

সিম্ফাইটাম্ অফিসিনেলী,-সিম্ফাইট্ (SYMPHYTUM OFFICINALE,—SYMPH)

এই গাছের কাঁচা শিকড় যথা নিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা দ্বারা ভাঙ্গা হাড়ে জোড়া লাগে পূর্বকালের লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল । এই বিশ্বাসটি যে একবারে ভ্রম মূলক এরূপ বলা বাইতে পারে না, কারণ, হোমিওপ্যাথিক মতে হাড় ভাঙ্গার চিকিৎসায় ইহা দ্বাৰা বিশেষ ফল পাওয়া যায় । মেরুদেশের হাড়ের অস্থি হেতু প্ৰসিয়াস্ ফোড়া (Psoas Abscess) এবং নিম্ন হৃদাস্থির প্রদাহে আমেরিকার সেনিট্ নিবাসী ডাক্তার কেট্ (Dr. Cato.) এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন । উক্ত উভয় অস্থিই তিনি এই ঔষধের ২য় এবং ৩য় ডাইলশন ব্যবহার করিয়াছিলেন । অঘাত লাগিয়া অস্থির আবরক কঠিন পদার প্রদাহে (Periostitis) এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে ।

টিউক্রিয়াম্ মেরাম্ বিরাম্,-টিউক্রি

(TEUCRIUM MARUM VERUM,—TEUC.)

এই গাছের কাঁচা ডাঁটা এবং পাতা যথা নিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । পূর্বকালে নাসা বা নাকড়াতে ইহা নস্ত্র (Snuff) স্বরূপ ব্যবহৃত হইত । হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা ঐ হিসাবে নাসা বা নাকড়াতে ইহার অভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । এইরূপ অভ্যন্তরিক প্রয়োগে নাসাতে যে কি ফল হয় সে সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ নাসাতে তিনি এই ঔষধ কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই । অস্ত্রে হৃৎ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির (Ascarides) পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী । ইহা কৃমি রোগে সিনা (Cina) নামক ঔষধের স্থায় কার্য্য করিয়া থাকে । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, যদি উক্ত প্রকার কৃমি গুলি দ্বারে অত্যন্ত উত্তেজনা উৎপাদন করে, তবে ইহা সিনা অপেক্ষাও

ট্যারেন্টুলা; আর্টিকা ইউরেন্স।

১২৯

অধিক উপকারী। ইহার মূল আরোক ১ বা ১/২ মাত্রা, বা ১ম দশমিক ক্রমের আরোক, ১কোঁটা মাত্রা, বিশেষ উপকারী। তাঁহার আপন চিকিৎসার ফল দেখিয়া লেখক ডাক্তার হিউজের উক্ত মতের পোষকতা করিতে পারেন।

ট্যারেন্টুলা,-ট্যারেন্ট

(TARENTULA,—TARENT.)

ইহা এক প্রকারের মাকড়সা বিশেষ। এই মাকড়সার সমুদয় অংশ বর্থা নিয়মে প্রফ্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা মজ্জা সঞ্চরীয় হায়, মণ্ডলীই ইহা প্রধানতঃ আক্রমণ করিয়া থাকে, বাহার অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক এবং শারীরিক অবসন্নতাও বর্তমান থাকে ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়া (Chorea) রোগের ত্রায় লক্ষণাদিও সম্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। উক্ত প্রকারের অস্থিরতার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে জ্বী বা পুরুষ সহ-বাসের ইচ্ছাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বাদ্য শুনিলে কোরিয়ার আক্রমণের ত্রায় লক্ষণাদির হ্রাস বা একবারে দূরীভূত হওয়া এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন বিশেষ। অতএব কোরিয়া রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। হিউজিয়া এবং এই প্রকার অন্যান্য হায়বিক অস্থির ইহা বিশেষ উপকারী। আগারিকাস্, সিনিসিকিউগা, ট্র্যামোনিয়াম্ ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সঙ্গে ট্যারেন্টুলার কার্যের সম্বন্ধ আছে। ৩৪, ৬ষ্ঠ এবং ১২ ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আর্টিকা ইউরেন্স,-বিছুটা,-আর্টিকা

(URTICA URENS,—URTICA)

এই গাছের কাঁচা ডাঁটা এবং পাতা যথানিয়মে প্রফ্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা চর্ম বিশেষরূপে আক্রমণ করার দক্ষণ গায়

আমবাতের (Urticaria, -Nettle rash) ভায় এক প্রকার ফুসুড়ী প্রকাণ্ড গায়। অতএব আমবাতে ইহা বিশেষ উপকারী।

মস্তক। ঘৃণ্ণশে মাথা ব্যাথা, ডাইন পাশ্বেই বাহা অধিক অস্থিত হয়; মাথার হাড়ের উপর আমবাতের ভায় ফুসুড়ী বাহা চামড়ার নীচেও বর্তমান থাকে।

চক্ষু। আবাত বা চোট লাগিলে যেক্রপ হয়, চক্ষুর গোলকে সেক্রপ চাপিয়া ধরার ভায় বেদনা (আর্গিকা, সিমিসিফ, রুট)।

গলার মধ্য। গলার মধ্যে জ্বালা (আর্স, ক্যাঙ্ক, ক্যাপ্স)।

মল এবং মলদ্বার। আমাশয়ের ভায় ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহদ্বারে জ্বালা ও চুলকানি।

চর্ম। মুখমণ্ডল, বাহ, কন্ধ এবং বক্ষে আগুণে পোড়ার ভায় জ্বালা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অংশে কুট্‌কুটানি, অবশবোধ এবং অত্যন্ত চুলকানি (এপিস); স্তনের অত্যন্ত ক্ষীতি এবং স্তন হইতে প্রথমতঃ সিরামের (Serum) ভায় ক্ষেণবৎ পদার্থ ও তৎপর হৃৎ নিঃসরণ; স্তনে প্রায় ৮ দিন পর্যন্ত প্রচুর হৃৎকের সঞ্চার; হাতের আগাগোড়ার ক্ষীতি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চুলকানি; আমবাত; জল বা পানি বসন্ত, যাহার দ্রুণ আক্রান্ত স্থানে ফুসুড়ী উঠে, উহার কেন্দ্র সাদা এবং চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান লালবর্ণ ও আক্রান্ত স্থানে হল ফুটানের ভায় বা জ্বালাযুক্ত যাতনা, আক্রান্ত স্থান রগড়াইলে যাহার উপশম হয়।

ব্যবহার। আমবাত (Urticaria, -Nettle-Rash); জল বা পানি বসন্ত; স্তনহৃৎ শুকাইয়া যাওয়া, নতুবা স্তনে অতিরিক্ত পরিমাণে হৃৎকের সঞ্চার; পুড়িয়া পোড়া স্থান লালবর্ণ হওয়া; কুমির দ্রুণ গুহেব উত্তেজনা; ঠাণ্ডা লাগিয়া যেক্রপ হয়, সেক্রপ তরুণ আকারের শেখ ইত্যাদি অস্থিতে আটকা ব্যবহার্য। পুড়িয়া গেলে পোড়া স্থানে বাহ প্রয়োগ এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগ আবশ্যক।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। ইহার কার্যের সঙ্গে এপিস, রাস্ট্র, ক্যাঙ্কারিস্ এবং লেডামের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের আরোকই

আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্যবহৃত। বাহ্য প্রয়োগে ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মূল আরোক ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে বিশাইয়া উক্ত লোশন (Lotion) ব্যবহার্য্য।

বেলিরিয়ানা অফিসিনেলিস্,-বেলিরিয়ান্

(VALERIANA OFFICINALIS,-VALERIAN.)

এই গাছের শিকড় যথানিয়মে প্রকৃষ্টিপরিটে তিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। আস্থা, আসাফিটিডা এবং মক্ষাশের (কন্তুরীর) ভ্রায় ইহা স্নায়ু মণ্ডলীর কেন্দ্র স্থান আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা মস্তিষ্ক এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ই অধিক আক্রমণ করে। ইহা শিরঃপিণ্ডা, মাথাঘোরা, মানসিক উত্তেজনা, মনের অত্যন্ত আন্দোলন এবং সকল কার্য্যে তাড়াতাড়ি করার ভাব ও চক্ষের সম্মুখে আগুনের কণার ভ্রায় দেখায়, যাহার দরুণ মনে হয় যেন সম্মুখস্থ সমুদয় বস্তুই আগুনের মধ্যে রহিয়াছে। স্নায়ু মণ্ডলের গতি উৎপাদক শক্তির কেন্দ্রও ইহা দ্বারা আন্দোলিত হইয়া থাকে, যাহার দরুণ অস্থিরতা এবং শরীরের নানা স্থানের আক্কেপিক সকালন দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তিষ্কের জ্ঞান উৎপাদনের কেন্দ্র স্থানও ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহার দরুণ হাত পায়ের পাতায় কুটকুটানি, অসাড়বোধ এবং মস্তক ও কসেরুকায়ে অস্বস্তি বোধ ইত্যাদি স্নায়ুরোগের আক্রমণের পূর্ববর্তী লক্ষণের (Aura epileptica) ভ্রায় কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। চক্ষু এবং মূত্র যন্ত্রের উপরও ইহার বিশেষ কার্য্য আছে। ডাক্তার রিংগার (Dr. Ringer) বলেন যে, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, উষ্ণ এবং শীতল বর্ষ, অস্থিরতা, স্নায়বিকৃতা, মানসিক অবসন্নতা, গলার মধ্যে আঁটা বা ফাঁপড়বোধ, কশালের জ্বই পার্শ্বে দপদপানি, হৃৎপিণ্ডের ধড়কড়ানি ইত্যাদি হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ গুলি অনেক স্ত্রীলোকের শেষ রজঃরোধের (Menopause) সময় ঘটয়া থাকে। এমতাবস্থায় বেলিরিয়ান্ বিশেষ উপকারী। অবার ডাক্তার ফিলিপ্‌স্ (Dr. Phillips) বলেন যে, অনেক দিন ধরিয়া ক্রমাগত এই

ঔষধ সেবনে স্তব্ধ ঘাঘু (Melancholia) এবং হিষ্টিরিয়ার ভায়ে মানসিক অবসন্নতা উৎপন্ন হয়। আবার তিনিই বলেন যে মনোঅস্বস্ততা বা মনোরোগে (Hypochondrias) এই ঔষধ সেবনে স্বাভাবিকতা দূরীভূত হয়, রক্ত সঞ্চালনের উত্তেজনা হ্রাস হয়, নিদ্রাশূন্যতা দূরীভূত হয়, নিদ্রা হয় এবং মনে শান্তির ভাব আইসে, বিমর্ষভাব থাকে না এবং মনের অবসন্নতার ভাব কমিয়া যায়। হিষ্টিরিয়া রোগে নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া কাঁপড় হওয়া, মাথা ধরা, উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার এবং কাশি ইত্যাদি অস্বস্থের পক্ষে উহার মতে বেলিরিয়ান বিশেষ উপকাৰী। ডাক্তার গারেসি (Dr. Guerenay) বলেন যে, আহারবহা গলনালীর উপরিভাগ হইতে উহার নিম্নভাগ পর্যন্ত একটা স্থতার ন্যায় পদার্থ ঝুলিয়া থাকার ন্যায় অস্বস্থ হওয়া এবং তদ্রূপ বারম্বার বমনোদ্বেষের ভাব এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মনের অস্বাভাবিক রকমের উল্লাস; জ্ঞান বড় থাকে না অর্থাৎ রোগী কোন বিষয় বুঝিতে বা জানিতে পারে না; সামান্য আকা-
রের প্রলাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা যেন কাঁপে।

মস্তক । মাথা ব্যাথা, চক্ষুর কোটরের উপরিভাগেই যাহা অধিক অস্বস্থ হয়; কপালে প্রবলরূপে চাপিয়া ধরার ভায়ে যাতনা এবং উহার পরক্ষণেই কপালে, প্রধানতঃ চক্ষুর কোটরের উপরিভাগে, বাটিয়া বা কসিয়া ধরা; চক্ষুর কোটরের উপরিভাগে একবার সাটিয়া ধরা এবং একবার চাপিয়া ধরা, যাহার দরুন মনে হয় যেন কেহ চক্ষু মধ্য হইতে বহির্দিকে-
খোঁচাইয়া বাহির করিতেছে।

চক্ষু । প্রাতঃকালে ঘুমভাঙ্গিলে চক্ষে চাপাবোধ; চক্ষুর পাতার প্রান্ত যেন ক্ষীত এবং ক্ষত হওয়ার ভায়ে অস্বস্থ হয়; ধূম প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেকরূপ জ্বালা এবং চিড়িক মারা (ক্রোকাশ); চক্ষুর সম্মুখে আঙুণের কণার ভায়ে দেবার (বেল, সাইক্লোমেন, মৌনয়েন, সালফ), মনে হয় যেন সমুদয় বস্তুই আঙুণের উপর রহিয়াছে।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলের দ্বায়শূল (বেল্, চায়না, মার্ক্); মুখমণ্ড-
লের স্থানে স্থানে আফেপিক ঝাকনি (ইগ্‌নেস্)।

মুখগহ্বর। দন্তশূল; মধ্যাক্ষ-আহারের পূর্বে মুখে পচামাঁছের
তৈলের ঝার স্বাদ; অতি প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিয়া মুখ ধুইলে মুখে বিষাদ
বা চট্‌চটিয়া স্বাদ।

পাকস্থলী এবং উদর। বারম্বার কাঠ উদ্‌গার; গলাদিয়া উগ্র
স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠা যাহা মুখগহ্বর পর্য্যন্ত উঠে না; একগাছি স্ততা কুলিয়া
থাকিলে ঘেরূপ হয়, গলাব মধ্যে সেকরূপ অনুভূত হওয়ার দরূণ বমনোদ্বেগ,
যে স্ততাগাছি যেন নাভিপ্রদেশ হইতে ক্রমে ক্রমে উপরের দিকে উঠিয়া
মুখগহ্বরের পশ্চাত্তাগে উঠে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখের মধ্যে প্রচুর পরি-
মাণে লালের সঞ্চার হয়; বমনের ভাব বা বমন; উদরোজ্জ্ব প্রদেশে চাপাবোধ।
উদর ক্ষীত এবং কঠিন; উদরে মোচড়াইয়া ধরাব ভ্রাম শূলবেদনা; হিষ্টিরিয়া
রোগে ঘেরূপ হয়, উদবে সেকরূপ যাতনা।

মল। উদরাময়; বারম্বার কাইয়ের ঝার মলতাগ।

মূত্রযন্ত্র। বারম্বার মূত্রতাগ; মূত্রে সাদা, লাল এবং যোলাটিয়া
তলানি পড়ে।

শ্বাসযন্ত্র। চলিয়া বেড়ানোর সময় বুকের নিম্নভাগের মধ্যদিয়া
আড়াআড়ি আঁটাবোধ হওয়ার দরূণ নিশ্বাসের ব্যাধাত; বুক এবং যকৃত
প্রদেশে হঠাৎ স্তম্ভবিধানের ঝার যাতনা যাহা মধ্যদেশ হইতে বহির্দেশে
বিস্তৃত হয়; দাঁড়াইয়া থাকিলে শেষ প্রকৃত পাজরার হাড়ের স্থানে স্তম্ভ-
বিধান বা চাপিয়া ধরার ঝার যাতনা, যাহা মধ্যাদিক হইতে বহির্দেশে পানে
বিস্তৃত হয়; নিশ্বাসের সময় বুকের বাম পার্শ্বে স্তম্ভবিধানের ভ্রাম ঘূর্ণ-
ঘূর্ণে রকমের যাতনা, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে যাহা বিস্তৃত হয় বলিয়া
অনুভূত হয়।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। বামকটি প্রদেশে কুঁচ্কির সন্ধির উপরি-
ভাগে অত্যন্ত বেদনা, বাহ্যার দরূণ মনে হয় যেন উক্ত অংশ খেঁতলিয়া
গিন্নাছে বা মোচড়াইয়া পড়িয়াছে, দাঁড়াইলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং চলিবার
অবস্থা অপেক্ষা বগা অবস্থায় যাহার অধিক বৃদ্ধি হয়।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । বামস্কন্ধ হইতে বাম হাতের অঙ্গুলী পর্য্যন্ত কসিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন স্ফুটীবিধানের ভ্রায় বাতনা, পাশ পরিবর্তনে যাহার উপশম হয় না, কিন্তু চলিয়া বেড়াইলেই যাহা একবারে সারিয়া যায় ; হাঁটুর সন্ধিতে স্ফুটীবিধানের ভ্রায় বাতনা ; স্থির ও নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিলে হাত, পা ইত্যাদিতে কসিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা, চলিয়া বেড়াইলে যাহার উপশম হয় । ব্যূহর হাড়ের মধ্যে হিঁড়িয়া ফেলা বা ছুরি বিধানের ভ্রায় বাবস্থার বেদনা ; লিখিবার সময় ডাইন বাহুর বাইসেপ্‌স্ (Biceps) নামক পেশী প্রদেশে খিলধরার ভ্রায় কসিয়া ধরা বা বাতনা, বাগা উপর হইতে নিম্ন দিকে বিস্তৃত হয় । উকর বহির্দেশে খিলধরার ভ্রায় বা হিঁড়িয়া ফেলার ভ্রায় বাতনা, যাহা কুঁচ্কির সন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; বসিয়া থাকিলে পায়ের ডিমে ঝিম্ ঝিম্ করার ভ্রায় বাতনা ; অপরাহ্নে বসিয়া থাকিলে ডাইন পায়ের ডিমে হিঁড়িয়া ফেলা বা চিড়িকমারার ভ্রায় বাতনা ; ডাইন পায়ের পাতার সন্ধিতে থেঁতলিয়া যাওয়ার ভ্রায় ক্ষণস্থায়ী বেদনা, দাঁড়াইয়া থাকিলেই যাহা অধিক অনুভূত হয়, চলিয়া বেড়ানোর সময় যাহা সারিয়া যায় বলিয়া অনুভূত হয় ; ডাইন পায়ের গোড়ালীতে থেঁতলিয়া যাওয়ার ভ্রায় হঠাৎ বেদনা, দাঁড়াইয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং চলিয়া বেড়াইলে যাহার উপশম হয় ; নিম্নাঙ্গ সম্বন্ধিত ; বসিয়া থাকিলে পায়ের পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি সন্ধিতে কসিয়া ধরার ভ্রায় বাতনা ; বসিয়া থাকিলে পায়ের গোড়ালীতে হুলকুটানের ভ্রায় বাতনা ।

নিদ্রা । প্রথম রাত্রিতে ঘুম একবারেই হয় না ; রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা এবং তদরূপ অস্থিরতা ও শেষ রাত্রিতে বা ভোর বেলা অত্যন্ত ঘুম হয় বটে, কিন্তু নানা বিষয়ে স্পষ্ট স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ।

জ্বর । শীত ; শরীরে ববফের ঞ্চার শীতল বোধ ; সমুদয় শরীরে অনবরত উষ্ণানুভব এবং তদরূপ অত্যন্ত অতৃপ্ত বোধ ; সন্ধ্যার সময় বসিয়া থাকা কালীন সমুদয় শরীরে অনবরত গরমবোধ ; সন্ধ্যার সময় বসিয়া থাকা কালীন মুখমণ্ডল এবং সমুদয় শরীরে অত্যন্ত শুষ্ক উষ্ণানুভব ; সন্ধ্যার সময় ২ ঘণ্টা ধরিয়া অনেকবার ঘর্ম্ম ; রাত্রিতে অতিরিক্ত পরিমাণে ঘর্ম্ম ।

ব্যবহার । হিষ্টিবিদ্যা বা যে প্রকার, স্নায়বিক মণ্ডলীর অন্তর্থে

হিষ্টিরিয়াব জ্বায় লক্ষণাদি অধিক প্রকাশ পায়, নিদ্রা শূন্যতা; শিরঃপীড়া : উদরে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়া; মনের সর্বদাই বিমর্ষভাবে ইত্যাদি অসুখ বেলিরিয়ান্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শরীরেব স্থানে স্থানে কসিয়া ধরা-জ্বায় ক্লেশহায়ী বেদনা, যাহা সকল সময় এক স্থানে থাকে না; প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিলে ব্যতনাদির বৃদ্ধি।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ইগ্নেসিয়া, ট্র্যামোনিয়াম্, আশ্বা, আসাফিটিডা, মকশ্ ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাম্ফার, কফিয়া ।

ডাইলুশন বিচাব । ১ম, ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনই আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি।

বার্ব্যাকাম্ থ্যাপ্সাস্,-বার্ব্যাক্

(VERBASCUM THAPSUS,-VERBASC.)

এই গাছের কাঁচা ডাঁটা এবং পাতা যথানিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা সম্বন্ধে ইহা ইহা আক্রমণ করিয়া থাকে, বাহার দ্রুত শিরঃপীড়া, মূত্র-বর্জিত হওয়া, স্বরভঙ্গ সম্বলিত শুষ্ক কাশি ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । বামগাল চাপিলে মাথাঘোরা; মাথার চাপিয়া থাকাতে অবসন্নকারক বেদনা, কপালেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; চিম্টা দিয়া চাপিয়া ধরিলে বেরুণ হয়, কপালের দুই পার্শ্বে দেকপ ব্যতনা; মস্তিষ্কের বাম অর্দ্ধাংশের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে চাপিয়া ধরা বা স্থচীবিধানের জ্বায় ব্যতনা, যাহা পশ্চাত্তিক হইতে সম্মুখ দিকে বিস্তৃত হয়।

কর্ণ । বাম কর্ণে অবশবোধ; বাম কর্ণে ছিঁড়িয়া ফেলা বা কসিয়া

ধরার জ্বাৰ বেদনা ; প্রথমতঃ বাম কর্ণ এবং তৎপর ডাইন কর্ণ যেন বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এক্রপ মনে হয় ।

মুখমণ্ডল । বাম গালের হাড় এবং মেলার নামক হাড় (Malar-bone) চাপিয়া বা ঘাটিয়া ধরার জ্বাৰ অবসন্নকারক প্রবল বেদনা, চাপিলে এবং বহির্কায়ুতে অথবা হঠাৎ দমকা বাতাস লাগিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; টুটীর চৰ্ম্ম, মাসিটার নামক পেশী (Masseter muscle) এবং গলার মধ্যে ঘাটিয়া ধরার জ্বাৰ প্রবল বেদনা ।

মুখগংহবর । জিহবার গোড়া কটাওৰ্ণ এবং প্রাতঃকালে ও অপরাহ্লে মুখে কোন প্রকারের বিষাদ থাকে না ।

পাকস্থলী এবং উদর । কাঠ উদ্গার বা তিক্ত উদ্গার ; বার-বার হিকা । একদান ভাবি পাথর চাপাইয়া রাখিলে যেরূপ হয়, নাজি প্রদেশে সেরূপ কষ্টদায়ক ভাগিসোধ এবং যাতনা (পাল্‌স্), মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

মূত্রবন্ত । বারম্বার প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া (এপিস্, আপো-সাইনাম্, সিপা, পাল্‌স্) ; রাত্রিতে অনাড়ে বা অনিচ্ছাপূৰ্ব্বক মূত্রত্যাগ (কষ্ট, কুপ্রাম্, গ্রাফ্) ।

শ্বাসযন্ত্র । সজোরে পড়িবার সময় স্ববভঙ্গ (ফন্) ; সন্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্ববভঙ্গ ও বৃকে কষ্টানুভব ; স্ববভঙ্গ সম্বলিত শুক গভীর কাশি, সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতেই বাহা অধিক হয় (স্পঞ্জ) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । হাত এবং হাতের আঙ্গুলে সূচীবিধানের জ্বাৰ যাতনা ; বহির্কায়ুতে চলিয়া বেড়ানোর সময় ডাইন উরু দেশের পেশীতে খিল ধরার জ্বাৰ বেদনা ; ডাইন হাঁটুর মধ্য দিয়া হঠাৎ বেদনা ; দাঁড়াইয়া থাকা কালীন ডাইন পারের পাতার তলায় খিলধরার জ্বাৰ চাপাবোধ, চলিয়া বেড়াইলে বাহা থাকে না ।

ব্যবহার । শিরঃপিণ্ডা ; মুখমণ্ডলস্থ নয়রুশূন ; সর্দিজনিত (প্রধানতঃ শিশু এবং ছোট বালক বালিকাগণেব) কাশি ; মূত্র ধারণে অশক্তি বা বিছানার স্বপ্নে প্রস্রাব করা ইত্যাদি অন্তর্থে বার্ক্যাকাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শরীরের স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া ফেলা

বা স্মৃতিবিধানের ভাষা যাতনা (ব্রাহ্ম, ক্যাণী-কার্খ); অতিরিক্ত গা ভাঙ্গা এবং হাঁইতোলা; আহারের পর নিদ্রার ভাব; সমুদয় শরীর ঠাণ্ডা।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। নাক্স-বমিকা, প্লাটিনা, ষ্ট্যানা।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাফার।

ডাইলুশন বিচার। হানিমান এই ঔষধের মূল আরোক ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার কুসিংগের (Dr. Cushing) মতে ওয় দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবস্থা।

জ্যাস্থক্স জিলাম্,-জ্যাস্থক্স

(XANTHOXYLUM,-XANTHOX.)

এই গাছের ছাল বা পাকা ফল যথানিয়মে রেক্টিফাইড স্পিরিটে তিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা স্নায়ু মণ্ডলীকে আক্রমণ করিয়া জ্ঞান উৎপাদনের সহায়কারী স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত এবং উষ্ণ কাব্যয়া থাকে। ইহা গতি উৎপাদনের সহায়কারী স্নায়ুগুলিকে অপেক্ষাকৃত কম আক্রমণ কারয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ ইহা জ্ঞান ও গতি উৎপাদনের সহায়কারী, এই উভয় প্রকারের স্নায়ুগুলির পক্ষাঘাত এবং জড়তা উৎপাদন করার দরুণ জীবনী শক্তির হ্রাস হয়। অতএব ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক এবং শরীরের কার্য্য করার শক্তিও আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহার উত্তেজক শক্তি দ্বারা শৈথিল্যিক বিদ্রো, পেশী ও গ্রন্থি গুলিও আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা জননেঞ্জিয় আক্রমণ করিয়া জ্বালোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং প্রচুর রক্তস্রাব আনয়ন করে। এই প্রকারের রক্তস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে স্নায়ু শুলের ভাষা বেদনাও (Neuralgic pain) বর্তমান থাকে। এই প্রকার রক্তস্রাবে স্নায়ুশুলের লক্ষণাক্রান্ত-কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনা বলিয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্বদাই সশঙ্কিত থাকা এবং ভয়াতুর; মনের অবসন্নতা এবং দুর্বলতা।

মস্তক । মাথায় পূর্ব এবং ভারিবোধ ; মাথায় গোলমেনে বোধ ; মাথার পশ্চাৎভাগে বেদনা ; ডাইন চক্ষুর উপরিভাগে দপ্‌দপিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদেগ ; চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদেগ ; চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাকের গোড়ার উপরিভাগে দপ্‌দপানি ; মাথায় কন্‌কনানি এবং দপ্‌দপানি, যাহার দরুন মনে হয় মাথার উপরিভাগ, যেন ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িবে ; মাথার হাড়ে আঁটাবোধ ।

নাসিকা । ডাইন নাসারন্ধ্রে পূর্ববোধ ; নাকদিয়া শ্লেষ্মা নির্গমন ; নাকদিয়া রক্ত মিশ্রিত মামড়া (চুমটী) পড়ে ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখগহ্বর, উহার পশ্চাৎভাগ এবং গলার মধ্যে গোলমরিচের স্থায় স্বাদ । গলাব মধ্যে জ্বালা এবং টাটানি ও গলাদিয়া কঠিন তল তলে শ্লেষ্মা নির্গমন ; কোন বস্তুর একটা বাধা ঝোপা লাগিয়া থাকিলে যেৰূপ হয়, গিলিবার সময় গলার মধ্যের বায়ু পার্শ্বে সেক্রপ যাতনা, বাহা ডাইন দিকে সরিয়া যায় ।

পাকস্থলী । জ্বাশূলতা ; উদগার উঠা ; বমনোদেগ ; পাকস্থলীর মধ্যে কষ্টাশূলভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে শীতবোধ ; পাকস্থলীতে পূর্ব এবং চাপাবোধ ও উহাতে ধড়্‌ধড়্‌ করা ।

মূত্র । স্নায়বিক জ্বীলোকের প্রচুর পরিমাণে ফিকা রঞ্জের মূত্র ত্যাগ ।

জননেন্দ্রিয় । জ্বীলোকের ডিম্বকোষে বেদনা বাহা জেনিটো জুরেল্‌স্নায়ু (Genito-crural nerves) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; জরায়ুতে ভয়ানক যাতনা এবং বেদনা ; শিরঃপীড়া ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে প্রচুর রজঃস্রাব ; উরুর সম্মুখ ভাগের নিয়মিত বেদনা ; স্নায়ুশুলের আকার বিশিষ্ট বাধকের বেদনা সম্বলিত কষ্টকর রজঃস্রাব ; সন্তান প্রসবের পর জরায়ুতে স্নায়ুশুলের স্থায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে লোকীয়া (Lochia) নিঃসরণ ।

স্বাসযন্ত্র । স্বরভঙ্গ এবং গলার মধ্যে গুল্‌বোধ, যাহার দরুন মনে হয় যেন স্বরভঙ্গ হইয়াছে ; দীর্ঘ নিশ্বাসের ইচ্ছা ; বৃকে আঁটা বোধ ; হা কারিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের ইচ্ছা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । জেনিটো ক্রুরেল্ নায়ূর (Genito-crural nerves) মধ্য দিয়া আগা গোড়া নায়ূশুলের ছায় প্রবল বেদনা ; নিম্নাঙ্গের অত্যন্ত দুর্বলতা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নায়ূশুলের ছায় বা খোঁচা বিধানের ছায় বেদনা এবং উঠাতে অত্যন্ত দুর্বলতা ও অবশবোধ ।

জ্বর । শীত কম্প, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা ; দমকা উষ্ণানুভব ; শিরশ্চ মধ্যে গরমবোধ ।

ব্যবহার । নায়ূশুলের ছায় বেদনা সহ কষ্টকর রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুব বা অতিরিক্ত রজঃস্রাব ; সন্ধি ; নায়ূশূল ; পক্ষাঘাত ; হৃৎকি পাণ্ডুরো (Chlorosis) ; সন্তান প্রসবের পর পেটে নায়ূশুলের ছায় বেদনা ইত্যাদি অন্তর্থে জ্যাঙ্ক জিলাম্ ব্যবহার্য্য । স্ত্রীলোকের রজঃস্রাব সম্বন্ধীয় অস্থখ এবং সন্তান প্রসবের পর পেটে বেদনা (ভাদলির কামড়, - আদ্বা ব্যাথা, -After-pains) ইত্যাদি ঝোগাক্রান্ত অনেকগুলি রোগীর চিকিৎসায় যে কল পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া লেখক ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, (১) কষ্টকর প্রচুব বা অতিরিক্ত রজঃস্রাবে যদি পেটে নায়ূশুলের ছায় বেদনা থাকে এবং উক্ত বেদনা যদি স্বল্প বিরাম আকার ধারণ করে বা বিরাম শূন্য হয় অথবা অনবরত বর্তমান থাকে, তবে জ্যাঙ্ক জিলাম্ উপকারী । উক্ত বেদনা বিরাম আকার ধারণ করিলে ইহা দ্বারা কোনও উপকার দর্শে না । (২) আবার সন্তান প্রসবের পর পেটে যদি নায়ূশুলের ছায় উক্ত প্রকারের বেদনা হয়, তবে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী । (৩) এই ঔষধের মূল আরোক ব্যতীত মিশ্র আরোক সেবনে কোনও উপকার পাওয়া যায় না এবং যদি উপকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ২৩ মাত্রা সেবনেই উপকার পাওয়া যায় । পক্ষান্তরে উপকার হওয়া সম্ভাবনা না থাকিলে ইহার ২৪ আউন্স সেবনেও কোন উপকার পাওয়া যায় না । এই ঔষধ দ্বারা উপকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে ২১ মাত্রা সেবনের পরই ঘুমাইয়া পড়া এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক নিদ্রিষ্ট লক্ষণ, অনেক রোগীর চিকিৎসায় ফল দেখিয়া লেখক এরূপ স্থির করিয়াছেন ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । গায় কাঁটা বিধানের ছায় বাতনা ; গোল মরিচ লাগিলে যেরূপ হয়, ত্রৈম্বিক ঝিল্লীতে সেরূপ আলা এবং চিড়িক

মারা; সর্দি; কষ্টকর প্রচুর রজঃস্রাবে, সন্তান প্রসবের পর পেটে ঝাঁয়ুশূলের
আগ্ন স্বল্প বিরাম আকারের বেদনা বা উক্ত বেদনা অনবরত বর্তমান থাকা
ইত্যাদি জ্যাঙ্কজ্জিলামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। বেলাডোনা, সিমিটিকিউগা, জেল্‌সি-
মিনাস্।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রমের আরোক ব্যবহৃত
হয়। কষ্টকর প্রচুর রজঃস্রাব এবং সন্তান প্রসবের পর পেটে বেদনায় ১ম,
২য় এবং ৩য় ক্রম ব্যবহার করিয়া লেখক কোনও ফল পান নাই। তিনি
মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায়, ব্যবহৃত করিয়া আশাতিরিক্ত ফল
পাইয়াছেন। কোন রোগীকেই ২।৩ মাত্রায় অধিক সেবন করাইতে
হয় নাই।

চতুর্থ ভাগ ।

৪র্থ শ্রেণীর ঔষধ সমূহ

অর্থাৎ

যে সকল ঔষধ ১ম, ২য় এবং ৩য় শ্রেণীর ঔষধ অপেক্ষা কম
ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

আসিডাম্ পিক্রিকাম্,-পিক্রিক্ আসিড্,-পিক্-আস্

(ACIDUM PICRICUM,-PICRIC ACID,-AC.-PIC.)

কোন এক বিখ্যস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত পিক্রিক্ আসিড্ ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে চূয়ান জলে মিলাইয়া ইহার মিশ্র আরোক বা সলিউশন্ (Solution) প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহা রেক্টিফাইড্ স্পিরিটেও বিগলিত হয় । ইহার মিশ্র গুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে ।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি । ইহা কমেসক্ল মজ্জার সান্না-কোমলতার পক্ষে বিশেষ উপকারী । জ্বাশ্বাসের অতিরিক্ত ইচ্ছার এই ঔষধের ৩য় ক্রমের গুঁড়া সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে । এই ঔষধের ৩০ ক্রম ব্যবহারে হস্তমৈথুনের ইচ্ছা নিবারিত হইয়া থাকে । প্রবল শিরঃপীড়ায়ও ইহা বিশেষ উপকারী । শিরঃপীড়া মাথার পশ্চাৎভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া মাথার সম্মুখ এবং নিম্ন প্রদেশে বিস্তৃত হয় । ডাক্তার হেল্ (Dr. Hale) বলেন যে, যে প্রকার শিরঃপীড়া মস্তিষ্কের সামান্য ব্যবহার বা সঞ্চালনেই হয়, সে প্রকার শিরঃপীড়ায় পিক্রিক্ আসিড্ অত্যন্ত উপকারী । আল্‌বুমিনুরিয়া এবং গরমীর ব্যাধি জনিত চক্ষুর রেটিনার প্রদাহে (Albuminuric and Syphilitic Retinitis) পিক্রিক্ আসিড্ বিশেষ উপকারী । ডাক্তার হাউটান্ (Dr. Houghton) বলেন যে, মুখমণ্ডলে ত্রণের চিকিৎসায় এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে । ফুফুরাস্ এবং আর্জেন্টাম্ নাইট্ কামের কার্যের

সঙ্গে পিক্রিক্ অ্যাসিডের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ১ম হইতে ৩০ পর্যন্ত সকল ক্রম ব্যবহার করিয়াই কল পাওয়া যায় ।

এইলাস্থাস্ গ্লাণ্ডুলোসাস্,-এইলাস্থ্

(*AILANTHUS GLANDULOSUS*,-*AILANTH.*)

ডাক্তার হেল্ (Dr Hale) বলেন যে, প্রস্ফুটিত ফুল এবং গাছের কচি ও কোমল কুঁড়ির বাকল সমান পরিমাণে মিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা মৰ্জ্জা আক্রমণ করিয়া শরীরের এমন অবস্থা আনয়ন করে যাহা সাংঘাতিক আকারের আরক্ত জরে দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা চর্ম্ম ও আক্রমণ করিয়া থাকে, ঘাহার দরুণ গায় নানা প্রকারের স্কেটক রোগের ফুসুড়ী প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অর্ধ চেতনা ; রোগীর নিকট যাহা বলা যায় সে তাহা বুঝিতে পারে না (ব্যাপ্ট্, জেল্‌ন্, ফস্‌-অস্, রাস্‌-টল্) ; অর্ধজ্ঞানরহিততা, প্রলাপ এবং স্পর্শ জ্ঞান রহিততা (বেল্, হায়োস্, ওপিয়াম্) ; অনবরত বীড়্ বীড়্ করিয়া প্রলাপ বলা (Muttering delirium) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাশূন্যতা ও অস্থিরতা (আগারিকাশ্, বেল্, হায়োস্) ।

মস্তক । প্রবল শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা কিম্ কিম্ করা ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং উষ্ণ ।

চক্ষু । চক্ষু লালবর্ণ এবং জলপূর্ণ ; ঘুম হইতে জাগাইয়া রোগীর মুখ পানে তাকাইলে তাহাকে চমকিয়া উঠার ভাৱ দেখায় ; চক্ষুর তারা বিস্তৃত এবং অচল (এথুজা, বেল্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্) ; চক্ষে আলোক সহ্য হয় না ।

নাসিকা । নাকদিয়া প্রচুর পরিমাণে তরল ছানার জলের দ্বারা

ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে রক্তসংযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ (আস্‌, এরাস্‌, সিপি) ; নাসারন্ধ্রে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং নাক দিয়া স্লেয়া নিঃসরণ বদ্ধ হওয়া ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং উষ্ণ ও ঘামাচিত্র হ্রায় লাল ফুস্ফুড়ী দ্বারা আবৃত (বেল্‌, রাস্‌-টক্স্‌), মুখমণ্ডল মেহগ্‌নী কাঠের রক্ত বিশিষ্ট ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁত কাল্‌চে ময়লাযুক্ত (Sordes) (ব্যাপ্‌ট্‌, রাস্‌-টক্স্‌) ; গ্রিহ্মা শুষ্ক, উষ্ণ এবং ফাটাযুক্ত (আস্‌, ব্যাপ্‌ট্‌, বেল্‌, রাস্‌-টক্স্‌) ; গ্রিহ্মা আর্দ্র এবং সাদা লেপযুক্ত (আণ্টি-ক্লেড্‌, মার্ক্‌) ; ওষ্ঠ এবং উহার প্রান্ত নীলবর্ণ (বেল্‌) । গিলিবার সময় বা বাতাস প্রবেশ করিলে গলার মধ্যে টাটানি বা বেদনা ; গলার মধ্য নীলের আভাযুক্ত, প্রায় গাঢ় বেগুনীর হ্রায় (নেজা) ; গলাব মধ্য ক্ষীত ; টনসিল্‌ (Tonsils) ক্ষীত এবং উহাতে ভয় উৎপাদক ক্ষত (এপিস্‌), যাহা হইতে অল্পপরিমাণ দুর্গন্ধযুক্ত কল্‌তানি পড়ে ; গলার বহির্দেশ ক্ষীত এবং বেদনাযুক্ত (ব্যাপ্‌ট্‌) ; গলার মধ্যে খুশ্‌খুশী এবং গলা থেকুর দিয়া কফ জোলা ; গলার মধ্য শোথের হ্রায় ক্ষীত এবং উহাতে শুষ্ক ও ফাঁপড় বোধ ; গলার মধ্য শুষ্ক, খশ্‌খশে এবং ছাল উদ্ভিবা বাওয়াব হ্রায় হয় ।

পাকস্থলী । বসিলেই প্রবল বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধ জ্ঞান রহিততা (Stupor) (আণ্টি-টার্ট্‌) ; পিপাসা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতল জলাদি পানের ইচ্ছা ।

মন । জলবৎ তবল, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত উদগ্রাময় (আস্‌), যাহা প্রস্রাব করার সময় অসাড়ে নির্গত হয় (হায়োস্‌, মিউর-আস্‌) ।

মূত্র । মূত্রাবরোধ বা মূত্র পরিমাণে অল্প ; অজ্ঞাতসারে মূত্র নিঃসরণ ।

শ্বাসযন্ত্র । নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, অনিয়মিত এবং ভারি ; শুষ্ক খুশ্‌খুশে কশ্মিণ ; ফুস্ফুসে টাটানি এবং বেদনা ; ফুস্ফুসে ক্লান্তিবোধ ।

নাড়ী । নাড়ী দ্রুতগামী, ক্ষুদ্র এবং অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে ।

গ্রীবা । গ্রীবা অত্যন্ত ক্ষীত এবং স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় ।

চর্ম্ম । গায় লালবর্ণ হামের হ্রায় ফুস্ফুড়ী যাহা মুখমণ্ডল এবং

কপালেই অধিক দৃষ্ট হয়; গায় ফুসুড়ী, আঙ্গুল দ্বারা চাপিলে বাহা অদৃশ্য হয় এবং আঙ্গুলের চাপ ছাড়িয়া দিলে বাহা আন্তে আন্তে পুনরায় দৃষ্টগোচরে আইসে ।

নিদ্রা । নিদ্রাবেশ, অস্থিরতা, বাহা শীঘ্রই অচেতনতার পরিণত হয় ।

ব্যবহার । যে প্রকার অস্থখে অতি শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় হয়, অর্দ্ধজ্ঞান রহিততা, বমন এবং চর্ম্ম বেগুণীর রক্ষ হয়, সে প্রকার রোগ ; সাংঘাতিক আকারের আরক্ত জ্বর এবং অন্ত্রাত্ম প্রকারের স্ফোটক জ্বর ; আন্ত্রিক জ্বর বা জ্বর বিকার ; মস্তিষ্ক এবং কন্দককা মজ্জাবরক বিষ্মী প্রদাহ (Cerebro-spinal Meningitis) ; ফিতার ছায় ক্রমি (Tape worm) ইত্যাদি অস্থখে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য । ডাক্তার ব্রাউনেব (Dr. Brown) মতে যে প্রকার হাম জরে হাঁথের ফুসুড়ী বাহিব হয় না বা একবার বাহির হইয়া পুনরায় বসিয়া যায়, তাহাতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । প্রাতঃকালে অস্থখের বৃদ্ধি (মিউর-আস) । ইহা শিশু বা ছোট বালক বালিকা এবং ন্যায়বিক জ্বীলোকের অস্থখে বিশেষ উপকারী । পিত্তাধিক ধাতু ; রিষ্টপৃষ্ঠ শরীর ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আলোজ, এরাম্, আর্সিনিক, বেলা-ডোনা, ব্যাপ্টিসিয়া, জেল্‌সিমিয়াম্, হায়োসায়েমাস্, ল্যাকেসিস্, মিউরিয়া টিক্‌ আসিড্, ফফরাস্, রাস্-টক্স, ষ্ট্রামোনিয়াম্, জাঙ্কজিলিয়াম্ ।

প্রতিসেধক ঔষধ । আলোজ, রাস্-টক্স, নাক্স-বমিকা ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম দশমিক ডাইলুশনই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

আট্রোপিয়া,-আট্রোপ্

(ATROPIA,-ATROP.)

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি । অনেক চিকিৎসাবিদ পণ্ডিতের বিশ্বাস যে বেলাডোনা এবং আট্রোপিয়ার কার্য্য প্রায় এক প্রকার । উক্ত দুই ঔষধের কার্য্যের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহার কোনও সন্দেহ নাই ।—জ্বরের পর অনেক কাল স্থায়ী শিরশীড়া ; ভ্রম এবং মৃগীরোগ ;

গলায় মধ্য এবং কণ্ঠনালীর উত্তেজনা, হৃদিং কক্ষের আক্ষেপিক অবস্থা এবং হাঁপানি কাশিতে আট্রোপিয়া বিশেষ উপকারী । ডাক্তার কাক্কা (Dr. Kafka) এই ঔষধ তাহার আপন শরীরে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পাকস্থলীর যে প্রকার পুঁজাতন আকারের অস্থিতে পাকস্থলীতে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনা এবং বমন বর্তমান থাকে, তাহাতে আট্রোপিয়া অত্যন্ত উপকারী । ডাক্তার বেয়ার (Dr. Bøhr) বলেন যে, পাকস্থলীর ক্ষতে, পাকস্থলীর বেদনা বা যাতনা নিবারণ করার জন্য আট্রোপিয়া এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । আমেরিকাতে উক্ত প্রকারের পাকস্থলীর ক্ষত রোগে আট্রোপিয়া সেবনে অনেক রোগী আরাম হইয়াছে । ইহার ২য় ক্রমের গুঁড়াই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ক্রোটেলাস্ হরিডাস্, -ক্রোটেল্

(CROTALUS HORRIDUS, -CROTAL.)

রেটেল্ (Rattle snake) নামক আমেরিকার এক প্রকার ভয়ানক বিষাক্ত সর্প আছে । উহার বিষকেই ক্রোটেলাস্ বলে । গ্লিসেরিন্ (Glycerine) দিয়া ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয় । ১ম শততমিক হইতে ৫ম শততমিক ক্রম পর্যন্ত গ্লিসেরিন্ এবং প্রফ্ স্পিরিট্ একত্রে মিশাইয়া (১ ভাগ গ্লিসেরিন্ এবং ৩ ভাগ প্রফ্ স্পিরিট্) প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৬ষ্ঠ এবং ততোধিক শততমিক ক্রমের আরোক ২০° ডিগ্রী ওয়ার প্রফ্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । অন্ত্যন্ত প্রকারের সর্পবিষের জ্বায় ইহা প্রথমতঃ মস্তিষ্ক এবং কসেফকা মৰ্জ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ুর কেন্দ্র স্থান (Centres) আক্রমণ করে এবং তৎপর রক্তকে পচাইয়া রক্তের ফাইব্রিন্ (Fibrine) নামক পদার্থকে বিনাশ করিয়া রক্তস্রাব আনিয়ন করে ও শরীরের নানা স্থানে লোমছা যাওয়ার (Ecchymoses) জ্বায় হইয়া থাকে । (১৮৮পৃষ্ঠায় ল্যাকেসিন্ নামক ঔষধের বিবরণ দ্রষ্টব্য) । পিত্তজ্বরে (Yellow Fever) যেরূপ অবস্থা

হয়, ক্রোটেলাস্ দ্বারা বিষাক্ত হইলেও সেরূপ হইয়া থাকে। অতএব পিত্তজ্বরে ক্রোটেলাস্ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । প্রলাপ, প্রধানতঃ রাত্রিতে ; আত্মিক জ্বর বা জ্বর বিকারে বিড়্-বিড়্ করিয়া প্রলাপ বলা ; প্রলাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু অন্ধ হোলা থাকা ; জ্ঞানের জড়তা ; কথা বার্তা গোলমালে এবং প্রশ্নাদির অসংলগ্ন উত্তর দেওয়া ; স্মরণ শক্তির অত্যন্ত হ্রাস (অনাকার্ড্, ক্রিয়াজ্) ; মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত নিদ্রার ভাব হয় বটে, কিন্তু রোগী ঘুমাইতে পারে না ; রোগাদি দ্বারা কণ্ঠ এবং হৃৎকল শরীরে উক্ত প্রকারের প্রলাপাদি ; শুষ্কবায়ু এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তীব্রতা, ভয় এবং মনের উদ্বেগ ; ক্রন্দন এবং খিট্-খিটে স্বভাব ; বিমর্ষ ভাব এবং রোগী (জীলোক) সর্বদা আপন মৃত্যু বিষয়ে চিন্তা করে।

মস্তক । মাথাধোরা ; মাথা বেদনা, যাহা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কপালের ছই পার্শ্বে সূচীবিধানের জ্বায় বেদনা বা যাতনা ; কপালের ঠিক মধ্য ভাগে প্রবল বেদনা ; চক্ষুর তারি বিস্তৃত ; প্রচুর রক্তস্রাব ; মাথায় ভারিবোধ এবং চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনা ; মাথার হাড়ে ভয়ানক রকমের চুলকানি (কার্বোন্স-আন্স, সাল্ফ)।

চক্ষু । চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ (চেলিডন্, পডোফ্, অ্যায়োড্, প্লাস্ফাম্) ; সমুদয় শরীর হরিদ্রা বর্ণ ; চক্ষুদ্বয় কাল রেখা দ্বারা পবিত্রিত ; চক্ষুদ্বিধা রক্ত চুষাইয়া পড়া ; চক্ষে জ্বালাভব ; চক্ষুর উপরিভাগে চাপা এবং কষ্টাবোধ।

নাসিকা । নাসিকা এবং শরীরের যে যে স্থানে ছিদ্র আছে, উহার সমুদয় ছিদ্র দিয়াই রক্ত নির্গমন : ডিপ্ থিরিয়া রোগের সময় নাক দিয়া রক্ত পড়া ; গরমীর ব্যারাম জনিত বা আরক্ত জ্বরে নাকের মধ্যে ক্ষত এবং উহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ক্রেন নিঃসরণ ; নাক দিয়া রক্তের জ্বায় ক্রেন নিঃসরণ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ (চেলিডন্, পডোফ্) অথবা সীসার রক্তের জ্বায়।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মাড়ি সাদা; মাড়ি দিয়া রক্ত পড়া; রাত্রিতে দাঁতে দাঁতে কড়মড় শব্দ করা; জিহবার প্রদাহ এবং গলার মধ্যে অস্টীবোধ হওয়ার দরুণ বাকরোধ । গলার মধ্য শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা ।

পাকস্থলী এবং উদর । অসহ পিপাসা; পাকস্থলী সর্বদা উত্তেজিত অবস্থায় থাকে এবং কোন দ্রব্য উদরস্থ হওয়া মাত্রই বমন দ্বারা উঠিয়া পড়ে; ক্ষুধা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কাঁপনি ও ছুঁকলতা; উদরস্থ আহার দ্রব্য, সবুজবর্ণের জল বা রক্ত বমন, বাহ্য অনেক সময় অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে; পাকস্থলীর মধ্যে বেদনা; উদরোর্ত্ত প্রদেখে এবং উদরের দুইপার্শ্বে কাপড়ের চাপও সহ হয় না (ক্যাক্স-কার্ক, ল্যাক্স); সমুদয় উদরই ক্ষীত; উদরে জ্বালাযুক্ত বেদনা (আর্দ); কুঁচ্কির গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং উহাতে পচা ও অল্পস্থ পুঁয়ের সঞ্চার ।

মল এবং মলদ্বার । গুহদ্বার এবং শরীরের অন্তান্ত স্থানের স্বাভাবিক ছিদ্র দিয়া রক্ত নিঃসরণ (হামামেলিয়া); উদরাময়; কালচে তরল রক্তসংযুক্ত আমাশয়ের মলের স্থায় মলত্যাগ; অসাড় বা অনিচ্ছা-পূর্বক মলত্যাগ; অত্যন্ত ছুঁকলতা এবং মুচ্ছার ভাব ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রনালী দিয়া রক্তস্রাব; অতিরিক্ত পিত্তের দরুণ মূত্র হরিদ্রাবর্ণ বা শালের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ; আন্ত্রিকজ্বর বা জ্বরবিকার, ডিপথিরিয়া ইত্যাদি রোগের ভোগ কালে মূত্রে আয়ুর্মেনের সঞ্চার; রক্তমিশ্রিত হওয়ার দরুণ মূত্র ধূমের আকার বিশিষ্ট হয় ।

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীলোকের কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা; রজঃস্রাবের পূর্বে উদরোর্ত্ত প্রদেখে এবং উরুদেশের নিম্নভাগ পর্যন্ত বেদনা; দুইদিন পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব হয়, তৎপর ৪ দিন অল্প অল্প রজঃস্রাব হয়; হৃৎপিণ্ড ছুঁকল এবং পায়ের খাঁতা শীতল ।

শ্বাসযন্ত্র । অরুভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বর মুহু, কর্কশ এবং ফেস্ ফেসে; সামান্য কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলাদিয়া রক্তমিশ্রিত স্লেমা নির্গমন; শ্বাসকষ্ট; হৃৎপিণ্ড কদ বা কাশি; ছুঁকলতা; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ বা ফিকা বা শিটা; মুখমণ্ডল ক্ষীত এবং টগ্ টগে; বুদ্ধবয়সে বৃক্কে কষ্টায়ত্ত্ব

এবং বক্ষশোথ ; সামান্য জ্বর বা সবিরাম জ্বরে বক্ষশোথ এবং বুকের মধ্যে কঠাহুভব ।

নাড়ী । নাড়ী ক্ষতগামী, হ্রীল এবং লুপ্তপ্রায় (একন্, আন্) ; জ্বৎস্পন্দন, যাহার দরুণ মনে হয় যেন জ্বংপিণ্ড কাঁপিতেছে ।

নিদ্রা । স্নায়বিক মণ্ডলীর অতিরিক্ত আন্দোলনের দরুণ নিদ্রা-শূন্যতা ; সর্বদা ঘুমের ইচ্ছা হয়, অথচ ঘুম ভাল হয় না ; জ্ঞানের জড়তা, নিদ্রাবল্য এবং ঘোর অচেতনতা ; মরা মানুষ স্বপ্নে দেখা ; ঘুমের পর লক্ষণাদির বৃদ্ধি (ল্যাক) ।

জ্বর । চর্ম শুষ্ক এবং কাল্‌চে কটাবর্ণ ; জিহ্বা শুষ্ক অথবা হরিদ্রা লেপযুক্ত এবং উহার শ্রান্ত ও অগ্রভাগ লালবর্ণ ; বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া প্রলাপ বলা, নিদ্রাবল্য ; মূত্র কাল্‌চে এবং পরিমাণে অল্প ; রক্তস্রাবের ভাব ; পিত্ত রক্তাদি বমন ।

চর্ম । হাত পায়ের আঙ্গুলের কাঁকে কাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বার ক্ষত বাহা পচিবার উপক্রম হয় ; রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া আন্তে আন্তে সম্পন্ন হয় ।

ব্যবহার । শরীরের নানা অংশে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; বিকারের লক্ষণ সম্বলিত প্রদাহ ; শরীরের স্থানে স্থানে লোমছা বাগয়ার জ্বার হয় (Ecchymoses) ; মস্তিষ্ক, কুক্ষুস এবং জ্বংপিণ্ড ইত্যাদিতে দূষিত পদার্থের সঞ্চার ; পূর্ব অস্থি হেতুই হউক, সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক শক্তি শরীরে প্রবেশ করার দরুণ হউক, পূর্ব দ্বারা রক্ত বিষাক্ত হওয়ার দরুণই হউক, বা মদ্যের অপব্যবহারের দরুণই হউক, জীবনী শক্তির হ্রাস হইয়া বিকার প্রাপ্ত হওয়া ; পীত জ্বর ; স্নায়বিক জ্বর বা জ্বরবিকার, পিত্তজ্বর অথবা স্বপ্ন বিরাম জ্বর ; সাংঘাতিক আকারের আরক্ত জ্বর ; পূর্ব দ্বারা রক্ত বিষাক্ত হইয়া অস্থি, বা পাইমিয়া (Pyæmia) ; কামলরোগ ; রক্তের হীনাবস্থার দরুণ রক্তস্রাব ; মূত্রে আلبুমেনের সঞ্চার (Albuminuria) ; রক্ত বৃদ্ধভাগ ; মূত্রাবরোধ ইত্যাদি অস্থি ক্রোটেলাস্ হরিডাস্ ব্যবহার্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । হাত পায়ের পাতাদি প্রদাহযুক্ত, ক্ষীণ এবং গঢ়াযুক্ত (আন্, ল্যাক) ; সামান্য কারণেই হাত (প্রধানতঃ বাম

হাত) অবশ বা অসাড় হয়; বিশ্রাম কালীন হাত কাঁপে; সমুদয় শরীরের শোথের স্থায় স্বীতি (এপিস্, আন্স্); চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখগন্ধর, মূত্র-নালা ইত্যাদি শরীরের সমুদয় স্বাভাবিক ছিদ্র দিয়া রক্তস্রাব; দন্তমাড়ি এবং নখের নীচ দিয়া রক্তস্রাব; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই ক্লান্ত হওয়া; পার্শ্বাঙ্গিক বলক্ষয়; পেশীগুলি আপন আপন কার্য্য করিতে পারে না; সমুদয় শরীরের কম্পন সহ দুর্বলতা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন কোন বিশেষ অনিষ্ট শীঘ্রই ঘটিবে; পক্ষাঘাত; সমুদয় শরীর হরিদ্রাবর্ণ হওয়া।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। এপিস্, আর্সিনিক, কার্বো বেজিটে-বিলিস্, ল্যাকেসিস্, চেনিডোনিয়াম্, নেজা, ইলাপ্স্, টারেন্টুল্লা।

প্রতিষেধ ঔষধ। আনোনিয়াম্, ক্যাম্ফার, সুবা।

ডাইলুশন বিচার। ডাক্তার হিউজের (Dr. Hughes) মতে ইহার ১ম তিন ক্রম অর্থাৎ ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রম ব্যবস্থা। কোন কোন চিকিৎসক ইহার ৬ষ্ঠ এবং ১২ ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্বেথক এই ঔষধ কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। অতএব ইহার কোন ক্রম উপকারী সে সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না।

কোপেইবা,-কোপেইব্

(COPAIBA, -COPAIB.)

কোন এক বিধস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত ওলিয়ো রেজিন্ (Oleo-resin) কোপেইবা ক্রয় করিয়া যথানিয়মে আব্‌সোলিউট্ অ্যালকোলে (Absolute Alcohol) ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত করিতে হয়। ২য় এবং ততোধিক শতভাগিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে রেক্টাইফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া; ব্যবহার ইত্যাদি। ইহা মূত্র যন্ত্রের শৈল্পিক ঝিল্লীকেই বিশেষরূপে আক্রমণ করে। মূত্রনালীর উপরই ইহার কার্য্য সর্বাধিক প্রবল এবং অত্যাধিক মূত্রযন্ত্র অপেক্ষা মূত্রকোষের উপর ইহার কার্য্য

অত্যন্ত মুহূ। অনেক দিন এই ঔষধ সেবনে ইহা মূত্র নিঃসরণ স্বাভাবিক করে, আবার কখন কখন মূত্রাবরোধ এবং রক্তমূত্রও উৎপাদন করিতে পারে। মূত্রযন্ত্রের মধ্যে মূত্রনালীর উপরই টেহার কার্য অত্যন্ত প্রবল। ইহা কখন কখন শুক্ৰ নিঃসারক যন্ত্র এবং অণুকোষও আক্রমণ করিয়া থাকে, যাহার দরুণ অণুকোষ ক্ষীণ এবং বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে। ডাক্তার পেরেরার (Dr. Pereira) মতে বালুগ্রাম্ কোপেইবাতে বাতরোগও উৎপন্ন হইতে পারে। জীলোকের প্রমেহ রোগ এবং শ্বেত পদমে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ইহা শ্বাস যন্ত্রের শৈল্পিক বিল্লীও আক্রমণ করিয়া থাকে, যাহার দরুণ কণ্ঠনালী এবং বায়ু উপনল আক্রান্ত হইয়া কণ্ঠনালী ও বায়ু উপনলে উত্তেজনা, কণ্ঠনালী, বায়ু উপনল এবং বৃক্কের মধ্যে শুক্ৰবাহ, স্বরভঙ্গ, কণ্ঠদায়ক শুক্ৰকাশি ও গলা দিয়া পূর্ণ সংযুক্ত, সবুজের আভায়ুক্ত বমনোৎপাদক শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

টেস্টার (Teste) মতে বায়ু উপনলের অস্থখে কোপেইবা অত্যন্ত উপকারী। যে প্রকার বায়ু উপনলের পুরাতন প্রদাহে জর বর্তমান থাকে, তাহাতে স্টিলি (Stille) মতে কোপেইবার ত্রায় সমুপকারী ঔষধ নাই। মূত্রযন্ত্রের, প্রধানতঃ মূত্রনালীর, শ্লেষ্মাজনিত অস্থখে কোপেইবা এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, মূত্রনালী এবং মূত্রপথের গ্রীবার উত্তেজনার এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন। মুখমণ্ডলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণের ত্রায় ফুস্কুড়ীর চিকিৎসায় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। কোন প্রকার জ্বপীচ্য আহার দ্রব্য দ্বারা আমবাতের ত্রায় ফুস্কুড়ীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের পুরাতন আকারের আমবাতের চিকিৎসায় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। কোপেইবার কার্যের সঙ্গ ক্যানাবিস্ ত্রাটাইবা, ক্যান্টারিস্ এবং ট্রিবিটিনার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ১ম দশমিক ক্রমের আরোকই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রমেহ রোগে ডাক্তার ইল্ডাম্ (Dr. Yoldham) ১ম দশমিক ক্রমের আরোক, ১০ হইতে ২০ ফোঁটা, এক এক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কোরেলিয়াম্ রুড্রাম্,-কোরেল্

(CORALLIUM RUBRUM,-CORAL.)

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত কোরেল জ্বর করিয়া যথানিয়মে স্রাব্য অৰ্শ্মিকের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার মিশ্র গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাংলিয়োনিক স্নায়ু মণ্ডল (Ganglionic System of nerves) দিয়া ইহা স্বাস যন্ত্রকে আক্রমণ করিয়া থাকে, বাহ্যিক দ্রবণ শ্বাসকষ্ট এবং আক্লেপিক আকারের কাশি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। তাড়াতাড়ি চলিলে বা মাথা ঝাকিলে মনে হয় যেন মাথার হাড়ের মধ্য দিয়া বাতাস বহিয়া যাইতেছে; মাথা স্বাভাবিক অপেক্ষাও তিনগুণ বড় বলিয়া অনুভূত হয়; অত্যন্ত প্রবল শিরঃপীড়া, বাহ্যিক দ্রবণ রোগী মাথা এপাশ ওপাশে বারবার ঘূরাইতে বাধ্য হয় এবং যাহাতে কোন উপশম বোধ হয় না, কিন্তু অত্যন্ত উষ্ণ শরীর হইতে কাপড় তুলিয়া দিলে মাথা বেদনার ক্ষণিক হ্রাস হয়; অত্যন্ত প্রবল শিরঃপীড়া, বাহ্যিক দ্রবণ মনে হয় যেন মাথার হুই পার্শ্বে হাড় ভাঙ্গিয়া স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে এবং মাথা ছোট করিয়া উগুড় হইয়া থাকিলে বাহ্যিক বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু। চক্ষু উষ্ণ এবং বেদনাযুক্ত ও মনে হয় যেন চক্ষু জলে ভাসিতেছে; বামচক্ষুর কোটরের বহির্দেশের প্রাচীরে কদিয়া ধরার দ্বারা বেদনা যাহা গালের হাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

নাসিকা। শুকনা সর্দি এবং তদ্রূপ নাসারক্ত বৃদ্ধ হইয়া থাকা; নাসারক্তের মধ্যে ক্ষত; তরল সর্দি এবং নাক দিয়া ধূপধে সাদা তরল স্লেমা নির্গমন; নাক দিয়া রক্তস্রাব, প্রধানতঃ রাত্রিতে।

মুখমণ্ডল। মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁতলিয়া গেলে যেরূপ হয়, গালের হাড়ে সেরূপ বেদনা, স্পর্শনে বাহ্যিক বৃদ্ধি হয়; মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁতলিয়া গেলে যেরূপ হয়, মাড়ি সঞ্চালনের সময় বাম মাড়িও সন্ধিতে সেরূপ বেদনা।

গলারমধ্য । গলার মধ্যস্থিত বাম পার্শ্বের হস্তাঙ্কিত নিম্নস্থিত গ্রন্থি বক্ষীতি এবং উহাতে গিলিবার সময় বা ঘাড় সমুখপানে হেট বা বাঁকা করিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষাঙ্গের মাথায় এবং উহার আবরক চর্মের মধ্য দেশে বেদনায়ুক্ত, লালবর্ণ এবং ক্ষীত ও উহা হইতে হরিদ্রার আভায়ুক্ত সবুজ বর্ণের তুর্গন্ধযুক্ত পুঁথ বা ক্রেদ নিঃসরণ; পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ এবং উহার আবরক চর্মের মধ্যদেশে লাল চেপ্টা ক্ষত এবং উহা হইতে হরিদ্রার আভায়ুক্ত কল্তানি পড়া ।

শ্বাসযন্ত্র । দীর্ঘ নিশ্বাসে মনে হয় যেন বায়ু নলার মধ্য দিয়া বরফের ত্রায় শীতল বাতাস বহিয়া বাহিতেছে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃকালে কাশির উদ্রেক ও অতি কষ্টে বায়ু উপনল হইতে শ্লেষ্মা তোলা; শ্বাসরুদ্ধ বা নিশ্বাস প্রস্থাসে অত্যন্ত কষ্টবোধ, আক্কেপিক কাশি, থাকিয়া থাকিয়া বাহার উদ্রেক হয় (ডিসিরা, অস্মিয়াস) ।

ব্যবহার । ছপিং কফ বা কাশি; হিষ্টিরিয়া; হাঁপানি কাশি; দ্রাবিক কাশি; সর্দি; ব্যালানাইটিস (Balauitis); পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে গরমীর কোমল ঘা (Soft-Chancre) । ডাক্তার হিউজ্ বলেন যে, “হিষ্টিরিয়া জনিত বা অজ্ঞাত প্রকারের আক্কেপিক কাশির চিকিৎসায় কোরেলিয়াম আমার নিকট একটা অত্যন্ত প্রিয় ঔষধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহা ব্যবহা করিয়া আমি কখনও নৈরাশ হই না ।” নাক দিয়া রক্ত পড়া এবং কখন কখন নাকের ঘায়েও এই ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । নাইট্রিক্ আসিড্, আট্রোপিয়া, ডিসিরা, হায়োনারেমাস্, নাক্স-বানকা, বেগাডোনা ।

ডাইলুশন বিচার । টেষ্টের (Teste) মতে শিশু ও ছোট বালক বাচ্চিকাঙ্গের অস্থে ৩০ ক্রম উপকারী । লেখক ৬ এবং ১২ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) ১২ ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

ষ্ট্রিক নিয়া,-ষ্ট্রিকনিয়া

(STRYCHNIA,-STRYCH.)

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি । হেনরি রবিন্সন (Henry Robinson) লাইকার ষ্ট্রিকনিয়া ১ একটা পুরুষ এবং অপরটা স্ত্রীলোকের অস্থ শরীরে পরীক্ষার বিষয় লিখিয়াছেন, যে আক্ষেপ (যাহা শুধেই অত্যন্ত প্রবল কষ্টকর এবং হঠাৎ হইয়াছিল) ব্যতীতও অগ্রাগ্র লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। ভারতবর্ষে বিকারের লক্ষণাক্রান্ত যেরূপ সবিরাম জব হইয়া থাকে, ষ্ট্রিকনিয়া সেবনে উক্ত পুরুষ পরীক্ষকটিরও সেরূপ হইয়াছিল এবং জর ছাড়িয়া যাওয়ার পরও মূত্রবস্ত্রে উত্তেজনা হইয়া অণ্ডকোষ এবং শুক্র নিঃসারক স্ত্রোত্রেও প্রদাহ হইয়া অণ্ডকোষাধারের চর্কিবৃত্ত অংশে (Cellular-tissue) একটা কোড়া হইয়াছিল। উক্ত অস্থাদির সঙ্গে সঙ্গে অনবরত মাথায় পূর্ণবোধ এবং মাথা বেদনা ছিল, যাহার দরুন মাথা ফাটিয়া যাইবে এরূপ অনুভূত হইত এবং চক্ষে উষ্ণানুভূত হইত; যেকদণ্ডের মধ্যদিয়া বরকের তায় ঠাণ্ডা বোধ হইত; বুক ফাটিয়া যাওয়ার তায় কাশি, সমুদ্র শরীরে চুলকানি, প্রধানতঃ নাসিকার, দন্তশূল্যের প্রবল অক্রমণ, প্রধানতঃ উপরের শাব্দির দাঁতে ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল।

ডাক্তার হিউজ (Dr. Hughes) বলেন যে, আক্ষেপিক হাঁপানি কাশি এবং ধনুষ্ঠকারে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ২২০ পৃষ্ঠায় নাক্স-বরিকা নানক ঔষধের বিবরণ দ্রষ্টব্য। মৃগী রোগেও এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে বলিয়া কোন কোন চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। মৃগীরোগে এই ঔষধ দ্বারা উপকার হওয়া অসম্ভব নহে। লাইকার ষ্ট্রিকনিয়ার (Liquor Strychnia) ১ ফোঁটাকে ১৬ ভাগ করিয়া এক মাত্রা রোগের অবস্থা অনুসারে সেব্য। লেখক স্বয়ং এই ঔষধ কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। অতএব ইহার গুণাগুণ এবং মাত্রা সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না।

এলিয়াম্ সিপা,-পেঁয়াইজ,-এলিয়াম্ সিপা

(ALLIUM CEPA,-ONION ; ALLI.-CEPA.)

যে প্রকার পেঁয়াইজ খুব বড় এবং লালচে ও যাহার গন্ধে নাকে অত্যন্ত ঝাঁজ লাগে, সে প্রকার পেঁয়াইজের কোষই ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য। পেঁয়াইজ ১ভাগ, ২০ ভাগ প্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। চক্ষুর যোজক ঝিল্লী এবং স্বাসযন্ত্রের শৈল্পিক ঝিল্লীই ইহা অত্যন্ত প্রবল রূপে আক্রমণ করিয়া থাকে, যাহার দরুন উক্ত শৈল্পিক ঝিল্লী গুলি আক্রান্ত হইয়া তরুন নর্দীর লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্বদা স্তব্ধভাবে থাকা (ইগ্নেস্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-মক্)।

মস্তক। মাথায় গোলমেনে বোধ; সর্দির সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরা; সন্ধার সময় ঘরের মধ্যে থাকিলে উক্ত প্রকারে মাথা ধরা, বহির্দ্বারে যাহার উপশম হয়, উষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিলে যাহার পুনরায় বৃদ্ধি হয় (পাল্‌স্); কপালের দুইপার্শ্বে বেদনা, ডাইন পার্শ্বেই যাহা অধিক অনুভূত হয়, চক্ষু টিপাইলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং কপাল পর্যন্ত যাহা বিস্তৃত হয় ও বাম পার্শ্বে যাহা অধিক অনুভূত হয়।

চক্ষু। চক্ষু দিয়া প্রচুর জল পড়া; বাম চক্ষু দিয়াই অধিক জল পড়ে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু গোলক লালবর্ণ হয় ও উহাতে আলোক সহ্য হয় না (একন্, বেল্), সন্ধার সময় যাহার বৃদ্ধি হয়; চক্ষে চুলকানি, কামড়ানি এবং জালা; চক্ষুর পাতাব চতুর্দিক ক্ষোত (আস্)।

নাসিকা। নাকদিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল স্লেথ্মা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া (একন্, ইউফ্রেস্); অনবরত হাঁচি দেওয়া এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল স্লেথ্মা নির্গমন (এইলাছ্, স্নাইগ্, অরাম্, মার্ক্, সাঙ্গুনেরিয়া, স্কুইল্); উষ্ণ ঘরে থাকিলে উক্ত প্রকারের সর্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি; নাক দিয়া ছানার জলের ত্রায় পর্দার আকার বিশিষ্ট পদার্থ নিঃসৃত ক্রেন নিঃসরণ; আরক্ত

জরের দ্বিতীয়াবস্থা (এইলাইট্, এরাম্) ; তরল সর্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে তরল শ্লেষ্মা নির্গমন, মাথা ধরা, চক্ষুদিয়া জল পড়া, কাশি, শরীর উষ্ণ, পিপাসা, হাত কাঁপা, সন্ধ্যার সময় এবং ঘরের মধ্যে থাকিলে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং বহির্কোণ্যুতে বাহার উপশম হয় (পালস্) ।

গলার মধ্য । গলার মধ্যে বেদনা, যাহা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (ক্যালী-বাই) ।

পাকস্থলী এবং উদর । ছষ্টকুধা ; পাকস্থলীতে চাপাবোধ ; পাকস্থলীর পাইলোরাম্ (Pylorus) নামক অংশে বেদনা । অস্ত্রের মধ্যে গড়্গড়, কল কল শব্দ হওয়া ; গুহদ্বার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ ।

মূত্রযন্ত্র । বারবার প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ (এপিস্, আর্জেণ্ট-মেট্, আর্জেণ্ট-নাইট্রিক্, ফস্-আস্) ; মূত্র লালবর্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ও মূত্রনালীতে জ্বালা (একন্, ক্যাছ্) ।

শ্বাসযন্ত্র । সর্দিজনিত স্বরভঙ্গ (এরাম্, কণ্ঠ, কার্কো-বেজ্, ফস্) ; গলার মধ্যে হুড়্হুড়ী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীতে কন্কনানি ; নিশ্বাস দ্বারা ঠাণ্ডা বাতাস টানিলে খুশ্‌খুশ্‌ কাশি (একন্) ; সর্বদা গলায় থেকুর দেওয়ার ইচ্ছা ; সর্দিজনিত প্রবল কণ্ঠনালী প্রদাহ ; স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাশিতে যেন কণ্ঠনালী ছিঁড়িয়া যায় ; বুকের ঠিক মধ্যভাগে চাপ পড়ার দরুণ শ্বাসকণ্ঠ ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, প্রধানতঃ বাহ্যতে, ক্রান্তিবোধ এবং টাটানি ।

চর্ম্ম । অলপিন ফুটিলে যেরূপ হয়, গায় সেরূপ কুট্‌কুট্‌ করা, আক্রান্ত স্থান লালবর্ণ ; গায় আমবাতির ছায় ফুসুড়ী ।

ব্যবহার । ঐঐদিক ঝিল্লার প্রদাহ এবং উহাতে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চার ; সর্দি ; তরুণ প্রবল শ্লেষ্মা জনিত রোগ ; হাম ইত্যাদি অস্থখে এলিয়াম্ সিপা ব্যবহার্য্য । ডাক্তার ডান্‌হাম্ (Dr. Dunham) বলেন যে, যে প্রকার সর্দিজনিত শুষ্ক কাশিতে কণ্ঠনালী ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া অস্বভূত হয়, সে প্রকার কাশিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । আক্রান্ত স্থানে স্ফুটীবিধানের জ্বাৰ বা আলায়ুক্ত যাতনা ও কন্কনানি ; সমুদয় শরীরেই দমকা উষ্ণাত্তব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা ; অত্যন্ত দুর্বল এবং ক্লান্তিবোধ, যাহার দরুণ শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় ; সর্দি লাগিব সময শবীর ক্রম বা একবার সীত-বোধ এবং একবার উষ্ণবোধ ; সমুদয় শরীরেই স্নায়ুশুলের জ্বাৰ বেদনা ; সন্ধাব সময় এবং উষ্ণ ঘবে অস্থখের বৃদ্ধি ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ইউফ্রেসিয়া, আর্সিনিক্, ক্যানী অ্যারো-ডাইড্, একোনাইট্, কষ্টিকাম্, ইপিকাকিউএনা, কঙ্করাম্, পাল্‌মেটিগা ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আর্বিকা, ক্যানোমিলা, বিরেটাম্ অ্যাগ্-বাম্ ।

ডাইলুশন বিচার । ৩৫ ও ৬৪ ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অনেক সময় কাঁচা পেঁয়াইজের আদত রস, ২০ ফেঁটা মাত্রায় সেবনে তরল সর্দিতে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা গিয়াছে । কাঁচা সর্দি লাগিলে এতদ্দেশের বৃদ্ধা জীলোকগণ শিশুগণকে কাঁচা পেঁয়াইজের রস ১১৥ ভরি পরিমাণে খাওয়াইয়া থাকেন এবং উহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইতেও লেখক দেখিয়াছেন । এবিষয় চিকিৎসক মাত্রেই স্বরণ রাখা এবং পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য । পেঁয়াইজের টাট্কা রস স্পিরিট মিশ্রিত আরোক অপেক্ষা অধিক উপকারী, চিকিৎসার ফল দেখিয়া লেখক এরূপ বিশ্বাস করেন ।

এলিয়াম্ স্যাটাইবাম্,-রসুন,-এলিয়াম্ স্যাট্

(*ALLIUM SATIVUM*,—GARLIC,—*ALLI-SAT*.)

রসুনের পাকা কোষ দিয়া যথানিয়মে এলিয়াম্ সিপার জ্বাৰ নিয়মে আদত বা মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি । ইহা স্তম্ভ শরীরে সেবনে উদ্গার উঠে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠে ; প্রচুর পরিমাণে সাদা মূত্র নিঃসরণ, যাহাতে নাইট্রিক্ অসিড্ মিশাইলে ঘোলাটিয়া

(Cloudy) হয়; প্রবল কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া চট্‌চট্‌য়া আঠা প্লেগ্মা নির্গমন ও পঁজরার নীচে বেদনা, স্তনের ক্ষীতি এবং উহাতে বেদনা বা টাটানি ও সোরাস্ এবং ইলিয়েকাম্ নামক পেশীতে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। যে প্রকার পুরাতন আকারের কাশিতে গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে প্লেগ্মা নির্গত হয় এবং সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই সর্দি লাগে, তাহাতে এলিনয়াম্ সেটাইবাম্ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। এতদ্ব্যতীত বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ শিশুগণের প্লেগ্মা জনিত অসুখে পের্গাইজের স্নায় রসুনের রস ও সচরাচর ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন এক্রপ দেখিতে পাওয়া যায়। পিট্রোজ্ এবং টেস্টি (Petroz and Teste) ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক ব্যবহার করিয়া থাকেন। লেখক এই ঔষধ কখনও স্বয়ং ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই, অতএব ইহার মাত্রা সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না।

আপোমর্ফিয়া,-আপোমর্ফ্

(Apomorphia, -Apomorph.)

আফিমে যে সকল সার পদার্থ আছে, তন্মধ্যে আপোমর্ফিয়াও উহার একটা সার পদার্থ মধ্যে পরিগণিত। ইহা সচরাচর গুঁড়ার আকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আরোকও প্রস্তুত হয়।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি। মস্তিষ্কে আবের (Tumour) দ্রবণ বমন; মস্তিষ্ক এবং অন্ত্রাশ্রয় যন্ত্রের উত্তেজনা হেতু বমন; পাকস্থলীর উত্তেজনা হেতু বমন ইত্যাদি অসুখে আপোমর্ফিয়া ব্যবহার্য। সমুদ্রদিয়া জাহাজাদিতে আরোহণে ভ্রমণের দ্রবণ বমন বা বমনোদ্বেগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার ৩য় ক্রম উপকারী। গর্ভাবস্থার বমন এবং বমনোদ্বেগে এই ঔষধের ৩য় ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইন মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া ৫।৬ টা যৌগীর চিকিৎসার লেখক আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন।

আসেরাম্ ইউরোপিয়াম্,-আসের

(ASARUM EUROPEUM,-ASAR.)

এই গাছের সমুদয় অংশ যথানিষমে প্রফ্ স্পিরিটে ডিজাইরা মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । বিরেট্রাম্ এবং ইলেকটেরিয়ামের জার আসে-
বাম্ ও যে সমুদয় শৈল্পিক বিলীর এক স্থানিক উত্তেজক (Local-irritant)
ঔষধ তাহা বোধ হয় বিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন । ইহা নাসি-
কার বোজক বিলীর স্বাভাবিক নিঃসরণ বৃদ্ধিকারক (Errhine,) বমনোৎ-
পাদক (Emetic) এবং রেচক (Purgative) ঔষধ বিশেষ । সুস্থ শরীরে এই
ঔষধ খাওয়ার পর হোমিওপ্যাথির আবিষ্কৃত হানিমানের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতি-
রিক্ত চেতনা, সার্ভাস্টিক শীতবোধ, কিন্তু পিপাসার অভাব ; মস্তিষ্কের কার্য্যে
জড়তা বা অবসন্নতা এবং উদার সঙ্গে সঙ্গে মাথায়া ভারিবোধ সম্বলিত মাথা-
ধরা ; দৃষ্টির দুর্বলতা বা হীনতা এবং চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক কাঁপনি ;
শ্রবণশক্তির অত্যন্ত হ্রাস ; প্রচুর শ্লেষ্মা ভেদ (হরিত্রা বর্ণের অল্প পরিমাণে
রসির জার এক নাগে শ্লেষ্মা ভেদও এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক
লক্ষণ বলিয়া হেল্ন্স নিউ রেনিডিজ্ (Hale's "New-Remedies") নামক
গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়) ; হৃৎকূপে স্থলীবিধানের জার প্রবল বেদনা বা
যাতনা ; পৃষ্ঠদেশ এবং পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গের পেশীতে অত্যন্ত বেদনা
ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল । যাতায়াতের সর্ব্বদা শীতবোধ হয়
তাহাদিগের অন্ত্রের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী । চক্ষুরোগে অস্ত্র
চিৎসার পর চক্ষে অস্ত্র বা ছুবি বিধানের জার বেদনার পক্ষে এই ঔষধ
বিশেষ উপকারী । মদ্যপানে অত্যাচার জনিত অন্ত্রের বিশেষ উপকারী
যদিয়া কনিয়া দেশের লোকেরা এই ঔষধ বিস্তৃতরূপে ব্যবহার করিয়া
থাকেন ।

ইহা মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জাসম্বন্ধীয় স্নায়ু মণ্ডলী আক্রমণ করে ।
ইহা আহার বহা নালীর (Alimentary Canal) শৈল্পিক বিলী বিশেষরূপে
আক্রমণ করিয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । আন্তে আন্তে ঘুমাইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, মন হইতে আন্তে আন্তে চিন্তাদি সেরূপ দূরীভূত হয় ।

মস্তক । মাথায় চাপিয়া ধরার স্থায় বেদনা, কপালের বাম পার্শ্ব এবং কর্ণের পশ্চাত্তাণেই বাহা অধিক অনুভূত হয় ; মাথার হাড়ের আঁটা-বোধ (কষ্ট), যাহার দরুণ চুলের গোড়া বেদনাবুদ্ভূত হয় ।

চক্ষু । চক্ষুর মধ্যদেশে কষ্টদায়ক শুষ্কবোধ ।

কর্ণ । কানের মধ্যে চাপা এবং কনিয়া ধরার স্থায় অনুভূত হয় ।

মুখগং্গস্থর । মুখে বিশ্রী বমনোৎপাদক স্বাদ ।

পাকস্থলী । বমনোদ্বেষ্ট এবং বমনের ইচ্ছা ; বারম্বার কাঠ উদ্গার উঠা ; আহারের অনিচ্ছা, এমন কি আহার জব্য দেখিলেও বমনোদ্বেষ্ট হয় ; কাঠবম্বী এবং কাঠবম্বীর সময় সমুদয় লক্ষণ বা উপদ্রবের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু মাথায় অবসন্ন বোধ কমিয়া যায় ; পাকস্থলীতে কঠিনবৎ শ্রবণ বেদনা এবং টহার সঙ্গে সঙ্গে বমন ; মদ্যপানের অনিবার্য ইচ্ছা (কার্বোলাক্-আস) ।

মল । দান্তের পূর্বে উদরে কঠিনবৎ বেদনা এবং গুহোর মধ্যে স্ফূর্তিবিশ্বানের স্থায় যাতনা, যাহা উপর হইতে নিম্নদিকে বিস্তৃত হয় ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেন হাল্কা বা পাতলা বোধ হয় (মেজিরিয়াম্) ; চলিবার সময় মনে হয় যেন বাতাসের মধ্য দিয়া গড়াইয়া যাওয়া হইতেছে ; ডাইন উরুর সন্ধিতে ঘুশ্-ঘুশ্ বেদনা বা চাপাবোধ ।

ব্যবহার । পাকস্থলী এবং যকৃতের যে প্রকার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক মণ্ডলী সহজেই উত্তেজিত বা অবশ্য হইয়া থাকে, তাহাতেই আসেরাম্ বিশেষ উপকারী । মদ্যপানে অত্যাচার শ্রুতি অনুযায়িত ইহা বিশেষ উপকারী ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সমুদয় স্নায়ুর অতিরিক্ত চেতনা (চায়না, ক্রিয়া) ; কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় নক দিয়া বিছানার কাপড়াদি চুলকানের স্থায় আচড়াণ এবং যাহার দরুণ রোগীর এমন একটা ভাব অনুভূত হয়, যাহার দরুণ রোগীর সমুদয় চিন্তা এবং কার্য্য বন্ধ হইয়া যায় ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। কুশ্মাণ্ড, নাক্স-বমিকা, কক্ষরাস্
পাল্‌সেটিল।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাফোর, বিনিগার এবং বেজিটেবেল্
আসিড্‌স্।

ডাইলুশন বিচার। ইহার কোন ক্রম উপকারী নৈ সম্বন্ধে লেখক
কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ তিনি এই ঔষধ কখনও ব্যবহার করিয়া
দেখেন নাই।

আস্ক্লিপিয়াস্ টিউবারোসা,-আস্ক্লিপ্-টিউবার (ASCLEPIAS TUBEROSA,-ASCLEP. T.)

এই গাছের কাঁচা শিকড় দিয়া মূল আরোক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।
শুকনা শিকড় যথা নিয়মে জুগার অব্ মিক্‌সের সঙ্গে মিলাইয়া নিম্ন গুঁড়াত্ত
প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা শৈথিল্যিক ঝিল্লীই অধিক আক্রমণ করে।
খাস বস্ত্র এবং অন্ত্রের শৈথিল্যিক ঝিল্লার উপরই ইহার কার্য্য অতি প্রবল।
মাস্তক অংশের (Serous Tissues) উপরও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া
যায়, কাহার দরুণ ইহা কুকুলাবরক ঝিল্লী এবং সাইনোব্রিয়াল্ ঝিল্লী (Syno-
vial membranes) আক্রমণ করিয়া উহাতে কতক পরিমাণে পুতান
আকারের (Sub-acute) প্রদাহ উৎপাদন করিয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। চিন্তা এবং স্মরণ শক্তি হ্রাস; প্রথমতঃ উন্মাদ এবং তৎপর
খিট্‌ খিট্‌, চিড়চিড় করা।

মস্তক। মাথায় চিমা, গোলঘেলে এবং ভারি বোধ; মাথায়
যেন কোন প্রাণী হামা দিয়া যাইতেছে এরূপ অল্পভূত হয়; কপালে এবং
মাথার উপরিভাগে যুশ্‌যুশ্‌ বেদনা, নড়া চড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং
শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার উপশম হয়। মাথা বেদনা, যাহার দরুণ মনে
হয় যেন মাথার ঠিক নিম্নভাগ কেহ সজোরে চাপিতেছে (ইপিকাক্‌);
কাশিলে কপালে বেদনা (ব্রাই)।

চক্ষু । চক্ষে যেন টিমা ও ভারিবোধ হয় ; চক্ষু প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে চুলকানি এবং বেদনা ; বালি প্রবেশ করিলে ঘেকুণ হয়, চক্ষে সেকুণ চাপা বোধ ; দেখিতে ব্যাকাত জন্মে ; চক্ষুর সম্মুখে বড় বড় কালচে দাগ দেখায় ।

নাসিকা । সর্দি এবং তদ্রূপ বারবার হাঁচি ও নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল স্লেয়া নির্গমন (একন্) ; নিশ্বাস ত্যাগ করার সময় বাম নাসারক্ষু দিয়া রক্ত নির্গমন ; নাকের মধ্যে চুলকানি (সাল্ফ) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের মৃদবৎ আকার (আর্স, ক্যাক্সার, বিরেট্-আক্) ; মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ (চেলিডন্) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁত হরিদ্রাবর্ণ ; মাড়ি দিয়া রক্ত পড়া ; জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণের কঠিন লেপযুক্ত ; মুখে পচা স্বাদ (আর্গিকা, মার্ক, গাল্ফ) ; মুখে রক্তের স্বাদ । গলার মধ্যে সামান্য রক্তের আঁটা বোধ এবং কণ্ঠনালীতে কঁটা বিধানের আশ কুট্-কুটানি ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা শূন্যতা ; উদগার উঠা ; বমনোদ্বেগ এবং বমনের চেষ্টা ; পাকস্থলীতে স্নায়ুশুলের স্নায় বা চাপিয়া ধরার স্নায় বেদনা এবং ভারিবোধ (আর্স, ব্রাই, নাক্স-বন্, গাল্ফ) ; পাকস্থলীতে জ্বালা (আর্স, কল্চ্) । অস্ত্রের মধ্যে গড়্-গড়্, কল কল শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে অত্যন্ত অস্থির এবং প্রথর কণ্ঠনবৎ বেদনা ; উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চারের দরুণ শূল বেদনা (আলোজ্, কার্কো-বেজ্, লাই-কোপ্) ; চাপিলে অস্ত্রে যুগ্মবেদনা ।

মল । গুহ্বার দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আর্গিকা, আলোজ্, ব্রাই, কার্কো-বেজ্, গ্রাফ্) ; পূর্বাঙ্ক ১১ টার সময় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত কোমল মলত্যাগ এবং দাঁতের পূর্বে উদরে গড়্-গড়্, কল কল শব্দ হওয়া, মল আশায়ের স্নায় ; ডিমের সাদা লালের স্নায় ভেদ ; মল হরিদ্রাবর্ণ, চট্-চটিয়া পচা ডিমের গন্ধযুক্ত (ক্যাক্স-কার্ক, ক্যাম্) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রনালীতে ছুরি দিয়া কাটার স্নায় বেদনা বা ব্যতনা ; মূত্র কালচে লালবর্ণ এবং তলানি বিশিষ্ট ও সহজেই পচিয়া যায় ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষাঙ্গ, অণুকোষাদি কোমল তলতলে এবং

উহাতে গন্ধহীন ঘর্ষ, পুরুবাঞ্ছের দুর্বলতা ; পুরুবাঞ্ছ খাড়া হয়, কিন্তু উহা ব
সঙ্গে স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা একবারে থাকে না ।

শ্বাসযন্ত্র । শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে আঁটা
বোধ, বাহার দরুণ কপাল এবং উদরে বেদনার উল্লেখ হয় ; শুষ্ক খুশ্খুশে
কাশি ; নিশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর এবং বৃকের মধ্যে বাতনা, বায়ু ফুসুসের নিম্ন
ভাগেই বাহা অধিক অনুভূত হয় ; বৃকের মধ্যে গরম বোধ ; হাঁপানি কাশির
ভায়ে শ্বাসকষ্ট, থাকিয়া থাকিয়া বাহা অনুভূত হয় (আস্) ; বায়ু স্তনের বোঁটা
হইতে নিম্নদিকে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীবার বায়ু পার্শ্ব শক্ত হয় বা
উহা নোয়ান যায় না ; বক্ষস্থির পশ্চাৎভাগে কর্তনবৎ প্রথর বেদনা, দীর্ঘ
নিশ্বাস বা বাহু সঞ্চালনে ঘাতের বৃদ্ধি হয় ; বক্ষস্থির নিকটবর্তী পাজরার
হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে চাপ দিলে বেদনায়ুক্ত হয় এবং উক্ত তীক্ষ্ণ, হঠাৎ
আক্রমণকারী এবং ছুঁবী বিধানের ভায়ে বেদনা বৃকের ডাইন পার্শ্বে
সরিষা পড়ে ; বৃকে বেদনা, সমুখ পানে বাকিয়া পড়িলে বাহার উপশম হয় ;
বৃকের ডাইন পার্শ্বে ফুসুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ জনিত বেদনা এবং উহার
সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক খুশ্খুশে কাশি ও গলা দিয়া অল্প পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন
(একন্, ব্রাই) ; বৃকে ডায়েফ্রাম্ (Diaphragm) নামক গোল পেশীর
স্থান পর্য্যন্ত বেদনা ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপিণ্ডে আঁটা বোধের ভায়ে বাতনা ;
হৃৎপ্রদেশে ছুরিদিয়া কাটার ভায়ে বাতনা (একন্, ক্যাট্, ব্রাই, ক্যালী-
কার্ক্, স্পাইজেল্) ; নাড়ী সামান্য দ্রুতগামী হয় ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশে, দুই স্বন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে,
ছুরিদিয়া কাটার ভায়ে বাতনা ; কোমরে, শুষ্কদ্বারের ঠিক উপরিভাগে প্রথর
বেদনা ; কোমরে বাতের বেদনার ভায়ে বেদনা । ৮

হাত, পা ইত্যাদি । হাত পায়ের সমুদয় সন্ধিতেই বাতের
বেদনার ভায়ে বেদনা (একন্, ব্রাই, রাস্টক্) ; ডাইন স্বন্ধে খোঁচা বিধার
ভায়ে প্রথর বেদনা ; বায়ু স্বন্ধে বেদনা, বৃকের বায়ু পার্শ্ব হইতে বাহা
আরম্ভ হয় ।

জ্বর । শরীর অত্যন্ত শীর্ণ এবং দুর্বল, শীতবোধ এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; প্রবল জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ ঘর্ম ।

চর্ম । সমুদয় শরীরে ফোঁকাব ছায় বা ক্ষুদ্র ব্রণের ছায় ক্ষুদ্রী, বাহ, পা এবং মুখমণ্ডলেই যাহা অধিক হয়; গায় চুলকানি (সাল্‌ফ) ।

নিদ্রা । ঘুম ভাল হয় না এবং ঘুম হইলেও উহা দ্বারা শরীর সুস্থ মনে হয় না; অত্যন্ত কষ্টদায়ক স্বপ্ন দেখা ।

ব্যবহার । ক্ষুস্রস্রাবরক বিল্লী প্রদাহ; ক্ষুস্র প্রদাহ; বায়ু উপনল প্রদাহ; শিশুগণের ক্ষুস্রস্রের কৈশিক বায়ু উপনলের প্রদাহ (Capillary Bronchitis); হাঁপানির লক্ষণাক্রান্ত সর্দি; হৃৎপ্রদাহ; বাতজনিত হৃদযন্ত্র-বরক বিল্লী প্রদাহ; বাত এবং সর্দি জনিত জ্বর; কোমরে বাতের বেদনা; শ্লেষ্মা এবং পিত্তজনিত উদরাময়; অজীর্ণ ইত্যাদি অস্থখে আক্লিপিয়াস্ টিউবারোসা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অনেক দিন ধরিয়া অস্থখ হইলে যেরূপ হয়, সেরূপ হ্রস্বলবোধ এবং গা মাটি মাটি করা ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । একোনাইট্, আর্পিকা, আক্লিপিয়াস্ নিরিয়াকা, ব্রাইওনিয়া, সিমিসিফিউগা ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রম ব্যবহার্য্য । ইহার মধ্যে কোন ক্রম উপকারী সে সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি এই ঔষধ কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।

ব্যারাইটা আসেটিকা,-ব্যারাইটা-আসেট্

(BARYTA ACETICA,-BARYT.-ACET.)

কোন এক বিস্তৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধানয় হইতে আদত আসিটেট্ অন্‌ বেরিয়াম্ (Acetate of Barium) ক্রম করিয়া যথানিয়মে চূরান জলের সঙ্গে মিলাইয়া ইহা ১য় শততমিক ক্রমের "সলিউশন্" (Solution) প্রস্তুত হয় । ভাগ রেকটিকাইড্ স্পিরিট এবং ৯৫ ভাগ চূরান জল একত্রে মিলাইয়া, এই প্রকার মিশ্রিত স্পিরিটে যথা পরিমাণ ১ম শততমিক সলিউশন

বিশাইয়া ২য় শতভাগিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয়। ৫ম দশমিক ক্রমের আরোক পর্যন্ত ডাইলুট স্পিরিট ব্যবহৃত হয়। তৎপর রেক্টিফাইড স্পিরিট ব্যবহার্য।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি। আসিটেট অব বেরিয়াম্‌ই হানিমান এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ স্নায়ু শরীরে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বিযাক্ত হইয়া মরিলে রোগীর স্বৈচ্ছাপূর্বক অঙ্গাদি সকলনের সহায়কারী পেশীর সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হইয়া রোগীর সজ্ঞানে মৃত্যু হইয়া থাকে। ডাক্তার লাগার্ড (Dr Lagarde) এই ঔষধ তাঁহার আপন শরীরে পরীক্ষা করেন। ইহা সেবনের ৩ ঘণ্টাপর একপ্রকার অসুখ এবং সার্কাসিক দুর্বলতা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার পাতলা বোধ হইতে আরম্ভ হয়। উৰ্দ্ধ শাখা এবং মাথার হাড় ও মুখমণ্ডলের চর্মে নীচে কোন প্রাণী হামা দিয়া চলিয়া যাওয়ার স্থায় এক প্রকার স্ফুড়ী অনুভূত হইয়াছিল। তৎপর আবার ৩ ঘণ্টাপর উক্ত দুর্বলতা স্পষ্টতঃ বৃদ্ধি পাইয়া বামবাহ সঞ্চালন করিবার শক্তি একবারে বিনষ্ট হইল, কিন্তু উহাতে স্পর্শ জ্ঞানের কোনও বৈলক্ষণ্য হইল না। তাহার হাত দিয়া কোন দ্রব্য ধরিতে এবং বিজ্ঞানা হইতে নড়িবার শক্তি একবারেই রহিল না এবং এই ঔষধ খাওয়ার ৮ঘণ্টা পর হাত পা পক্ষাঘাতের স্থায় একবারে শক্তিহীন হইল। এই পক্ষাঘাত ক্রমে উদরে, তৎপর বুকে এবং গ্রীবাদেশে ও অবশেষে গুহদ্বার এবং মূত্রাধারের সঙ্কোচক বন্ধ (Sphincter) পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কাশি দেওয়া, থুঁথুফেলা এবং ২১টী শব্দের অধিক প্রয়োগ করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল; শ্বাস প্রস্থান কষ্টকর হইয়াছিল এবং মল মূত্র অনিচ্ছাপূর্বক বা অসাড়ো নির্গত হইয়াছিল এবং নাড়ী প্রতি মিনিটে ৫৬ বারের অধিক স্পন্দন করে নাই। উক্ত বিবরণ পাঠে ইহা প্রতিয়মাণ হয় যে, ব্যারাইট আসিটিকা পক্ষাঘাত এবং পক্ষাঘাত জনিত অসুখে ব্যারাইট কার্বোনিকা অপেক্ষাও অধিক উপকারী। ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক কিছু বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা কখনও স্বয়ং ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই।

ব্যারাইটা মিউরিয়াটিকা,-ব্যারাইটা-মিউর

(BARYTA MURIATICA,-BARYT. MUR.)

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত ক্লোরাইড্ অফ্ বেরিয়াম্ (Chloride of Barium) ক্রয় কবিয়া যথা নিয়মে চূয়ান জলে মিশাইয়া ইহার ১ম শতভাগিক ক্রমের সলিউশন্ (Solution) প্রস্তুত হইয়া থাকে। ২য় শতভাগিক ক্রমের সলিউশন্ পর্য্যন্ত ডাইলুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তৎপর রেক্টিফাইড্ স্পিরিট ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি। এই ঔষধের সাধারণ ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা এপর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে কিছুই জানি না। তবে ইহার গুঁড়া মেসেন্টারিক্ (Mesenteric) এবং অন্ত্র প্রকারের গ্রন্থির অনুরূপে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইতে দেখা যায়। নিউইয়র্ক্ (New-York) নিবাসী ডাক্তার হামণ্ড্ (Dr. Hammond) মস্তিষ্ক এবং কপেরকা মজ্জার স্কেলেরোসিস্ (Sclerosis) নামক অল্পে ২১১ গ্রেইণ মাত্রায় প্রতিদিন ২ মাত্রা ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়া থাকেন। এই ঔষধ সেবন করাইয়া একটা উদরস্থিত ধমনির প্রদাহ এবং বিস্তৃতির (Abdomenal Aneurism) চিকিৎসায় ডাক্তার ফ্লিন্ট্ (Dr. Flint) বিশেষ ফল পাইয়াছেন। ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক কিছু বলিতে পারেন না।

ব্যারাইটা আয়োডেটা,-ব্যারাইটা আয়োড্

(BARTYTA IODATA, BARTYT. IOD.)

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি। ডাক্তার হেল্ (Dr. Hale) বলেন যে, টনসিল্ (Tonsil), অণ্ডকোষ এবং কখন কখন প্রোষ্টেট্ গ্রন্থির (Prostate Gland) বিবৃদ্ধির চিকিৎসায় এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। যে প্রকার গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে জীবাবশেষ গ্রন্থিগুলি আক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহার চিকিৎসায়ও ইহা উপকারী। একটা ৩০ঃ৩২ বৎসর বয়স্ক রোগীর অণ্ডকোষের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতার চিকিৎসায় এই

ঔষধ ব্যবহার করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। অণ্ডকোষের ক্ষীতি এবং কঠিনতার সঙ্গে সঙ্গে টনিল্, গ্রীবা দেশস্থ গ্রন্থি, কুঁচ্কির গ্রন্থি (বাগী), বোগলের গ্রন্থিগুলিও ক্ষীত ও কঠিন হইয়াছিল। এই ঔষধ সেবনে যে কেবল অণ্ডকোষের ক্ষীতি এবং কঠিনতা সারিয়া গিয়াছিল এমন নহে, উক্ত অগ্নাত গ্রন্থির ক্ষীতি ও কঠিনতাও ও মান কালের মধ্যে সারিয়া গিয়াছিল। ইং ১৮৮৫ সনের ১৫ই জুন হইতে ১৮ট অক্টোবর পর্য্যন্ত উক্ত রোগীকে চিকিৎসা করা গিয়াছিল। সে বোগীটী অপৰ্য্যন্ত, (অর্থাৎ, ইং ১৮৯০ সনের ২০শে জুন পর্য্যন্ত) ভাঙ্গি আছে একপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং আগ্রানগরে সুস্থ শরীরে আপন কাজ কর্ম্ম করিতেছে।

বার্বেরিস্ বাল্ গারিস্,-বার্বের

(BERBERIS VULGARIS,-BERB.)

এই গাছের শিকড়ের ডাল অথবা বড় শিকড়ের বাকল যথানিয়মে ওল্ফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আবেক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাগ্লিরোনিক্ অ্যাস্ মণ্ডলীব মধ্য দিয়া ইহা কৈশিক শিরা গুলির বিবৃদ্ধি বা উদ্গতে রক্তাবিহা আনয়ন করে। ইহা যকৃত সঞ্চয়ক যন্ত্র, মূত্রকোথ এবং অগ্নাত মূত্র সঞ্চয়ক যন্ত্রের প্রৈম্নিক বোগক কিল্লীকে বিশেষ রূপে আক্রমণ করিয়া থাকে। গলার মধ্যের প্রৈম্নিক কিল্লী ও পেলীর উপরও ইহার বিশেষ পরাক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সকল বিষয়েই অমনোযোগ (ফন্স্, ফন্স্ অস্) এবং বৈরাগ্য।

মস্তক। মাথাধোরা এবং মাথা কিল্ কিল্ করা; মনে হয় যেন মাথা স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় হইতেছে; কপাল এবং কপালের দুই পার্শ্বে ছিঁড়িরা ফেলার স্থায় বেদনা, যাহা সকল সময়ে এক স্থানে থাকে না (শাল্ন্স্); কপালের ডাইন পার্শ্বে ঠাণ্ডাবোধ।

নাসিকা । নাকে শুষ্কবোধ ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল ফিকা বা মাটির রঙ্গের আয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গাল বসিয়া যাইয়া গঠের আয় হয় ও চক্ষু লাল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় (আস্, চায়না, সিকেল্, সাল্‌ফ্) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । ওষ্ঠ শুষ্ক; মুখে ভুলার আয় আঠা ফেণায়ুক্ত লাল উঠে । তালুকা এবং তালুকার পার্শ্বস্থিত গ্রন্থিদ্বয় (Palate and Tonsils) ক্ষীত এবং আগ্রের আয় লালবর্ণ; কথা বলিবার সময় বা গিলিবার সময় টনসিলে বেদনা; গলার মধ্যের এক পার্শ্বে ডেলার আয় একটা পদার্থ লাগিয়া থাকে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলাব মধ্য শুষ্কবোধ, শ্বশ্বে বোধ ও ছাল উঠিয়া বাতয়ার আয় অন্তর্ভূত হয় (বেল্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । পিপাসা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখগহ্বরে শুষ্কবোধ; উদগার উঠা । বক্রতের পিত্তাধার প্রদেশে চাপিয়া ধরার আয় প্রবল বেদনা (ব্যান্ট্); উদরের বাম পার্শ্বে বাটিয়া ধরার আয় প্রবল বেদনা যাহা অনেক সময় কোমর, কুঁচকি, যকৃত, প্লীহা অথবা পাকস্থলী পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; মেরুদণ্ডের নিকটবর্তী ইলিয়ামের (Ilium) গভীর প্রদেশে হইতে শুষ্কতার উপরিভাগ দিকে বাটিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার আয় প্রবল বেদনা ।

মল এবং মলদ্বার । বারিষাব বাহ্যের বেগ; চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে ক্ষত হইলে বেক্রপ হয়, শুষ্কভাবে সেক্রপ জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা; শুষ্ক দ্বার এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে ছিঁড়িয়া ফেলা, স্থচাবিধানের আয়, জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা বা চূষকানি; ভেড়ার মলের আয় কঠিন ও পরিমাণে অল্প মলত্যাগ (চেলিডন্, ওঁপ্‌থাম্, প্লাস্‌ম্); জলবৎ তরলভেদ (আস্, চায়না) ।

মূত্রযন্ত্র । এক বা উভয় মূত্রকোষ প্রদেশে বাটিয়া ধরা, খনন করা, ছিঁড়িয়া ফেলার আয় বা দপ্‌দপিয়া বেদনা; মূত্রাধাবে জ্বালাযুক্ত বেদনা; মূত্রকোষ হইতে মূত্রাধারে এবং মূত্রনালী পর্য্যন্ত বাটিয়া ধরার আয় বা কর্তনবৎ বেদনা; মূত্রনালীতে কর্তনবৎ বা জ্বালাযুক্ত যাতনা (ক্যানাবিন্‌-স্যাট্, ক্যাথ্); প্রস্রাব করার সময় কোমর ও কুঁচকিতে বেদনা; মূত্র ফিকা

হরিদ্রাবর্ণ এবং উহাতে সামান্য স্বচ্ছ, আঠা পদার্থ থাকে, কিন্তু উহাতে কোন তলানী পড়ে না, অথবা মূত্রে ঘোলাটীয়া গোলাবর্ণ ছায়, কাঁদার ছায় তলানী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সাদা বা সাদাটিলা ধূসর বর্ণের তলানী পড়ে ও তৎপর মূত্রে লালচে, ভাতের ফেনের ছায় তালানি পড়ে ; মূত্র উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ (আস্) ; মূত্র রক্তের ছায় লালবর্ণ এবং উহাতে প্রচুর পরিমাণে শ্লেমা তলানি পড়ে ।

জননেক্রিয় । পুরুষের পুরুষাঙ্গের শুক্রনিঃসারক স্ত্রে (Sper-matic Cord) কসিয়া ধরা বা ছুরি বিধানের ছায় বেদনা, যাহা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (হামামেলিস্, মার্ক্, পাল্) ; শুক্র নিঃসারক স্ত্রে চিড়িক মারা, জালাঘূত বেদনা এবং স্ত্রী বিধানের ছায় যাতনা ; জননেক্রিয় দুর্বল এবং শীতল (ক্যাপ্) । স্ত্রীলোকের যোনিদ্বারে জালা এবং টাটানি ও স্পর্শ করিলে উহাতে অত্যন্ত যাতনার উদ্রেক হয় ; অতি অল্প পরিমাণে রক্তঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাধকের বেদনা ; যোনিদ্বার দিয়া ধূসর বর্ণের শ্লেমা বা রক্তনিঃসরণ ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশে খেংলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ছায় বেদনা এবং কোমর সঞ্চালনে অশক্তি, যাহার দরুণ বসাব অবস্থা হইতে দাঁড়াইতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয় (রাস্-টঙ্ক্) ; পৃষ্ঠদেশে কন-কনানি, বসিয়া বা শুইয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (রাস্ টঙ্ক্) ; কোমর এবং মূত্রযন্ত্র প্রদেশে চাপিয়া বা কসিয়া ধরার ছায় যাতনা ও কখন কখন উহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্থানে অবশবোধ, ক্ষোতি, উষ্ণাভব, কঠিনতা এবং সঞ্চালনে অশক্তি, যাহা কখন কখন নিম্নাঙ্গ পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । হস্ত পদাদিতে ছিঁড়িয়া ফেলা, স্ত্রীবিধান বা চিড়িক মারার ছায় বা দপ্‌দপিয়া বেদনা বা যাতনা ।

ব্যবহার । পেশী এবং সন্ধিবাত ও উহার সঙ্গে মূত্র যন্ত্রের অসুখ, যে সকল রোগে মৌত্রিক যন্ত্রের অসুখের লক্ষণাদি স্পষ্টরূপে বর্তমান থাকে ; মূত্রাধার এবং পিত্তাধারে পাথরী (Stones in the Urinary and Gall-bladder) ; মূত্রকোষ প্রদাহ এক তদ্রূপ মূত্রকোষাদি প্রদেশে ভয়ানক বেদনা ; টন্সিল প্রদাহ (Tonsillitis) ; পিত্তদ্বন্দ্বীয় বগ্ন এবং পাকস্থলী ও

অস্ত্রের অস্থখ; কামল রোগ; পিত্তাধিক্য জনিত শূল বেদনা ইত্যাদি
অস্থখে বার্কেরিস্ বাল্গারিস্ ব্যবহার্য্য ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । নাক্স-বমিকা, ক্যান্‌দিকাম্, আলোজ্,
আসিনিক, ব্রাইডনিয়া, চায়না, পাল্‌সেটিল্য ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্‌ফার ।

ডাইলুশন বিচার । ডাক্তার হেরিংগের (Dr. Hering) মতে ৬
এবং ১২ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য । ডাক্তার ক্লিফটন (Dr. Clifton) বলেন যে,
যে পর্য্যন্ত মূল আরোক ব্যবস্থা না করা যায় সে পর্য্যন্ত এই ঔষধ দ্বারা
কোনও ফল পাওয়া যায় না । ডাক্তার হিউজ্‌ও (Dr. Hughes) ডাক্তার
ক্লিফটনের উক্ত মতের পোষকতা করেন । যে ২৩ টী রোগীর পিত্তশিলা
জনিত শূল বেদনার চিকিৎসায় লেখক অফল পাইয়াছেন, উহার সকল
রোগীকেই বার্কেরিসের মূল আরোক, ১ কোঁটা মাত্রায়, ব্যবস্থা করিতে
হইয়াছিল । উক্ত রোগীগণেব ১ম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম অনেক কাল
সেবনেও কোন উপকার দর্শে নাই ।

বোবিষ্টা,-বোবিষ্ট্

(BOVISTA,-BOVIST.)

ইউরোপের অনেকাংশের শুক মাঠ ময়দানে ইহা জন্মে । ইহা একটী
গোলার গ্রায় পদার্থ বিশেষ । ইহার মধ্যে তুলার গ্রায় পদার্থ থাকে, যাহা
ক্রমে কটাবর্ণ হয় এবং পাকিলে উহাতে প্রচুর পরিমাণে কটার
আভায়ুক্ত কাল মিহি গুঁড়ার গ্রায় পদার্থ উৎপন্ন হয় । এই গুঁড়ো
যথা নিয়মে সুগার অব্‌মিকের সঙ্গে মিশাইয়া মিশ্র গুঁড়ো প্রস্তুত হইয়া
থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা মস্তিষ্ক এবং কদেবকা মৰ্জ্জা আক্রমণ
করে । চন্দ্র এবং জ নেনক্লিয়ার উপর ইহার স্থানিক কার্য্য অতি প্রবল ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । বস। অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথাঘোরা এবং মাথায় অবসন্ন বোধ ; মাথাঘোরা এবং তদ্রূপ সম্মুখদিকে টলিয়া পড়া ; প্রাতঃকালে ক্ষণিক অচেতনতা ; মনে হয় যেন মাথা স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় হইয়াছে (অার্জেণ্ট্-নাইট্রিক্, সিমিসিফ্, গ্লোনয়েন, জিজিবার) ; মাথার গভীরতম অংশে বেদনা ; মাথার হাড় প্রবল চুলকানি, মাথা গরম হইলেই বাহ্যিক অধিক অহুত হয় ; চুলকাইলে কপালে ক্ষত হয় এবং চুলকাইলেও চুলকানির হ্রাস হয় না ।

কর্ণ । কান দিয়া হ্রগন্ধযুক্ত পুঁয় পড়ে (এরাম্, হিপ-সাল্ফ্, গ্রাক্, সোরিনাম্) ।

নাসিকা । প্রাতঃকালে নাক দিয়া রক্ত পড়া (একনু, বেণ্, হামামেগিস্) ; হাঁচি দিলে বা নাক ঝাড়িলে নাক দিয়া কোঁটায় ফোঁটার রক্ত পড়া ।

মুখমণ্ডল । প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলে মুখমণ্ডল ফিকা বা শিটা বলিয়া বোধ হয় ।

মুখগহ্বর । ছুরী দিয়া কাটিলে স্বেদরূপ হয়, জিহ্বায় স্বেদরূপ কঠিনবৎ বেদনা ; মাড়িতে ঘা এবং উহা হইতে সহজেই রক্ত পড়া (কার্বো-অ্যানিমেল্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্) ; ক্ষয় প্রাপ্ত দন্তে কসিয়া ধবার জ্বাব প্রবল বেদনা, বাতাসে এবং উত্তাপে যাহা কম থাকে এবং সন্ধ্যাব সময় বাহার বৃদ্ধি হয় ; মুখে অধিক পরিমাণে লাল উঠা ।

পাকস্থলী । বারম্বার কঠি উদ্গার ।

মল । মল প্রথমতঃ কঠিন এবং অতি কষ্টে নির্গত হয় ও তৎপর উহা জলবৎ তরল হয় ।

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের সময় এবং উহার পূর্বে প্রায়ই উদরাময় ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব (অ্যাস্, ক্যাক্-কার্ব্, নাক্স-বম্) ; প্রাতঃকালেই প্রায় রজঃস্রাব অধিক এবং দিনেরবেলা ও রাত্রিতে রজঃস্রাব কম হয় ; যোনির উপর দিক হইতে যেন কোন পদার্থ টেলিয়া নামার জ্বাব অহুত হয় এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে

জ্বরবোধ (বেগ); রক্তঃস্রাবের আভ্যন্তরিক কালে কখন কখন রক্তঃস্রাব (আমন-কার্ক); রক্তঃস্রাবের কএক দিন পূর্বে এবং কএক দিন পর ডিমের সাদা লালের ছায় ছায় শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (আমন-মিউর, বোরাঞ্জ, ক্যাক্-ফন্স, মেজিরিয়াম্); চলিয়া বেড়ানোর সময় উক্ত প্রকারের শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ।

নিদ্রা । অপরাক্ত এবং সন্ধ্যাকালের প্রাপ্তিতে অত্যন্ত নিদ্রার ভাব ।

ব্যবহার । শ্বেতপ্রদর; (টেস্ট (Teste) বলেন পুরাতন আকারের শ্বেত প্রদরে বোবিষ্ঠা বিশেষ উপকারী); অতিরিক্ত রক্তঃস্রাব ইত্যাদি স্ত্রীলোকের অস্থখেই ইহা সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার ওয়াল্টার ওয়েসেল্‌হিফ্ট্ (Dr. Walter Wesselhæft) অনেক দিনের পুরাতন আকারের জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তঃস্রাবে (Chronic Metrorrhagia) যাহাতে চক্ষু এবং কপালের ছই পার্শ্বে স্নায়ুশুলের ছায় প্রথর বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় পূর্ণবোধ ও মাথা যেন স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় হইয়াছে একপ অস্বস্ত হইয়া, এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন । ডিমের লালের ছায় শ্বেত প্রদর নিঃসরণে ডাক্তার গারেন্সির (Dr. Guerensey) বোবিষ্ঠা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সন্ধির অত্যন্ত দুর্বলতা, হাত এবং পায়ের পাতায় অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ; কোমরে আঁটিয়া কাপড় পরা সহ্য না হওয়া; বাগলে পেরাইজের গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম; শক্তি না থাকিলে ঘেরূপ হয়, হাত হইতে দ্রব্যাদি সেরূপ পড়িয়া যায়; ভোঁতা অঙ্গ-বখা ছুরী, কাঁইচি ইত্যাদি, ব্যবহার করিলে হাতের আঙ্গুলে অত্যন্ত লাগে; গুহবারের ঠিক উপরিভাগের হাড়ের ব্যথার অগ্রভাগে চুলকাণি, বাহার দরূণ চুলকাইলে উক্ত স্থানের ছাল উঠির ক্ষার এবং ক্ষত হয় ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্ডার ।

ডাইলুশন বিচার । ৬ হইতে ১২ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার ওয়েসেল্‌হিফ্ট্ (Dr. Wesselhæft) ৩য় ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া জরায়ু হইতে উক্ত প্রকারের অতিরিক্ত রক্তঃস্রাবের রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন । ইহার কোন ডাইলুশন কোন

অনুখে উপকারী সে সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না। কারণ, তিনি এই ঔষধ কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই।

ক্যালেডিয়াম সেগুইনাম্,-ক্যালেড

(*CALADIUM SEGUINUM*, -CALAD.)

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কেসরুকা মজ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ু মণ্ডলী দিয়া ইহা জননেদ্রিয় আক্রমণ করিয়া উহার অতিরিক্ত চেতনা, উত্তেজনা এবং প্রদাহ ব্যতীত স্থিতি উৎপাদন করে। ইহা শৈল্পিক স্মৃতি, চন্দ্র এবং পেশীগুলিও আক্রমণ করিয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সমুদয় বিষয় ভুলিয়া যাওয়া (আনাকাৰ্ড্, আস্থা, লাক্, নান্-বন্); অত্যন্ত খিট্‌খিট্‌ করা এবং মানসিক অবসন্নতা বা বিমর্ষভাব; মনে অত্যন্ত গোলযোগ এবং কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করাতে অশক্তি।

মস্তক। কপালে ঘৃণ্বুশে বেদনা; প্রাতঃকালে মাথাধোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ; মাথায় পূর্ণবোধ, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথায় অতিরিক্ত পরিমাণ রক্ত সঞ্চিত রহিয়াছে; মাথায় দপ্‌দপিয়া বেদনা (বেল্); মাথাধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ (ইপিকাক্, আই-রিস্, সাক্সেনেরিয়া); কপালের বাম পার্শ্বে চাপিয়া ধরার জ্বাৰ ঘৃণ্বুশে, অথবা কর্ভনবৎ প্রবল বেদনা; মাথায় পার্শ্বে অবশবোধ।

চক্ষু। চক্ষুর পাতা লালবর্ণ এবং প্রদাহযুক্ত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে জ্বালা এবং চিড়িকমার; চক্ষুর গোলকের কোন কোন অংশে চাপিয়া ধরার জ্বাৰ ঘৃণ্বুশে বেদনা বা কন্‌কনানি (আলোজ্, সিমিসিফ্); চক্ষুর গোলক টাটায় এবং চাপিলে বেদনায়ুক্ত হয়।

কর্ণ। কানে শব্দ শ্রব হয় না (বেল্)।

নাসিকা। হয় তরল সর্দি এবং তদরুণ নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণ জলবৎ তরল স্লেমা নির্গমন, নতুবা শুষ্ক সর্দি এবং তদরুণ নাক বন্ধ হইয়া থাকা।

মুখমণ্ডল । মনে হয় যেন মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে মাকড়সার জাল বা কোন প্রকারের চট্‌চটিয়া আঠা পলকরা লাগান রহিয়াছে (আলান্, ব্যারাইটা-কার্ক, ব্রোমিন্, প্রাক্) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (আন্টি-ফুড্, ব্রাই, মার্ক) ; জিহ্বার মধ্যভাগে কাল্‌চে কটাবর্ণ রেখা পড়ে (ব্যান্ট্) ; জিহ্বা ক্ষীত ; দন্ত শূল এবং দাঁত যেন স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা হইয়াছে একরূপ অমৃত্ত হয় । গলার মধ্যে খণ্ডখণ্ড এবং শুষ্কবোধ ।

পাকস্থলী এবং উদর । বমনোদ্বেগ, প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই বাহা অধিক হয় (নাল্-বম্, পিট্টোন্, পাল্‌স্) ; টক উদ্‌গার উঠা ; পাকস্থলী শুকনো আহার জব্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হইলে ঘেরূপ হয়, উদ্‌গারে যথোচিত পরিমাণে দূষিত বায়ু সেরূপ নির্গত হয় না ; পাকস্থলীতে চাপিয়া ধরা বা কর্তনবৎ বেদনা বা যাতনা এবং মনে হয় যেন পাকস্থলী অত্যন্ত ছুঁর্বল হইয়া পড়িয়াছে বা পেটে পিটে লাগিয়া পড়িয়াছে (হাইড্রাট্, ইমেস্, সিগিয়া) । পাকস্থলী এবং উদরে আক্কেপিক কর্তনবৎ বেদনা (কলোস্) ; উদর ক্ষীত এবং প্রচাপনে বেদনাযুক্ত হয় (বেল্) ।

মল । মল নরম, কাইয়ের জায়, কাদার রঙ্গবিশিষ্ট এবং অতিকষ্টে নির্গত হয় ; মলে কঠিন নেড় থাকে ; মল পরিমাণে অল্প এবং কাইয়ের জায় ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই বারম্বার বাহ্যের বেগ ; মলভাগের পর শুষ্কধারে জালানুভব ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের স্ত্রী সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা, কিন্তু পুরুষাদ্ শিথিল হয় বা খাড়া হয় না (আগ্নান্, ক্যাষ্টান্, আগারিকান্, আর্জেন্ট্, কোনিয়াম্), অথবা পুরুষাদ্ খাড়া হয় এবং তদ্রূপ অত্যন্ত যাতনার উদ্রেক হয়, কিন্তু স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা একবারেই থাকে না ; ধ্বজতল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবসন্নতা ; রাত্রিতে অনিচ্ছাপূর্বক বা অসাড়ো স্বপ্নে ধাতু নির্গমন (স্পন্ন-বোধ) (চায়না, ফস্-আস্) ; পুরুষাদ্ ক্ষীত এবং শোথের জায় টল্‌টলে । স্ত্রীলোকের যোনি এবং যোনিদ্বারে চুলকানি (আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, প্রাক্) ; জরায়ুতে খিল ধরার জায় যাতনা ।

শ্বাসযন্ত্র । বৃকের ডাইন পার্শ্বে স্থলীবিধানের জায় অত্যন্ত যাতনা

(ব্রাই, ক্যালী-কার্ক); বায়ুনল ও কঠিনালীতে অত্যন্ত আঁটাবোধ, বাহার দরুণ নিশ্বাস গ্রন্থাসের ব্যাঘাত জন্মে ; মনে হয় যেন কঠিনালীর উপরিভাগে উত্তেজনার দরুণই কাশির উদ্রেক হয় ; খাসকষ্ট বা সহজে নিশ্বাস টানিতে অশক্তি ; বুকের উপর হাম ইত্যাদির জ্বাঘ লালবর্ণের ফুস্ফুসী, বাহা অত্যন্ত চুলকায়ে ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশে বাতের বেদনার জ্বাঘ বেদনা, বাহার দরুণ রোগী অতি কষ্টে বিছানায় পাশ ফিরিতে পারে (রাষ্টেক্স) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেন অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ হয় ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের বেদনার জ্বাঘ বেদনা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঁপনি ।

নিদ্রা । সর্বদা নিদ্রার ভাব বা ক্লিমান ; হয় নিদ্রা হয় না, নহুবা নিদ্রা হইলেও উহা দ্বারা রোগী উপশম অল্পভব করে না ; ঘুমের ঘোরে গোংরাণ ; ঘুমের ঘোরে ভয়ানক স্বপ্ন দেখা ।

চর্ম্ম । চর্ম্মে খশ্খশে এবং শুষ্কবোধ ; শরীরের স্থানে স্থানে অত্যন্ত চুলকানি (সাল্ফ) ।

জ্বর । গরম ঘরেও শীতবোধ ; জ্বর এবং শরীর শুষ্ক ও উষ্ণ ; মুখমণ্ডল, মাথা এবং হাত গরম ও হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ।

ব্যবহার । ক্রীণোকের যোনি এবং যোনিদ্বারের চুলকানি, ধ্বংস-শূল এবং বাতের ব্যারামেই ক্যালিডিয়াম্ অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । রক্তাদিশ্রাব জনিত অমুখ ; শৈথিল্যিক ঝিল্লীর শুষ্কতা এবং প্রদাহ ; শোথের জ্বাঘ ক্ষীতি ইত্যাদিতেও ইহা ব্যবহৃত হয় ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সমুদয় শরীরে শান্তিবোধ (চায়না); সামান্য কারণেই বাতীব্যস্ত হওয়া (সিমিদিফ, কফিয়া); সমুদয় শরীরে অত্যন্ত দপ্পনানি (গ্লোনয়েন্, পাল্‌স্); ঘরের মধ্যে সমুদয় অমুখের বৃদ্ধি; বহির্বার্গ এবং নড়াচড়াতে অমুখের উপশম । যে সকল রোগী অত্যন্ত মোটা এবং বাহাদিগের শরীর তলতলে, তাহাদিগের অমুখে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আগ্নাস্, ক্যাষ্টাস, হেলোনিয়াস, ফফ-রিক্‌ আসিড্, পাল্‌সেটিল।

ক্যাল্কেরিয়া আর্সিনিকা; ক্যাল্কেরিয়া আয়োডেটা। ৮৭৫

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাল্পিকাম্। আখের রস।

ডাইলুশন বিচার। ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। ইহার ১ম দশমিক ক্রম বা মূল আরোক বোধ হয় উপকারী।

ক্যাল্কেরিয়া আর্সিনিকা,-কাল্ক-আর্স্
(CALCAREA ARSENICA,—CALC.-ARS.)

ডাক্তার সি. হেরিংগের (Dr. C. Hering) মতে ইহা মৃগীরোগে উপকারী। ডাক্তার এইচ. নান্‌কিবেলের (Dr. H. Nankivell) মতে অম্বকর (Tabes Messenterica) এবং ফুস্‌স্‌ প্রদাহ জনিত ক্ষয় কাশি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গলাদিয়া রক্ত উঠার পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। ডাক্তার হিলবার্‌সের (Dr. Hilbers) মতে হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা জনিত শ্বাস কষ্টে ইহা বিশেষ উপকারী।

ক্যাল্কেরিয়া আয়োডেটা,-আয়োডাইড্ অব্‌ লাইয়,-
ক্যাল্ক-আয়োড্
(CALCAREA IODATA,—CALC. IOD.)

ইহা মস্তকই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে। ডাক্তার মিহোফারের (Dr. Meyhoffer) মতে যে সকল শিশু বা ছোট বালক বালিকা অত্যন্ত ক্রবাকী এবং গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট, তাহাদিগের পুরাতন আকারের বায়ু উপ-নয় প্রদাহে ইহা বিশেষ উপকারী। গ্রীবা দেশস্থ গ্রন্থির অত্যন্ত ক্ষীতি, শুষ্ক-কাশি এবং বায়ু উপনলের গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ইহার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। অতএব উক্ত অন্ত্রে ইহা ব্যবহার্য্য। ইহার গুঁড়াই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার সলিউশনও অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু উহা শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া যায়।

ক্যালেন্ডুলা অফিসিনেলিস,-গাঁদা ফুল,-ক্যালেন্ডু

(CALENDULA OFFICINALIS,-CALEND.)

এই গাছের ফুল এবং ফুলের নিকটবর্তী কচি পাতা ষড়ানিষদে ডাইগুট্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার কেবল ফুল দিয়াও আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । এই ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হইতে দেখা যায় না। কাটা ঘাষ ইহার বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা কাটা ঘাষের রক্তস্রাব এবং ঘাষে পুঁথ উৎপন্ন হওয়া নিবারণ করে। পচা ঘা, পোড়া বা ইত্যাদিতে বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ডাক্তার ল্যাড্‌ল্যাম্ (Dr. Ludlam) বলেন যে, প্রসবের সময় যোনি দ্বারাদি ছিঁড়িয়া গেলে ইহার ব্যাহ্য প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। তিনি আরো বলেন যে, যে প্রকার পুঁথ সম্বলিত পুণ্ড্র আকারের ষ্বেত প্রদরে জরায়ুর অগ্রভাগ বা উহার মুখের মধ্যদেশে প্রদাহ এবং গণ্ডমালা জনিত ক্ষত থাকে, তাহাতে স্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। লেখক কখনও এই ঔষধের আভ্যন্ত-ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু উক্ত প্রকারের ষ্বেত প্রদরে পিচ্‌কারি দ্বারা ইহার ব্যাহ্য প্রয়োগ ব্যবস্থা করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় তিনি বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। ক্যালেন্ডুলার কেবল বাহ্য-প্রয়োগ দ্বারা কোচ বিহার রাক্সের কোন একটা উচ্চ শ্রেণীর কৰ্ম্মচারির পক্ষে প্রায় দেড় বৎসরের পুরাতন আকারের বিকচের (Eczema) বা ও মণ্ডাহের মধ্যে লেখক আরাম করিয়াছিলেন। ক্যালেন্ডুলার একরূপ উপকারীতা দেখিয়া কোচ-বিহারের আলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় শ্রণালীর চিকিৎসকগণ এবং অন্তান্ত লোক চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এতলে ইহা বলা আবশ্যক যে বাকিপুর, কলিকাতা এবং কোচ-বিহারের অনেক আলোপ্যাথিক এবং হাতুড়িয়া চিকিৎসকগণ প্রায় ১ বৎসর কাল চিকিৎসা করিয়াও উক্ত বা আরাম করিতে পারেন নাই। বিকচ রোগ সহজে আরাম হয় না এবং একবার আরাম হইলেও উহার বারবার পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে। কিন্তু এই রোগীর এপর্গ্যন্ত পুনরাক্রমণ হয় নাই। এই

রোগীর চিকিৎসার বিবরণ ইং ১৮৮৯ সনের অক্টোবর মাসের হোমিওপ্যাথিক ওয়ার্ল্ড্ (Homœopathic World) নামক লণ্ডনস্থ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক পত্রিকা এবং আমেরিকার ফাইলেডেল্ফিয়ার ইং ১৮৮৯ সালের ১৫ই নবেম্বর তারিখের হোমিওপ্যাথিক রেকর্ডার (Homœopathic Recorder) নামক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায় বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সুবিধা হইলে পাঠক মহাশয়গণ উক্ত দুইখানি পত্রিকা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। ইহার মাত্রাদি বাহ্য প্রয়োগের ঔষধাদির অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

কার্ডুয়াস্ মেরিয়েনাস্,-কার্ডুয়াস্

(CARDUUS MARIANUS,-CARDUUS M.)

এই পাছের শিকড় এবং বিচি সমান অংশ পরিমাণ লইয়া ইহার মূল্য আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। যকৃত এবং পিত্তনল্লীর যন্ত্র ইহা দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া কামল রোগ এবং অন্ত্রাত্ম প্রকারের পিত্তজনিত অস্থখ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। মাথায় চিনাবোধ; মাথাঝোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে গোলমেল বোধ।

পাকস্থলী এবং উদর। মুখে তিক্ত স্বাদ; জ্বা শূন্যতা; বমনো-
ধ্বংস; উদগার উঠা; মুখে জল উঠা এবং অস্ত্রের ক্ষীতি এবং বিকৃতি।
যকৃতের ক্ষীতি এবং উহাতে বেদনা; যকৃত প্রদেশে পূর্ণ বোধ; কামল
রোগ (চেলিডন্, মার্ক); যকৃতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ বা অস্ত্রের ডিডো-
ডিনাম্ (Duodenum) নামক অংশের মৈদ্রিক অস্থখ হেতু কামল রোগ;
উদরের পার্শ্বে স্থচীর্বিধানের স্থায় যাতনা।

মল। মলে যথোচিত পরিমাণে বা একবারেই পিত্ত না থাকা

(কার্ব-কার্ব, হিপ্-সাল্ফ) ; পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময় (আন্টি-ক্রুড, নাক্স-বম্, পডোজ্)।

মূত্রে । মূত্রে পিত্তের রঙ্গকারক পদার্থ থাকে (চেলিডন্) ; মূত্র পরিমাণে অল্প, কটাবর্ণ এবং ঘোলাটিয়া (আন্টি-টার্ট, চেলিডন্) ।

জ্বর । শীত কম্প এবং জ্বর ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কামল রোগের উক্ত লক্ষণ ।

ব্যবহার । কামল রোগ (নেবা) ; পিত্ত জনিত অসুখ ; যকৃতে রক্তাধিক বা রক্তাবরোধ ; অন্ত্রের ডিওডিনাম্ (Duodenum) নামক শৈল্পিক অংশের রোগ ; পিত্তশিলা (Gall-stones) ইত্যাদি অসুখে এই ঔষধ ব্যবহার্য । যকৃতের কঠিনতা সম্বলিত হ্রাস (Cirrhosis of the Liver) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শোথের লক্ষণাদি বর্তনানে এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায় ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । চায়না, মার্কিউরিয়াম্, ফক্সারিস্, পডোফিলাম্ ।

ডাইলুশন বিচার । ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না । কারণ, তিনি এই ঔষধ অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই । তবে একটি মাতালের শোথের লক্ষণাক্রান্ত যকৃতের হ্রাস এবং কঠিনতার (Cirrhosis of the liver with Dropsy) চিকিৎসায় প্রথমতঃ ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক ১০।১২ দিন ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল না পাওয়াতে ইহার মূল আরোক ১ ফেঁটা মাত্রায় ২ সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিয়া লেখক আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছিলেন । এমন কি, উক্ত রোগীর যে যকৃতের বা অন্ত কোন যন্ত্রের অসুখ ছিল, ২ সপ্তাহ কাল পর এরূপও অসুভূত হইত না । তৎপর রোগী সম্পূর্ণরূপে আরাম হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, রোগী লেখকের নিকট সেই অবধি আর আইসে নাই ।

সিয়েনোথাস্ আমেরিকেনাস্,-সিয়েনোথ্

(CEANOOTHUS AMERICANUS,-CEANOOTH.)

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি। প্লীহার উপর ইহার কার্য
অত্যন্ত প্রবল। ইহা প্লীহার প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধিতে বিশেষ উপকারী
বলিয়া ডাক্তার হেল্ (D. Hale) অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার
প্রশংসা দেখিয়া ডাক্তার হেল্ এই ঔষধের এত প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি
বলেন যে “প্লীহার পুরাতন আকারের বিবৃদ্ধি এবং প্রদাহে যখন প্লীহাতে
কোন প্রকারের বেদনা বা টাটানি না থাকে, তখন এই আরোক ব্যবহার
করিলে প্লীহা শীঘ্রই বেদনায়ুক্ত হয় এবং টাটায়, তৎপর আস্তে আস্তে উহা
স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ৬” এইরূপ বিবরণ দেখিয়া ডাক্তার বার্ণেট্ (Dr.
Burnett) প্লীহা সম্বলিত পালাজরাক্রান্ত অনেকগুলি রোগীকে সিয়েনোথাস্
সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে প্লীহার সঙ্গে সঙ্গে যদি
পার্শ্বে গভীরস্থিত বেদনা থাকে, প্লীহাতে বেদনা থাকুক আর না থাকুক, বা
প্লীহার বিবৃদ্ধি থাকুক আর না থাকুক, এই ঔষধ দ্বারা উপকার হইবেই
হইবে। জীলোকের প্লীহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতপ্রদর থাকিলে এই ঔষধ
সেবনে শ্বেত প্রদরও অনায়াসে সারিয়া যায়। ২৫ বৎসর বয়স্কা একটা
জীলোকের ৫৬ বৎসর ধরিয়া মেলেরিয়া জনিত প্লীহার বিবৃদ্ধি ও কঠিনতা
সম্বলিত পালাজর ছিল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতপ্রদর
নিঃসরণও ছিল। আমি তাহাকে সিয়েনোথাস্ সেবনের ব্যবস্থা দিলাম।
ক্রমাগত ৩ মাস নিয়মিতরূপে ইহা সেবনেও জর বা প্লীহার বিবৃদ্ধি এবং
কঠিনতার কোনও উপশম হইল না। কিন্তু শ্বেত প্রদর একবারে সারিয়া
গেল। প্লীহার তরুণ এবং পুরাতন আকারের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতার চিকিৎ-
সায় সিয়েনোথাসের উপকারিতা সম্বন্ধে অট্‌লান্টা মেডিকেল ও সার্জিকেল
জার্নেল্ (Atlanta Medical and Surgical Journal) নামক চিকিৎসা
বিষয়ক পত্রিকায় লিখিত আছে “ভূতপূর্ব সিভিল ওয়ার (Civil War)
নামক যুদ্ধের সময় প্লীহার প্রদাহে (Splentitis) এই গাছ ব্যবহার করিয়া
আমি এত ভাল ফল পাইয়াছিলাম যে, উহার দরুণ ৬ বৎসর কাল উক্ত

রোগে সিরেনোথাস্ ব্যতীত অন্ত কোন ঔষধ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া
 অরণ পড়িতেছে না । শিশু হইতে অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়স্ক রোগীর প্রীহার বিবৃদ্ধির
 চিকিৎসাও আমি এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, উহার একটি রোগীর
 চিকিৎসায়ও নিষ্ফল হই নাই ।” “পুরাতন আকারের প্রীহার বিবৃদ্ধিতে যখন
 প্রীহাতে বেদনাদি না থাকে, এই ঔষধ ব্যবহারে প্রথমতঃ প্রীহা অত্যন্ত
 বেদনাবৃত্ত হয় এবং তৎপর শীঘ্র শীঘ্র উহা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও
 রোগী প্রীহার বিবৃদ্ধি একবারেই টের পায় না ।” ইউরোপ এবং আমেরিকাহু
 হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ প্রীহার বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতার চিকিৎসায়
 সিরেনোথাসের উপকারীতা সম্বন্ধে যেই বাহা বলুন না কেন, প্রীহার চিকিৎসায়
 লেখক সিরেনোথাস্ ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পান নাই । এতদেবী অনেক
 হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও লেখকের উক্ত মতের পোষকতা করেন ।
 সিরেনোথাস্ দ্বারা প্রীহার বিবৃদ্ধি ও কঠিনতা সম্বন্ধে পালা অরাক্স ২৮০টী
 রোগীর চিকিৎসা করিয়া লেখক দেখিয়াছেন । উহার কোন রোগীর চিকিৎ-
 সায়ই তিনি এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ কোন ফল পান নাই । গ্রহকার প্রণীত
 ইংরেজী ভাষার অররোগ চিকিৎসা নামক গ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠায় উক্ত চিকিৎ-
 সায় বিবরণ বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে । ইহার ১ম দশমিক ক্রমের
 আরোক হইতে মূল আরোক ৫ কোঁটা হইতে ১ এক চাম্চ পর্যন্ত
 আন্তরিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহার মূল আরোক তুলীতে
 করিয়া প্রীহার উপর বাহ প্রয়োগ করার ব্যবস্থা আছে । এতদেবী হেল-
 রিয়াঙ্গনিত পুরাতন আকারের পালাজরে প্রীহার বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা
 সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব এতদেবী চিকিৎসকগণের ইহা
 বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, পরীক্ষার ফল সর্বসাধারণের উপকারার্থ প্রকাশ
 করা উচিত ।

চিমাফিলা আম্বলেটা,-চিমাফিলা

(CHIMAPHILA UMBELLATA)

যথানিয়মে এই গাছের মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি । মূত্রবস্তুর উপর ইহার

কার্য দেখিতে পাওয়া। ডাক্তার হেল্ (Dr. Hale) বলেন যে, যেপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ বা মূত্রাবরোধে মূত্রে প্লেয়ার জায় তলানি পড়ে, তাহাতে চিমাফিলা বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগও আরাম হয়। ডাক্তার হলান্ড্ (Dr. Holland) বলেন যে, মূত্রাধারের পুরাতন আকারের প্রদাহে (Chronic Cystitis) অস্ত্রাস্ত্র ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা কোন উপকার নহে দর্শিলে এই ঔষধ সেবনে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। ইহার কার্য অনেকটা ক্যানাবিস্ স্যাটাইবা, ক্যান্ডারিস্, কোপেইবা, ইউপেটোরিয়াম্ পাপূরিয়াম্ এবং ইউবা আর্সা-ইয়ের জায়। ইহার মূল আরোক এক ফোঁটা হইতে ৫ ফোঁটা পর্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সিফটাস্ ক্যান্ডেলিসিস্,-সিফটাস্

(CISTUS CANADENSIS,-CISTUS.)

এই গাছের সমুদয় অংশ সংগ্রহ করিয়া উহা যথানিয়মে প্রক্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা শৈথিল্য ক্রিয়া বিশেষরূপে আক্রমণ করিয়া উহাতে প্লেয়া জনিত অস্থখের জায় অস্থখ উৎপাদন করে। ইহা চর্ম ও গ্রন্থি আক্রমণ করিয়া উহাতে গণ্ডমালা জনিত অস্থখের জায় অবস্থা উৎপাদন করে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সকল প্রকারের মানসিক উত্তেজনাতেই যাতনার স্বাক্ষর হয়।

মস্তক। অত্যন্ত কষ্টদায়ক শিরঃপীড়া; শিরঃপীড়া ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া থাকে।

চক্ষু। অনেক দিন স্থায়ী গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ; মনে হয় যেন চক্ষুর চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান দিয়া কিছু বাইতেছে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে স্রুতীবিধানের জায় যাতনা।

কর্ণ। কান দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত জলের দ্বারা তরল পুঁথ নির্গমন (গ্রাফ্, হিপ্পাল্ফ); কানের মধ্য প্রদেশের ক্ষীতি; কান এবং উহার চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থানে দানের দ্বারা শুকনা কুসুড়ী।

নাসিকা। সর্দির অস্ত্রান্ত লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়া কেবল ইঁচি; নাকের বাম অংশ প্রদাহযুক্ত এবং ক্ষীত; নাকের আগা বেদনায়ুক্ত।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলে দমকা উষ্ণাভূতক; মুখমণ্ডলে কোষ্কার তাম্ব কুসুড়ী বিশিষ্ট বিসর্প বা ইরিসিপেলাস (Erysipelas) (রাস্ট্র)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। দন্তমাড়ি ক্ষীত ও ক্ষতযুক্ত এবং মাড়ির মাংস ফুলিয়া উঠে হইয়া উঠে ও সামান্য চাপ পড়িলে বা সামান্য কারণেই উহা হইতে রক্ত পড়ে, পচাধারে এবং উহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় (কার্কোবেজ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্); জিহ্বা এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে শুকবোধ; ছাল উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়, জিহ্বায় সেরূপ জালা বা চড়চড়ানি; নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু টানা যায়, তাহা জিহ্বায় ঠাণ্ডা লাগে। মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ অত্যন্ত শুষ্ক এবং প্রদাহ-যুক্ত হয় বটে, কিন্তু উহা রোগীর নিকট একবারেই শুষ্ক বলিয়া অনুভূত হয় না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে থক থক করিয়া কাশিলে গলা দিয়া কঠিন, তলতলে, স্বাদশূন্য, শ্লেষ্মা নির্গমন; গলার মধ্যের অসহ্য শুষ্কতা দূরীভূত করিবার জন্য রোগী বারম্বার চোক গিলিতে বাধ্য হয়; এই লক্ষণটী রাত্রিযোগেই অধিক হয়; গলার মধ্যে শুকবোধ, আহারের পর যাহার উপশম হয়; শ্বাস দ্বারা ঠাণ্ডাবাতাস টানিলে গলার মধ্যে বেদনার উদ্বেক হয়; গলার মধ্যে স্রুতীবিধানের দ্বারা অনুভূত হওয়ার দরুন কাশির উদ্বেক হয়; মনের অত্যন্ত আন্দোলনে উক্তপ্রকারের কাশি; বৃক্ হইতে গলার মধ্য পর্য্যন্ত ছাল উঠিয়া যাওয়ার দ্বারা অনুভূত হয়; মনে হয় যেন গলার মধ্যে বালি ঢুকিয়া রহিয়াছে।

পাকস্থলী এবং উদর। ঠাণ্ডা উদগার উঠা; আহারের পূর্বে এবং উহার পর পাকস্থলীতে ঠাণ্ডাবোধ (অ্যাবিসিহ্, কল্‌চ্)। সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে উদরে দ্রুত বায়ুর সঞ্চারণ।

মল। ফল খাওয়ার পর উদরাময় (চারনা); মল তরল ধূসরের

আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ, উষ্ণ, বাহ্য শুষ্কতার দিয়া সজোরে বন্ধকের গোলার ভ্রায় নির্গত হয় (ক্রোটন), শেষ রাত্রি হইতে বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত বাহার বৃদ্ধি হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । বায়ুনলের বেদনা ; নিশ্বাসে বায়ুনল এবং কণ্ঠনালীতে ঠাণ্ডাবোধ ; গলার মধ্যে স্ফটীবিধানের ভ্রায় অল্পভূত হওয়ার দরুণ কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে ছিঁড়িয়া ফেলার ভ্রায় ব্যতনা ; গলা দিয়া তিক্ত স্বাদের শ্লেষ্মা নির্গমন ; বকে চাপ পড়ার ভ্রায় অল্পভূত হয় ।

গ্রীবাদেশ । গলার মধ্যের গ্রন্থি গুলির গণ্ডমালা জনিত ক্ষীতি এবং উহার মধ্যে পুঁথ হওয়া (ক্যাক্স-কার্ক, আয়োড্) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । সন্ধিতে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা ; হাত এবং পায়ের পেশী বিশিষ্ট অংশে আপনা আপনি বা অনিচ্ছা-পূর্বক কসিয়া ধরা বা উহার কাঁপনির ভ্রায় অল্পভূত হয় ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঁপনি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ; পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ।

চর্ম্ম । পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ফোকার ভ্রায় ফুসুড়ী ; শরীরের নানা স্থানে দাদের ভ্রায় ফুসুড়ী ; পুরাতন আকারের ক্ষত ।

ব্যবহার । গণ্ডমালাধাতু জনিত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং লিম্ফটিক্ গ্রন্থির (Lymphatic Glands) অল্পথ ; গলার মধ্যের গ্রন্থির অল্পথ ; ক্ষত ; দাদের ভ্রায় ফুসুড়ী ; বিকচ (Eczema) ; শ্লেষ্মাজনিত অল্পথ ; কুঁচ্কির অল্পথ হেতু উহাতে বেদনা ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাব সময়, রাত্রিতে, ফল খাইলে, মানসিক উত্তেজনার অল্পথের বৃদ্ধি ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । বেলাডোনা, ক্যান্‌কেরিয়া কার্বোনিকা, প্রোকাইটিস, হিপার সাল্‌ফিউরিস্, ক্যালী বাইক্রমিকাস্, নাইট্রিক্ সাসিড্, কক্করাস্, গালফার ।

ডাইলুশন বিচার । ডাক্তার হিউজের (Dr. Hughes) মতে গণ্ডমালা জনিত অল্পথের ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক উপকারী ।

কোকাস্ কাক্‌টাই,-কোকাস্

(COCCUS CACTI,-COCC. CAC.)

ইহা এক কীট বিশেষ। সমুদয় শুকনা কীট গুঁড়া করিয়া উহার এক ভাগ ২০ ভাগ ফ্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা মৰ্জ্জাসদৃশীয় স্নায়ু মণ্ডল দিয়া ইহা মূত্রকোষ, পরিপাক সঞ্চকীয় যন্ত্র এবং শ্বাস যন্ত্র আক্রমণ করিয়া উহাতে উত্তেজনা এবং প্রদাহ উৎপাদন করে, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্রের স্বাভাবিক নিঃসরণের বৃদ্ধি হয়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। ভয়তুর, খিট্‌খিটে এবং চিড়্‌চিড়ে।

মস্তক। মাথায় গোলমেলে বোধ; মাথা ক্রিম্ ক্রিম্ করা; মাথায় রক্তাধিক্য (বেল্, কেরাম্); মাথায় চাপিয়া ধরার শ্রায় ক্রুশ্‌ঘুণে বেদনা; কপালে উক্ত প্রকারের বেদনা; কপালের দুই পার্শ্বে দণ্ডপানি বা চাপিয়া বা আঁটিয়া ধরার শ্রায় বেদনা।

চক্ষু। চক্ষুর কোটরে চাপিয়া ধরার শ্রায় বেদনা; চক্ষুর যোজক ঝিল্লীর প্রদাহ; চক্ষু দিয়া অধিক পরিমাণে জল পড়া।

কর্ণ। কানের মধ্য এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে কসিয়া ধরা, ছিঁড়িয়া ফেলা বা স্থচীবিধানের শ্রায় যাতনা; মনে হয় যেন কান বন্ধ হইয়াছে (ম্যাকেনিস্, সাইলিসি); কানের মধ্যে হুড়্‌হুড়ী এবং চুলকানি (ব্যারাইটা, হিপ্‌-নাল্‌ফ্, মার্ক্.); গিলিবার সময় কানের মধ্যে কেড়্‌ কেড়্‌ শব্দ হওয়া; ঝড় হইলে যেরূপ হয়, কানের মধ্যে সেরূপ সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া।

নাসিকা। বারম্বার জ্বল হাঁচি; নাকে অধিক পরিমাণে স্লেম্মার সঞ্চার; নাকের মধ্যে শুষ্ক বোধ।

মুখমণ্ডল। কোন প্রাণী হামা দিয়া ঘাইলে যেরূপ হয়, মুখমণ্ডলে সেরূপ অস্বভূত হয়।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতের গোড়ায় কসিয়া ধরা বা চিড়িক্‌ মারার ভায় যাতনা ; কোন প্রকারের ঠাণ্ডা বস্তু লাগিলে দাঁত কন্‌ কন্‌ করে (আন্টি-ক্‌ড্‌, ক্যাক্‌-কার্ক্‌, ষ্টাকিস্‌, সাল্‌ফ্‌) ; মুখগহ্বর এবং জিহ্বা শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা (আর্স্‌, ব্রাই) ; মুখ-গহ্বর এবং গলার মধ্যে জ্বালা (আর্স্‌, ক্যাঙ্ক্‌, ক্যাপ্‌স্‌) ; মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া ঝাওয়ার ভায় জ্বালা বা চড়্‌-চড়ানি ; মুখগহ্বর এবং উহার পশ্চাৎ ভাগের অতিরিক্ত উত্তেজনা, যাহার দরুণ মুখ পরিষ্কার করিতে গেলে কাশির উদ্রেক হয় এবং গলাদিয়া গাঢ় ডেলা ডেলা শ্বেদ্য নিৰ্গত হয় ; তালুকার ধহুকের ভায় বক্রাংশ অত্যন্ত উত্তেজিত ; সজোরে কথা বলিলে, দাঁত মাজিবার সময় কাশি এবং বমনের উদ্রেক হয় ; মুখে তামা কঁাসা ইত্যাদি ধাতুর স্বাদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে জ্বলের সঞ্চার ; মুখে তামা কঁাসার ভায় স্বাদ (ইয়ুল্‌, ককিউল্‌, মার্ক্‌, সাল্‌ফ্‌) ; মুখে তিক্তস্বাদ (ব্রাই, চায়না, নাক্স-বস্‌, পাল্‌স্‌, সাল্‌ফ্‌) ; মুখে মিষ্ট স্বাদ (আর্স্‌, ব্রাই, মার্ক্‌, সাল্‌ফ্‌) ; মুখে টক স্বাদ । মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ এবং গলার মধ্যে শুষ্ক ও জ্বালায়ত্তব ; গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া ঝাওয়ার ভায় জ্বালা এবং চড়্‌-চড়ানি ; গলার মধ্যে অনবরত হুড়্‌-হুড়্‌ করা ; উত্তাপে, বিশেষতঃ বিছানায়, গলার মধ্যে উপদ্রবের বৃদ্ধি ; গিলিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ ।

পাকস্থলী এবং উদর । হৃষ্ট ক্ষুধা ; অত্যন্ত পিপাসা ; উদগার উঠা ; বুক জ্বালা ; বমনোদ্বেগ এবং কাঠবমী ; বমনের ইচ্ছা ; পাক-স্থলীর ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি ; পাকস্থলীতে ভারি এবং চাপাবোধ ; পাক-স্থলীতে ঘাটিয়া ধরার ভায় বেদনা ; দূষিত বায়ু সঞ্চিত হইলে বেক্রপ হয়, প্রচাপনে উদরের বামপার্শ্বে সেক্রপ টাটানি বা বেদনা, যাহা পৃষ্ঠদেশের বাম-পার্শ্বে এবং মেরুদণ্ডের কোমর প্রদেশস্থ হাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; প্লীহা প্রদেশে জ্বালাযুক্ত কসিয়া ধরার ভায় যাতনা ; দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দরুণ উদরপেশী ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গড়্‌-গড়্‌, কলকল শব্দ হওয়া ; পেটকামড়ানী এবং তৎপর উদরাময় ।

মল । বাহ্যের বেগ এবং কখন কখন বেগ দিলে মল নিৰ্গত হয় না ; প্রচুর পরিমাণে কোমল কাইয়ের ভায় মল ত্যাগ ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রকোষ প্রদেশে চাপিয়া ধরার জ্বার ঘৃণ্ণুশে বেদনা বা টাটানি; মূত্রাধারে চাপা বোধ; প্রস্রাব করার সময় মূত্রাণালীতে জ্বালাযুক্ত বাতনা (ক্যানাবিস্-স্ফাট্, ক্যান্, ষ্টাফিস্); মূত্রনাালীর মধ্যে স্থগী বিধান বা চুল্কানির জ্বার বাতনা; বারম্বার মূত্রত্যাগের প্রবল ইচ্ছা; বারম্বার প্রচুর পরিমাণে জ্বলের জ্বার পরিকার মূত্রত্যাগ (কন্-স্ফাট্) যাহা ত্যাগের কতকক্ষণ পরই ঘোলাটিয়া এবং মেঘের জ্বার অন্বজ্ঞ হয়; মূত্রে ইটের গুঁড়ার জ্বার তলানী পড়ে (আর্গিকা, লাইকোপ্, নেট্রাম্-মিউর, কন্)।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষাঙ্গ বারম্বার খাড়া হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছার অত্যন্ত বৃদ্ধি; মনে সর্বদা স্ত্রী সহবাসের ভাবের উদয় হয়; রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে অনিচ্ছাপূর্বক ধাতু নিঃসরণ (স্বপ্নদোষ) (চারনা, কন্-স্ফাট্, ষ্টাফিস্), স্ত্রীলোকের ঘোনির অত্যন্ত ক্ষীতি এবং উহাতে অত্যন্ত উষ্ণাশুভব; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে অতিরিক্ত পরিমাণে এবং অনেক দিন ধরিয়া বজ্রপ্রস্রাব (ক্যান্-কার্ব্, নাস্-বম্)।

শ্বাসযন্ত্র । বায়ুনলে শ্লেষ্মার সঞ্চার (আন্টি-টার্ট্, ইপিলাক্, লাম্বুকাস্, ষ্টানাম্); বায়ুনলে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বার জ্বালা বা চড়্ চড়ানি, বাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয়; কণ্ঠনাালীর পশ্চাৎ ভাগে যেন একটি কঠিন পাথরের জ্বার পদার্থ চাপিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, বাহার দরুণ রোগী অনবরত ঢোক গিলিতে বাধ্য হয়; কণ্ঠনাালীতে প্রবল আকারের স্ফুট্-স্ফুটী, বাহার দরুণ রোগী রাত্রিতে ঘুমাইতে পারে না এবং স্তদরুণ কাশির উদ্রেক হয় ও গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে চট্-চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গত হয়; স্বরউৎপাদক যন্ত্রের ক্লান্তি (আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, এরাম্, কন্); অন্যায়সে কণা বলিলেও স্বর উৎপাদক যন্ত্রের ক্লান্তি; স্বরভঙ্গ এবং কর্ণক স্বর; নিশ্বাস প্রাশ্বাস কতক পরিমাণে কষ্টকর; ঘৃণ্ণুশে কাশি, থাকিয়া থাকিয়া বাহার উদ্রেক হয় এবং গলাদিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া বাহার শেষ হয়; দাঁত মাজিবার সময় বা জলদিয়া কুলুকুচা করার সময় কাশির উদ্রেক হয়; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলাদিয়া অধিক পরিমাণে ডিমের লালের জ্বার আটাল শ্লেষ্মা নির্গমন (ষ্টানাম্); ক্ষণস্থায়ী কাশি এবং

তৎপর গুলাদিয়া সহজেই গোলায় জ্বায় স্লেয়া নির্গমন; খাদকষ্ট; বৃকে
আঁটা বোধ এবং টাটানি; বৃকের পার্শ্বে স্থচীবিধান বা বাটিয়া ধরার জ্বায়
যাতনা।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনা;
আহারের পর হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিতরূপে দপ্পদপানি এবং হৃৎস্পন্দন ও উহার
সঙ্গে সঙ্গে মনের অত্যন্ত উদ্বেগ; নাড়ী ক্রতগামী।

পৃষ্ঠদেশ । হৃৎকেন্দ্রের মধ্যবর্তীস্থানে স্থচী বিধানের জ্বায় যাতনা;
কেন্দ্রের পশ্চাদ্দেশ এবং মূত্রকোষ প্রদেশে থেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচ-
ড়াইয়া পড়ার জ্বায় বেদনা; মূত্রকোষ প্রদেশে চাপিয়া ধরার জ্বায় প্রবল
বেদনা।

হাত পা, ইত্যাদি । হাত পায়ে কসিরা ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার
জ্বায় বেদনা (বান্টক্স, পাল্‌স)।

নিদ্রা । ঘুমের অনিবার্থ্য ইচ্ছা; অস্থির এবং অস্বস্থকর নিদ্রা;
স্পষ্ট স্বপ্ন দেখিরা ঘুম ভাঙ্গিরা যায়।

জ্বর । সমুদয় শরীরে শীত, অপরাক্ষ এবং সন্ধার সময়ই যাহা
অধিক হয়; শরীরের সস্তাপের বৃদ্ধি; শরীর সামান্য রকম গরম হইলেই
যেন রোগী অত্যন্ত নিস্তর হইয়া পড়ে; সার্বাসিক প্রচুর ঘর্ষ, প্রাতঃকালে
যাহা অধিক হয়।

ব্যবহার । মূত্রকোষের প্রদাহ জনিত বেদনা; মূত্রকৃচ্ছ্র এবং
ভদ্ররূপ বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; বায়ু উপনলের স্লেয়া জনিত অস্বস্থ;
হৃৎপিণ্ড বা কাশি; কণ্ঠনালীর উত্তেজনা; স্বরভঙ্গ ইত্যাদি অস্বস্থে কোকাস্
ক্যাটাই ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত প্রান্তি বোধ এবং নিস্তে-
জতা; শরীরের স্থানে স্থানে চুলকানি এবং কুটুতানি; প্রাতঃকালে,
উত্তাপে, বিশেষতঃ বিছানার উত্তাপে প্রায় সমুদয় উপদ্রবেরই বৃদ্ধি।

ডাইলুশন বিচার । ১ম দশমিক ডাইলুশন এবং কখন কখন মূল
আরোকও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডকে ডাক্তার জুসোটের (Dr.
Joussot) নতে ৬ হইতে ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহা।

কোকা,—কোকা ।

(COCA,—COCA)

এই গাছের কাঁচা পাতা দিয়া আরোক এবং শুকনা পাতা যথা নিয়মে সুগার অব্ মিল্কে মিশাইয়া মিশ্র গুঁড়া প্রস্তুত হয় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ । কোকা দ্রাঘ মণ্ডলীকে উত্তেজিত করে বটে, কিন্তু তুরা, আফিম এবং হাচিসের জায় ইহা উহার পদার্থে রক্তাবরোধ করিয়া উহার কার্যের কোনও বৈলক্ষণ্য জন্মায় না । ইহা শরীরের ধ্বংস নিবারণ করে । অতএব ইহা সেবনে যেমন আহারের কম আবশ্যকতা থাকে, তেমনি কোষ্ঠ বদ্ধ হয় এবং মূত্রে যন পদার্থেব হ্রাস হয় ।

অনেককাল হইতেই দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা তামাক খাওয়ার জায় ইহা সচরাচরই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে । পাহাড় পর্বতে চড়া বা কোন প্রকারের কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করার দরুণ ক্লান্তি এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভুলিয়া যাওয়ার অভিপ्राয়ে তথাকার লোকেরা ইহা খাইয়া থাকে । অতিরিক্ত পরিমাণে খাইলে মানসিক উত্তেজনা, হৃৎস্পন্দন, নিদ্রাশূন্যতা অথবা স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা, চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিশিখা বা কণা দেখা, কানের মধ্যে টন টন শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত চেতনার লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মস্তিষ্কের সামান্য রকমের উত্তেজনা ; চিত্তবিভ্রম (আনাকার্ভ, হায়োস্, ট্রামন) ; উত্তেজিত করার কল্পনা ; আশ্চর্য্য রকমের স্বপ্ন বা দৃশ্য দেখা (ক্যানাবিস্-ইণ্ড) ; জীবন্ত ভাব ; মানসিক পরিশ্রমে ইচ্ছা (আক্কাট্, ককিয়া, ল্যাক্) ; মনের অবসন্ন ভাব ; ভয়ভূরতা ; উত্তেজিত এবং বিমর্ষভাব ; মনের পরিষ্কার ভাব ; মনে সাহসের ভাব ; মনের অবস্থা সর্বদা পরিবর্তনশীল (একন, অরান্ ইয়েস্, নাক্স-মক্) ।

মস্তক । মাথায় গোলমেলে বোধ ; মাথাঘোরা ; শিরঃশীতা ; কপালে পূর্ণবোধ এবং চাপায়ুক্ত বেদনা ; কপালে ঘৃণ্যঘৃণে বেদনা, বহির্জায়তে চলিয়া বেড়াইলে যাহার উপশম হয় ; এক গাছি কিতা বাঁধিয়া

রাখিলে ঘেহুপ হর, কপালের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সরুপ আঁটবোধ হয় (জেল্‌স্, চেমিডন্, মার্ক্, নাইট্‌ক্-আস্); কপালের হইপার্শ্বে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; মাথার পশ্চাত্তাগে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (জেল্‌স্, নাক্স-বম্)।

চক্ষু। চক্ষে চাপাবোধ এবং বেদনা; চক্ষুর পাতার ভারিবোধ (কষ্ট্, কোনারাম্, জেল্‌স্, নেট্রাম্-কার্ক্); চক্ষে আলোক একবারেই লক্ষ হয় না এবং চক্ষুর তারা বিস্তৃত (বেল্); চক্ষুর সম্মুখে পাখীর ডানা কাড়ার ন্যায় ধড়্‌ফড়ানি এবং আঙুথের কণা এবং শিখার ন্যায় দেখা (আগারিকাশ্, সাইক্লোমেন্, মার্ক্, ফন্, সাল্‌ফ্)।

কর্ণ। শ্রবণ শক্তির অতিরিক্ত চেতনা (কফিয়া, ওপিয়াম্); কানের মধ্যে গান করার ছায় শব্দ, টন্ টন্ শব্দ এবং সৌ সৌ শব্দ হওয়া (চায়না, মার্ক্)।

নাসিকা। হাঁচি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাকদিয়া জলবৎ তরল প্রস্রাবের জলের ন্যায় স্লেয়া নির্গমন; নাকের মধ্যে জ্বালা এবং উষ্ণামৃতত্ব।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। চলিয়া বেড়ানোর সময় মুখ-গহ্বরে শুষ্কবোধ; মুখে লোন্‌তা, চট্‌চটিয়া আঠা এবং তিক্তবাদ (ব্রাই, নাক্স-বম্, চায়না, পাল্‌স্); গলাদিয়া জল পরিমাণে সাদা সাদা স্লেয়া নির্গমন, আতঃকালেই বাহ্য অধিক হয়; মুখগহ্বরের পশ্চাত্তাগ এবং আহার বহা গলনালীর উপরিভাগে হুড়্‌হুড়ী।

পাকস্থলী এবং উদর। অত্যন্ত ক্ষুধা; আহারে অরুচি; শরীরের পরিপোষণ অনাবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হয়, এমন কি, অত্যন্ত কঠিন পদ্বি-প্রমেও খাওয়ার আবশ্যকতা বোধ হয় না; পরিপাকশক্তি অত্যন্ত প্রবল; উদগার উঠা; পাকস্থলীতে খালি বোধ (কারল্‌স্, হাইড্রাট্, ইয়েস্, দিপিয়া, সাল্‌ফ্)। উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে গড়্‌গড়্‌, ফল ফল্‌ শব্দ হওয়া; শূল বেদনা; গুহবার দিয়া প্রচুর মুখিত বায়ু নিঃসরণ (চায়না, কার্কো-বেক্, লাইকোপ্, সাল্‌ফ্)।

মল। বারম্বার বাহের বেগ হইয়া তৎপর আভাবিক মল ত্যাগ; কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্র । বারবার অতিরিক্ত পরিমাণে মূত্রতাগ (কস্-আস্) ; মূত্রে স্বন পদার্থের অভাব বা নানতা ; মূত্রে হরিত্রার আভ্যাক্ত লাল বা কমলা লেবুর স্তায় রঙ্গ বিশিষ্ট স্তলানি পড়ে ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের পুরুষাঙ্গের হ্রাসলতা এবং স্ত্রীসহবাস সম্বন্ধীয় স্বপ্ন দেখিয়া অনিচ্ছা পূর্বক ধাতু নিঃসরণ (আগ্নাশ্, চায়না, কোনারাম, কস্, কস্-আস্) । স্ত্রীলোকের গোণে রজঃস্রাব এবং তদ্রূপ রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ প্রবল বেগে রজঃস্রাব হইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া ।

শ্বাসযন্ত্র । বায়ুনল এবং কণ্ঠনালীতে স্ফু-স্ফুড়ির দরুণ কাশি ; শ্বশ্বে শ্বশ্বে কাশির দরুণ গলার মধ্যে স্ফু-স্ফুড়ী বা টন্টনানি ; নিম্নস্থান হইতে উচ্চস্থানে উঠিবার সময় কোন প্রকারের শ্বাস কষ্ট হয় না ; অনবরত শ্বাস কষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ নিশ্বাসের ইচ্ছা, বুক এবং সমুদয় শরীরে স্বচ্ছন্দ বোধ, রোগী আপনাকে আপনি সূহ মনে করে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রতবেগে চলিবার ইচ্ছা হয় ; বৃক ভাঙ্গি এবং আঁটা বোধ ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । স্নায়বিক হৃৎস্পন্দন (আসাক্, ককিয়া, ককিউন্, ইগ্নেন্) ; নাড়ী হ্রাস এবং ক্রতগামী ; ধমনীতে রক্তের অধিক চাপ পড়া ।

ব্যবহার । পরিপাক কার্যের সহায়তা, ঘুম উৎপাদন, স্নায়বিক উত্তেজনা নিবারণ এবং আকোপ নিবারণ জন্তই এই ঔষধ এ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । ইহা নিম্নস্থান হইতে উচ্চস্থানে উঠিবার সময় শ্বাসকষ্ট এবং উচ্চস্থানের হাকা বাতাস গ্রহণ করার শক্তি বৃদ্ধি করে ; হস্ত বৈধূন বা অতিরিক্ত স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস জনিত স্নায়বিক মগ্ডগীর অন্থে বিশেষ উপকারী ; ইহা হৃৎপিণ্ডের অন্থে স্নায়বিক মগ্ডগীর অতিরিক্ত কার্য এবং স্নায়বিক মগ্ডগীর অতিরিক্ত উত্তেজনার দরুণ নিদ্রাশূলতা নিবারণ করে । অনেক কাল হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় ইহা চা এবং ভামাকু খাওয়ার স্তায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । অধিক পরিমাণে খাইলে ইহা মানসিক উত্তেজনা, হৃৎস্পন্দন, নিদ্রাশূলতা বা স্পষ্ট স্বপ্ন এবং চকুর সমুখে আকৃষ্টের শিখা বা কণা দেখা, কানে টন্ টন্ শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত চেতনা ইত্যাদি অন্থ বা লক্ষণ উৎপাদন

করে। ইহা শরীরের পদার্থের ক্ষয় বা বিনাশ নিবারণ করে, কোন প্রকারের আহাৰ প্রয়োজন হয় না, কোষ্ঠ বদ্ধ হয় এবং মূত্রে ঘনপদার্থের হ্রাস হয়। এই ক্রবোর এইরূপ কার্য করার ক্ষমতা থাকার দরুণ যে দেশে এই গাছ জন্মে সে দেশের লোকেরা পথ কষ্ট বা ক্লান্তি ভুলিয়া যাওয়ার অভিপ্রায়ে দূরদেশে চলিয়া যাওয়ার সময় এই গাছের পাতা চুসিতে চুসিতে চলিয়া যায় এবং তদ্ব্যবসায় পথক্রান্তি অহতৃত হয় না। আর্দিনিকের জায় ইহারও পাহাড়ে পর্বতে উঠিবার কষ্ট এবং উচ্চস্থানে বায়ু নিশ্বাস দ্বারা টানিবার দরুণ কষ্ট নিবারণ করার শক্তি আছে। এই ঔষধের গুণাগুণ সকল চিকিৎসকেরই বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। কফিয়া। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইউরোপে যেমন চা কাফি এবং তমাকু যে অভিপ্রায়ে খাইয়া থাকে দক্ষিণ আমেরিকায় লোকেরাও সেই অভিপ্রায়ে কোকা খাইয়া থাকে।

ডাইলুশন বিচার। ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক কিছুই জ্ঞাত নহেন। মূল আরোকই অধিক উপকারী হওয়ার সম্ভাবনা।

কিউরেয়ার,-কিউর

(CURARE.-CUR.)

ইহা আকোহলে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি। গতি উৎপাদনেনব সহায়কারী দ্বায় মণ্ডলীই ইহা সচরাচর আক্রমণ করিয়া উহার পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। ইহা উক্ত দ্বায়ের উপরাংশ হইতে মধ্যের অংশ আক্রমণ করিয়া থাকে। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, দৃষ্টান্তর রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া এপর্যন্ত কোনও কল পাওয়া যায় নাই। জলাভয় (Hydrophobia) রোগে ইহা দ্বারা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। ফ্রিম্যান সাহেবের (Mr. Freeman) মতে নিম্নলিখিত অস্থিতে এই ঔষধ উপকারী; যথা,-(১) শরীরের যে সকল অংশে মস্তক সম্বন্ধীয় দ্বায় আছে, উহার বেদনা হীন পক্ষাঘাত; (২) সংজ্ঞাশ

রোগের পর এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত ; (৩) কোন প্রকার আঘাত জনিত পক্ষাঘাত ; (৪) স্নায়বিক দুর্বলতা ; (৫) বৃদ্ধবয়সের দুর্বলতা ; (৬) কোন প্রকার প্রবল দুর্বলকারক অস্ত্রের পর দুর্বলতা । উক্ত প্রকার অস্ত্র এই ঔষধ দ্বারা কোন উপকার দর্শে কি না সে সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি স্বয়ং কখনও ইহা ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, ধমনি এবং পেশীর গতি শাসক স্নায়ুর পক্ষাঘাতেই এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা । পক্ষাঘাত জনিত শ্বাস কষ্টেও এই ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শিতে পারে । ইহার কার্যের সঙ্গে সঙ্গে কষ্টিকাম্, কোনায়াম্, ফাইসটিগ্‌মা, জেল্‌সিমিয়াম্, ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সাদৃশ্য আছে । ৩ হইতে ১২ ক্রমের আরোক সচরাচর ব্যবহার্য্য ।

কুণ্ডুরাঙ্গো,-কুণ্ডুর

(CUNDURANGO,-CUNDUR.)

দক্ষিণ আমেরিকাতে এই গাছের জন্ম । ইহার কুঁড়ির বাকল দিয়া কপা-নিয়মে মূল আরোক অথবা মিশ্র গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি । কৰ্কট রোগে (Cancer) উপকারী বলিয়া অনেকে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন । ডাক্তার ক্লটার মুলার (Dr. Clotar Müller) কৰ্কট রোগে এই ঔষধ প্রথম ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন । কঠিনাকারের (Scirrhus) কৰ্কট রোগে ইহা দ্বারা কোনও উপকার দর্শে না । তবে সাংঘাতিক আকায়ের ক্ষতে (বাহার আকার কৰ্কট রোগের ভায় দেখায়), তাহাতে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে । পাকস্থলীর কৰ্কট রোগ ইহা দ্বারা আরাম হয় বলিয়া চিকিৎসা বিধয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় । ডাক্তার বার্ণেট্ (Dr. Burnett) এই ঔষধ গরম জলে ভিজাইয়া কাত (Infusion) প্রস্তুত করিয়া স্নহ শরীরে সেবন করিতে গার ব্রণ এবং ফোকার ভায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ ও চক্রাকারের ফুসুড়ী প্রকাশ পাইয়া-

ছিল ওঠেহার সঙ্গে সঙ্গে চর্ম্ম লাগবর্ণ হইয়াছিল। এই কুস্কৃৎগুলি ওঠের কোণে প্রকাশ পাইয়া উক্ত স্থান কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ওঠের কোণ এবং শুষ্কতার ফাঁটার চিকিৎসায় বিশেষ কল পাইয়াছিলেন। ইহা ধাতুগত পরমীর ব্যারামেও উপকারী। অতিরিক্ত পল্লিমাণ সূত্রের সঞ্চার করা, বমন সম্বলিত পাকস্থলীতে বেদনা, চর্ম্ম কটাক্ষ আভাবিত্ত করিয়া চুলকানি উৎপাদন করা এই ঔষধের কএকটি গুণ বা শক্তি বিশেষ। ইহার কার্যের সঙ্গে হাইড্রাটসের কার্যের সাদৃশ্য থাকার সম্ভাবনা। ডাক্তার মুলার এই ঔষধের ১ম দশমিক ক্রমের আরোক বা মূল আরোক ব্যবহার করেন।

সাইক্লোমেন ইউরোপিয়ায়, -সাইক্লোমেন

(CYCLAMEN EUROPEUM, -CYCLAM.)

এই গাছের কাঁচা শিকড় যথা নিয়মে প্রকৃষ্টিপরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কেসরকা মজ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ু মণ্ডলীর উপর কার্য দ্বারা ইহা মস্তিষ্ক, চক্ষু, পাকস্থলী এবং অন্ত্র ও জ্বীলোকের অনেন্সির আক্রমণ করিয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন । সর্দঙ্গা ঝিট্ ঝিট্, চিড় চিড় করা; বিমর্ষ ভাব; সামান্য কারণে বিরক্ত হওয়া (ক্যাপ্‌স্, ককিউল্, নাক্স-বম্); সকল প্রকারের কার্য করিতেই অনিচ্ছা (চায়না, কোনারায়, নাক্স-বম্, কন্)।

মস্তক । মাথায় অভ্যন্ত গোলমেলে বোধ; সন্ধ্যার সময় মাথায় গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে মাথা ঘোরা; অপরাক্ষে বা সন্ধ্যার সমস্ত মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে বেদনা; মাথায় রক্তাধিক্য বা

রক্তাবরোধ ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই প্রবল শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর ধড়্‌ফড়ানি (ফস) ; রূপালে চাপিয়া ধরার স্থায় প্রবল বেদনা ।

চক্ষু । চক্ষে ঝাপসা দেখা ; চক্ষুর সম্মুখে দাগ দেখা (মার্ক্, সাল্‌ফ্), ঘুম ভাঙ্গিলেই যাহা অধিক অল্পভূত হয় ; চক্ষুর সম্মুখে যেন নানাপ্রকার রত্নের পদার্থ বা চিহ্ন ধড়্‌ ফড়্‌ করিয়া নড়িতেছে একরূপ অল্পভূত হয় ; চক্ষুর সম্মুখে চক্‌চকে সূচী, আঙণের কণার স্থায় দেখায় (আগারিকাশ, কষ্ট্, মার্ক্, ফস, সিপিয়া, সাইলিনিস, সাল্‌ফ্, থুফা) ; কুয়াশা বা ধূমের মধ্য দিয়া তাকাইলে বেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ ঝাপসা দেখা (ফস্, জেল্‌স্) ; পুস্তকাদি পড়িতে আরম্ভ করিলেই যেন আলোক ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া নড়িতে থাকে ; চক্ষে এক বস্তু দুইটীর স্থায় দেখায় (অরাম্, বেল্, সিকুটা) ; চক্ষুর উপরের পাতার ক্ষীতি (এপিস্, রাস্-টম্, সাল্‌ফ্) ।

নাসিকা । বারম্বার ইঁচি দেওয়া (একন্, সিনা, জেল্‌স্) ।

মুখগহ্বর । মুখে অতিরিক্ত পরিমাণে লালের সঞ্চার এবং উহাতে কাইয়ের স্থায় স্বাদ ; লাল এবং আহার জ্বাদি লোনতা লাগে (আণ্টি-কুড্, মার্ক্-কর, সিপিয়া, সাল্‌ফ্) ; আহার জ্বাদিতে যেন কোন স্বাদই থাকে না ।

পাকস্থলী এবং উদর । সামান্য ক্ষুধা বা রুচি ; প্রাতঃকালে এবং রাত্রিতে আহারের ইচ্ছা একেবারেই থাকে না ; রুচির সম্পূর্ণ বিনাশ ; রুচিতে অরুচি (নেট্রাম্-মিউব্) ; মাথনে অরুচি ; সামান্য আহার জ্বাদি উদরস্থ হইলেই আব থাইতে ইচ্ছা হয় না বা বমনোদ্বেষ্ট হয় ; দিনের বেলা পিপাসা একবারেই থাকে না এবং সন্ধ্যা বেলা পিপাসার উদ্রেক হয় ; উদগার উঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে অস্বথবোধ ; টক উদগার উঠা ; উদগারের সঙ্গে সঙ্গে হিক্কা ; আহারের পর বমনোদ্বেষ্ট বা গা বনৌ বমী করা (নাক্স-বম্, পাল্‌স্) ; চর্বিযুক্ত জ্বা খাওয়ার পর বমনোদ্বেষ্ট (পাল্‌স্) ; অতিরিক্ত আহার করিলে বেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ পূর্ণ এবং চাপাবোধ । উদরের সকল স্থানেই ছিঁড়িয়া ফেলা বা ছুরী বিধানের স্থায় বেদনা ; নড়া চড়াতে উদরোৰ্ক, প্রবেশে সূচীবিধানের স্থায় ব্যস্তনা ; প্রত্যহ আহারের পরক্ষণই উদরে গড়্‌গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া ; তলপেটে অস্বথ বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষ্ট ।

মল । উদরাময়, কফি পান করিলেই বাহার উদ্রেক হয় ।

জননেস্ত্রিয় । জ্বীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব (ক্যাক্স-কার্স্); রক্ত কাগচে (ক্যালী-নাইট্রিক্), চাপ চাপ, থানা থানা (আমন্-কার্স্, ক্রোকাস্, ইগ্নেস্, প্লাটিনা) এবং পর্দাযুক্ত (ব্রোমিন); রজঃরোধ, বা অল্প পরিমাণে, কষ্টকর রজঃস্রাব (সিমিসিফ্, পাল্গ্) ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বাসরোধক প্রবল কাশি, কণ্ঠনালীতে হুড়হুড়ী এবং চড়্চড়ানির দরুণ বাহার উদ্রেক হয় ও রাত্রিতেই বাহার অধিক উদ্রেক হয় এবং ঘুমের অবস্থায় বাহার বৃদ্ধি হয় ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । ভাইন বাহতে কঠিন চাপাবোধ, বাহার দরুণ বাহ্ সঞ্চালনের শক্তি থাকে না এবং বাহা বাহর হাড়ের আবরক কঠিন পর্দা ও বাহর গভীর অংশস্থিত পেশীগুলির মধ্যে যেন অন্তর্ভূত হয় এবং বাহা হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া লেখার ব্যাঘাত জন্মে । উরুতে, হাঁটুর পশ্চাৎভাগে পপ্লিটিয়াল্ নানক স্থানের (Popliteal Space) ঠিক উপরিভাগে খিল ধরার ছায় বেদনা; থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে ঘেরুপ হয়, পায়ের পাতার তলায় সেরুপ বেদনা ।

নিদ্রা । অস্থির নিদ্রা বা নিদ্রা দ্বারা শরীর কুহু মনে হয় না এবং ঘুমের ঘোরে ক্রমাগত স্বপ্ন দেখা; শেষ রাত্রি বা প্রাতঃকালে ঘুমাইবার অন্ত্যস্ত ইচ্ছা ।

ব্যবহার । পাকস্থলীর অস্থখ; অতিরিক্ত রজঃস্রাব; রজঃরোধ; জ্বীলোকের শেষ রজঃরোধ হওয়া কালীন মাথাঘোরা এবং মানসিক বিকার ইত্যাদি অস্থখে সাইক্রেমেন্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত হর্ষলতা এবং বলক্ষয় (আর্শিকা, আর্স্, চায়না, কন্স); সমুদ্র শরীর যেন একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, বাহার দরুণ একটা অঙ্গ সঞ্চালনেও যেন ভারিবোধ হয়; রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থস্থ-বোধ এবং অস্থিরতা । ইহার কার্য্য অনেকটা পাল্গসেটিলার ছায় ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । পাল্গসেটিল, ক্রোকাস্, রুটা, বেল-ডোনা, লাইকোপডিয়াম্, রাস্‌টক্, সিপিগা, সাল্ফার ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্সার, কফিরা, পাল্‌মেটোলা ।

ডাইলুশন বিচার । ইহার ১৫ দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহৃত হয় । ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।

ইউপেটোরিয়াম্ পাপূরিয়াম্,-ইউপেট্-পাপূর

(EUPATORIUM PURPUREUM,-EUPAT. PURP.)

এই গাছের কাঁচা শিকড় যথানিয়মে প্রফ্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা মূত্রবর্ধক এবং পেশী অত্যন্ত প্রবলরূপে আক্রমণ করিয়া থাকে, যাহার দরুণ মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং মূত্রনালী ইত্যাদির উত্তেজনার বৃদ্ধি হয় ও পেশী গুলিতে বাত রোগের স্রাব লক্ষণাদি প্রকাশ পায় । অতএব ইহা মূত্রাধারে পাথরি (Gravel), মূত্র বর্ধকের অল্প জনিত শোথ এবং মূত্র কুঞ্চে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

অস্তক । রোগীর মনে হয় যেন সে বামদিকে টলিয়া পড়িয়া যাইবে (এরাম্, বেণ্, ট্রায়ন, সাল্‌ফ্, জিক্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা কিস্‌কিস্‌ করা ।

গলার মধ্য । গলার মধ্যে পূর্ণবোধ, যাহার দরুণ রোগী ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয়; গলার মধ্যের পশ্চাত্তাণ্ডে জ্বালা এবং চিড়িক মারা (ক্যাঙ্ক) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রকোষের গভীরতম অংশে যুগ্মবৃশ্বে বেদনা; মূত্রকোষে কর্তনবৎ বেদনা (বার্কেরিস্, ক্যাঙ্ক); প্রস্রাব করার সময় মূত্রাধার এবং মূত্রনালীতে ভয়ানক জ্বালা এবং চিড়িক মারা (ক্যাঙ্ক, ক্যানাবিস্-ভাট্, ক্যাঙ্ক); মূত্র পরিমাণে বৃদ্ধি হয় (কন্‌-আস্); মূত্র ধারণে অশক্তি (শিশু বা ছোট বালক বালিকা গণেরই অধিক হয়); অনবরত মূত্র ধারণে অশক্তি

(শিশু বা ছোট বালক বালিকা গণেরই অধিক হয়) ; অনবরত মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ; বারম্বার মূত্র ত্যাগের পরও মনে হয় যেন মূত্রাধার মূত্রে পরিপূর্ণ রহিয়াছে ; মূত্রাধারে বেদনা এবং টাটানি ; মূত্রাধারের গভীরতম অংশে কনুনানি, অম্ল বোধ এবং উহার স্লেমাক্রান্ত অম্ল ।

জননেন্দ্রিয় । জ্বীলোকের বাম ডিম্বকোষে হঠাৎ ধাকা লাগার স্তায় বেদনা ; বাম ডিম্বকোষের উপরিভাগে অত্যন্ত চাপাবোধ ; প্রচুর স্বেদ প্রদর নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র যন্ত্রাদির অম্ল ।

জ্বর । একদিন অন্তর একদিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শীতকম্প, বাহ্য কোমরের পশ্চাৎভাগে আরম্ভ হইয়া (কাপ্প, ল্যাক) সমুদয় শরীরে বিস্তৃত হয় ; শীত অপেক্ষা কম্প অধিক হয় ; হাড় বেদনা ; ওষ্ঠ এবং নখ নীলবর্ণ ; শীতল এবং উষ্ণাবস্থায় পিপাসা ; ঘর্ষাবস্থায় পাশ পরিবর্তন কালীন শীতবোধ ।

ব্যবহার । মূত্র শর্করা শূণ্য বহুমূত্ররোগ (Diabetes Insipidus) ; মূত্রাবরোধ বা মূত্র পরিমাণে অল্প বা মূত্রকৃচ্ছ্র ; মূত্রাধারে পাথরী ; ধ্বজ-ভঙ্গ ; জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা বা জড়তা ; স্বেদরাম জ্বর ; বাতরোগ ইত্যাদি অমূখে ইউপেটোরিয়াম্ পার্‌পূরিয়াম্ ব্যবহার্য্য । ডাক্তার হিউগ্‌স (Dr. Hughes) মতে জ্বীলোকের মূত্রাধারের উত্তেজনা এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । বাত রোগের ভাব ; বেদনাদি নিম্নদিক হইতে আরম্ভ হইয়া উপরেব দিকে বিস্তৃত হয় ; পিত্তযুক্ত তরল ভেজ ; বাত এবং পিত্তজ্বরে অত্যন্ত অস্থিরতা, বিছানায় বারম্বার এগাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করা, কৌণানি বা কৌকানি, ক্রান্তিবোধ এবং মুচ্ছার ভাব ইত্যাদি ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ক্যাস্‌টারিস্, কোপেইবা, ফেরাম্, আপো-সাইনাম্, ক্যানাবিস্ ত্রাটাইবা, সেনিসিও অরিয়াম্ ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহার্য্য । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) ২য় দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহার করিয়াই বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন ।

ফেরাম্ আয়োডেটাম্,-আয়োডাইড্ অব্

আয়রন্,-ফেরাম্-আয়োড্

(FERRUM IODATUM,-IODIDE OF IRON,-FERR. IOD.)

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথাধরা বা শিবঃপীড়া ।

কর্ণ । কানে সোঁ সোঁ শব্দ হওরা ।

মুখমণ্ডল । চক্ষুর রক্তবহা নালীতে রক্তাবরোধ এবং তদ্রূপ চক্ষু লালবর্ণ; চক্ষুর পানে তাকাইলে রোগীকে মৃত্তিকা পাথুরোগাক্রান্ত (Chlorotic) বলিয়া অনুভূত হয় (আর্স্, ফেরাম্) ।

উদর । অতিরিক্ত আহার করিলে ঘেরূপ হয়, সামান্য আহার জ্বাদি উদরস্থ হইলেও উদরে সেরূপ পূর্ণবোধ হয় (লাইকোপ্); উপসের দিকে ঠেলিয়া ধরিলে ঘেরূপ হয়, উদরে সেরূপ অনুভূত হয়; পেটে যেন সন্ধ্যার আহার দ্রব্য সঞ্চিত হইয়া ডেলাপানা হইয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, বাহার দরূপ রোগী সমুখ পানে হেলিতে পারে না (নাক্স-বম্) ।

মূত্র । মূত্র কাল্চে এবং উহাতে গাঢ় সাদা তলানি পড়ে; মূত্র ত্যাগের সময় মূত্রনালীতে জ্বালা এবং চিড়িক্ মারা ।

শ্রী-জননেন্দ্রিয় । মনে হয় যেন তলপেটস্থ যন্ত্রাদি নিম্ন দিকে ঠেলিয়া নামিয়া যোনি দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে; বসিয়া থাকিলে মনে হয় যেন যোনিদ্বার দিক হইতে কেহ কোন পদার্থ উপরের দিকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দিতেছে; জরায়ু নিম্নদিকে এত নামিয়া পড়ে যে যোনি দ্বারে আঙ্গুল দিলেই জরায়ুর মুখ এবং শ্রীবা আঙ্গুলে ঠাট্টাকে (বেল্, লিলিয়াম্); জরায়ুর মুখ বাকিয়া মোচড়াইয়া পড়া; ময়দাদি পাতলা করিয়া দিলে কঠিলে ঘেরূপ হয়, সেরূপ শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; মলত্যাগের সময় যোনিদ্বার দিয়া রসের জ্বার শ্বেত প্রদর নিঃসরণ; যোনি এবং যোনি দ্বারের চুলকানি এবং টাটানি (সোল্ফ্) এবং তদ্রূপ উক্ৰাংশের অভ্যন্তর ক্ষীতি ।

ব্যবহার । শ্রী জননেন্দ্রিয়ের জড়তা এবং উহাতে রক্তাবরোধ;

জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়া ; গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট জীলোকের মৃত্তিকা পাণ্ডু রোগ ; আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির ক্ষোটক রোগের (Tuberculosis) পূৰ্ব উৎপাদনের অবস্থা । সকল প্রকারের গণ্ডমালা জনিত রোগ ; জীলোকের অতিরিক্ত বা প্রচুর রজঃস্রাব ; আমাশয় ; হাত পা চক্কর পাতাদিতে শোধের জ্বার ক্ষীতি সহ পুরাতন আকারের সবিরাম বা পালা জ্বর ইত্যাদি অন্তর্বে ফেরাম্ আয়োডেটাম্ ব্যবহার্য্য ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । কলোফিলাম্, ফেরাম্, হেলোনিয়াম্, সিপিরা, সাল্ফার ।

ডাইলুশন বিচার । জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হইলে ডাক্তার এইচ্, সি, প্রেষ্টনের (Dr. H. C. Preston) মতে আয়োডাইড্, অব্, আয়রণের ১ম ক্রমের গুঁড়া দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে । কখন কখন ২য় এবং ৩য় ক্রমের গুঁড়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

হাইপারিকাম্ পার্ফোরেটাম্, -হাইপারিক্

(HYPERICUM PERFORATUM, -HYPERIC.)

কাঁচা অবস্থায় এই গাছের সমুদয় অংশ সংগ্রহ করিয়া উহাতে যথা-
লিহমে ২০ ওভার প্রক্ স্পিরিট্ মিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত
হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ু মণ্ডলীর
মধ্য দিয়া রক্তবহা নালীক অতিরিক্ত চেতনা বা উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া
ইহা মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার রক্তাবরোধ উৎপাদন করে এবং তদ্রূপ
শরীরের যে সকল অংশে অধিক স্নায়ু আছে, সে সকল স্থান অত্যন্ত উত্তে-
জিত হয় এবং অতিরিক্ত. চেতনার অবস্থা প্রাপ্ত হয় । অতএব মজ্জা এবং
স্নায়ুগুলির চর্শ্বের নিকটবর্তী অংশের আঘাতজনিত যে প্রকার অন্তর্বে বেদনা
ঘটনাাদি অত্যন্ত প্রবণ হয়, তাহাতেই হাইপারিকাম্ বিশেষ উপকারী ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ

মন । অরণ শক্তি বর্ধনতা বা হ্রাস ; আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পৰ
স্বাভাবিক মণ্ডলীর অত্যন্ত অবসন্নতা ।

মস্তক । মাথার গোলনেলে ও ভারিবোধ এবং মাথা ঘোরা ;
মস্তিষ্কে ছিঁড়িয়া ফেলা বা স্থলী বিধানের জ্বাৰ বাতনা ; অপরাহ্নে মাথার
উপরিভাগে দপ্পদপানি এবং মাথায় উষ্ণাহুতব ; শিরঃশীড়া, বাহা গাল বা
গালের হাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; পড়িয়া যাওয়ার দরুণ আঘাত লাগিয়া
শিরঃশীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে টাটানি ।

মুখগহ্বর । জিহ্বা সাদা (আন্টি-ক্রুড্, ব্রাই, নাক্স-বম্) বা হরিদ্রা
লেপযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা ; মুখগহ্বরে অভ্যন্ত
গুৰু বোধ ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল উষ্ণ, ক্ষীত এবং টল্ টলে ।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত পিপাসা (একন্) ; বমনোন্বেগ
এবং বমনের ইচ্ছা (ইপিকাক্, আন্টি-ক্রুড্) । উদরের ক্ষীতি এবং
বিস্তৃতি ।

শ্বাসযন্ত্র । বারম্বার গুৰু খুশ্-খুশে কাশি ; বা অল্পকাল স্থায়ী
খেউ খেউ শব্দ বিশিষ্ট কাশি ; বুকের মধ্যে আঁটা বোধ (ফস) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । পড়িয়া যাওয়ার পর বাহ বা গ্রীবার
সামান্য সঞ্চালনেও রোগী চীৎকার বরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে বাধ্য হয় ; মেরুদ
দণ্ডে চোট লাগিয়া উহার কার্য্যাবরোধ হেতু অস্থখ ; খাড়া হইয়া পড়ার
দরুণ গুহ্ব দ্বারের ঠিক উপরিভাগের হাড়ে চোট লাগার দরুণ চলিতে বা
মাথা ছোট করিয়া উপুড় হওয়াতে অশক্তি ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । মেরুদণ্ডের ঘাতনার দরুণ রোগী চলিতে পারে
না ; সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বর্ধনবোধ এবং উহার কাঁপনি ; অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত,
পায়ের পাতা ইত্যাদিতে অবশবোধ এবং উহাতে হামা দেওয়ার জ্বাৰ স্ফ
স্ফী ; ভাবিয়া থও থও হইলে যেকোন হয়, হাত পায়ের পাতায় সেক্রপ
ঘাতনা ।

ব্যবহার । মাধা বা মেরুদণ্ডে চোট লাগিয়া বা পড়িয়া বাইয়া মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার কার্যাবরোধ ; আঘাতজনিত অমুখ ; আঘাত লাগিয়া আব্‌ডু থাব্‌ডু হইয়া কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া যাওয়ার দরুণ ঘা ; অস্ত্রাঘাত ; খেঁতলিয়া যাওয়ার দরুণ ঘা ; আঘাতজনিত ধনুষ্কায় ; আক্ষেপ ; স্নায়ু-শূল ; বাতরোগ ; মেরুদণ্ডের অমুখ ; হাত পায়ের আঙ্গুলের সন্ধিতে কড়ার ভায় কঠিন ক্ষীতি (Bunions) ইত্যাদিতে হাইপারিকাম্ ব্যবহার্য্য । ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন (Dr. Franklin) বলেন যে, শরীরের যে সকল অংশে অধিক সংখ্যক স্নায়ু আছে (বিশেষতঃ হাত এবং পায়ের আঙ্গুল এবং নখের গোড়া), সে সকল স্থানে চোট লাগিয়া অত্যন্ত কষ্ট দায়ক খোলা ঘায়ের সঙ্গে সঙ্গে রক্তস্রাব হেতু সার্ক্যান্ডিক বলক্ষয় এবং স্নায়বিক মণ্ডলীর অত্যন্ত অবসন্নতা এবং খেঁতলিয়া বাইয়া ঘা হইলে ইহা এক অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । তাঁহার মতে খেঁতলিয়া বাইয়া বা মোচ-ড়াইয়া পড়িয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানের চামড়া ছিঁড়িয়া না গেলে আধিকা দ্বারা যেরূপ উপকার দর্শে, খেঁতলিয়া গিয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানের চর্ম ও পেশীগুলি ছিঁড়িয়া বাইয়া ঘা হইলে হাইপারিকাম্ দ্বারা সেরূপ উপকার দর্শে ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । কোন প্রকার আঘাত বা ভঙ্গ খাইয়া অমুখ ; হাত এবং পায়ের পাতায় আঘাত জনিত ধনুষ্কায় ; আঘাত পাইয়া মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার কার্যাবরোধ জনিত অমুখ ; পড়িয়া বাইয়া আঘাত পাওয়ার পর ঘাড় এবং বাহুর সামান্ত সঞ্চালনেই রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে ; মেরুদণ্ডের গ্রীবা দেশস্থ হাড় স্পর্শ করিলে বেদনামুক্ত হয় ; যেসকল অংশে অধিক সংখ্যক স্নায়ু আছে, বিশেষতঃ হাতপায়ের আঙ্গুল এবং নখের গোড়া, সে সকল স্থানে আঘাত পাওয়া ; আঘাত লাগিয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানের চর্ম ও পেশী খেঁতলিয়া ছিঁড়িয়া বাইয়া ঘা হইয়া উহাতে অত্যন্ত যাতনা ; স্নায়ুর পর সন্ধি গুলি আক্রান্ত হয় ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । একোনাইট্, আণিকা, ক্যালেলুলা, কট্টা ।
ডাইনুশন বিচার । ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিনের (Dr. Franklin) মতে

আত্যন্তরিক প্রয়োগের অল্প উচ্চ ক্রম ব্যবহা। ৬, ১২ এবং ৩০ ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইণ্ডিগো,-নীল,-ইণ্ডিগো

(INDIGO,-IND.)

নীল ঘটা নিয়মে সুগার অব্যম্বেকব সঙ্গে মিশাইয়া মিশ্র-জুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি। সুস্থ শরীরে ইহা সেবনে মস্তিষ্কের ঠিক কেন্দ্রস্থানে মনে হয় যেন মস্তিষ্ক বিস্তৃত হইতেছে; নাক দিয়া রক্ত পড়া; বাতের বেদনার জ্বর দস্ত শূল; পেট ফাঁপিয়া থাকে এবং মূত্রাধারের অধিক পরিমাণে উত্তেজনা এবং মূত্রের সঙ্গে প্রেমা নির্গমন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। আলোপ্যাথিক মতে ইহা ব্যবহারে মৃগী এবং কোরিয়া (Chorea) রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসকগণ কখন কখন ভাল ফল পাইয়া থাকেন। টেষ্ট (Teste) বলেন যে, শিশু এবং ছোট বালক বালিকাগণের ক্রিমির দ্রবণ আটকান অর তিনি ইহা দ্বারা আরাম করিয়াছেন এবং মূত্রাধারের পুৰাতন আকারের প্রেমা জনিত অমুখ এবং প্রেমহ রোগের তরুণ আক্রমণের পর মূত্রনালীর সঙ্কোচনে (Stricture of the Urethra) এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন। ডাক্তার গ্যারেন্সি (Dr. Guereusy) বলেন যে, গ্রীলোকের রক্তপ্রাবের সময় স্তনে জ্বালাহুতব এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ বধো পরিগণিত। ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ তিনি ইহা কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। প্রসাধ বদ্ধ হইলে অনেক সময় অন্তর্দেশীয় গ্রীলোকেরা মূত্রাধারের উপর নীল বর্ণিয়া লাগাইয়া থাকেন এবং উহা দ্বারা উপকার দর্শিতেও দেখা যায়। ইহা চিকিৎসকগণের স্মরণ থাকা উচিত।

কালী নাইট্রিকাম্,-নাইট্রেট্ অব্ পটাস্,-কালী নাইট্রিক্

(KALI NITRICUM,-NITRATE OF POTASH,-KALI-NITR.)

ইহাকে সচরাচর সল্ট্‌পিটার (সোরা) বলে। ইহার অস্ত্র নাম নাইট্রাম্ (Nitrum)-নাইটার (Nitro)। কোন এক বিষমত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত সোরা ক্রয় করিয়া যথানিয়মে স্ফুগার অব্ মিক্চর সঙ্গে মিশাইয়া ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথানিয়মে চুয়ান জলে মিশাইয়া ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয়। যথানিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার ২য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয় এবং ৩য় দশমিক ও ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা কসেরুকা মৰ্জ্জাসম্বন্ধীয় শ্বাস্ মণ্ডলী আক্রমণ করিয়া কসেরুকা মৰ্জ্জা এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত উৎপাদন করিয়া, হৃৎপিণ্ড, উহার অরিকেল্‌স্ (Auricles) নামক কোটির এবং তৎসম্বন্ধীয় ধমনির বিস্তৃতির ব্যাঘাত জন্মায়। ইহা রক্তের উপর তরল কারক এবং বিনাশকারক শক্তির ভায় কার্য্য করে। মূত্রকোষ, শ্বাসযন্ত্র এবং আহারবহা নালীর শৈল্পিক কিলীর উপর উত্তেজক ঔষধের ভায় কার্য্য করিয়া মূত্রের পরিমাণ এবং উহার ঘণ পদার্থের পরিমাণ অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি কমে ও শ্বাসযন্ত্র এবং আহার বহা নালী উত্তেজিত করিয়া উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার প্রদাহ উৎপাদন করিয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। প্রাতঃকালে কোন বিষয়ে চিন্তায় অশক্তি; মনের উদ্বেগ; ক্লান্তি এবং সকল বিষয়ে বিরক্তি, স্তব্ধতাব এবং কঁাদ কঁাদ ভাব (নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-মক্, ইগ্‌নেস্, পাল্‌স্)।

মস্তক। মাথায় গোলদেলে বোধ; মাথাঘোরা; মাথায় চিমে, অবসন্ন এবং ভারিবোধ; মাথায় চাপিয়া ধরার ভায় বেদনা, কপালেই বাহা

অধিক অম্লভূত হয়; মাথার পশ্চাৎভাগে কসিয়া বা আঁটিয়া ধরায় ভ্রায় বেদনা; আক্রান্ত স্থান নোয়ান যায় না; রোগী তাহার মাথা পশ্চাৎদিকে বাঁকাইতে বাধ্য হয়; চুল বাঁধিয়া রাখিলে বাতনার হ্রাস; মাথার স্থানে স্থানে গরমবোধ; চুল টানিলে বেক্রপ হয়, মাথার উপরিভাগে সেক্রপ বেদনা; স্পর্শনে মাথার হাড় বেদনায়ুক্ত হয় (কার্কো-বেজ, চায়না, মার্ক, নেট্রাম্-মিউর, নাইট্রিক্-অ্যাস); মাথার স্থানে স্থানে মরা চাম পড়ে এবং চুলকার ।

চক্ষু । কণহায়ী অন্ধতা; আগটীর ভ্রায় নানা প্রকারের রঙ্গ যেন চক্ষুর সম্মুখে ভাসে; চক্ষে জালা, চক্ষু দিয়া জলপড়া এবং চক্ষে আলোক সহ না হওয়া বাহা প্রাতঃকালেই অধিক হয়; ঠাণ্ডা জল দিয়া ধুইলেও চক্ষুর উক্ত প্রকারের অবস্থা ।

কর্ণ । বধিরতা; কানের মধ্যে টন্টন্, সোঁ সোঁ শব্দ হয় (চায়না, মার্ক, সাইলিসি, সালফ্); রাত্রিতে এবং যে পাশে শোয়া যায়, সে পাশের কানে স্থচীবিধানের ভ্রায় যাতনা; কানের পশ্চাৎদিকে কসিয়া ধরায় ভ্রায় বেদনা ।

নাসিকা । শর্দির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাণ শক্তির বিনাশ; হাঁচিদেওয়া; নাসিকার পশ্চাৎভাগ দিয়া স্লেয়া মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে পড়ে; নাক দিয়া রক্ত পড়ে; নাক শুষ্ক এবং কঁক হয়; নাসারন্ধ্র ক্ষীত এবং চাপিলে বেদনায়ুক্ত হয়; নাকের হাড় স্পর্শনে বেদনায়ুক্ত হয় ।

মুখমণ্ডল । মুখাকৃতি শিটা, কণ, বসিয়া যায়; নাক ঠাণ্ডা (অ্যাস, ক্যাম্ফার, বিরেট্-অ্যাব্); গালে ছিঁড়িয়া ফেলার ভ্রায় প্রবল বেদনা (চায়না, চিনিমাম্-সালফ্, স্পাইজেল্) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মাড়ি লালবর্ণ এবং ক্ষীত; মাড়িদিয়া সহজে রক্ত পড়ে (মার্ক, নাইট্রিক্-অ্যাস); দাঁতের গোড়ার ছিঁড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা এবং দপ্পদপানি, ঠাণ্ডা ত্রব্যে যাহার বৃদ্ধি হয় (অ্যাস্টি-ফ্রুড, ক্যাক্-কার্ক, ষ্ট্রাকিস); মুখে বিস্ত্রী বমনোৎপাদক স্বাদ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে গলার মধ্যে টক স্বাদ; জিহ্বা এবং মূখের মধ্যে ভক্ষবোধ (অ্যাস, আই, নান্স-মফ্); ফাটিয়া গেলে বেক্রপ হয়, জিহ্বার অগ্রভাগ সেক্রপ জালা করে; জিহ্বার আগাক্ত কুসুড়ী; জিহ্বা সাধা স্লেয়া

ছারা শ্লেপযুক্ত ; মুখে অত্যন্ত হর্গন্ধ (আস্, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্-আয়োড্, নাইট্রিক্-আস্) । গলার মধ্যে জ্বালা এবং কঠিনবৎ বেদনা, বাহার দরুণ গিলিবার ব্যাঘাত জন্মে ; গলার থেকুর দিলেই গলা দিয়া কঠিন মিষ্ট স্বাদ যুক্ত শ্লেয়া নির্গমন ; গলার মধ্যে ছাল* উঠা বা টাটিয়া ফেলার স্থায় চড়্ চড়ানি (আমন্-কার্ক্, কষ্ট্) ; গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি ; আল্জিভ্রা এবং টন্সিল্ লালবর্ণ (বেল্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । হয় অত্যন্ত ক্ষুধা, নতুবা ক্রটি এক ঘাবেই না থাকে ; প্রবল পিপাসা ; খাদ্য কষ্টের দরুণ জলাদি পান করিতে অশক্তি ; বমনোদ্বেগ ; গা বমী বমী করা বা পেট কামড়ানী ; রক্ত মিশ্রিত শ্লেয়া বমন ; পেটে পিটে লাগিয়া গেলে ঘেরুপ হয়, পাকস্থলীতে সেরুপ অনুভূত হয় (সিমিসিফ্, ইয়েস্, পিষ্ট্রোল্, পাল্‌স্) ; পাকস্থলীতে হয় ঠাণ্ডা বোধ, নতুবা জ্বালা বোধ ; পাকস্থলীর প্রদাহ ; পাকস্থলীতে বাটিয়া ধরার স্থায় প্রথর বেদনা, বাহার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে ; পাকস্থলীর মধ্যে চাপা বোধ এবং চর্কনবৎ যাতনা । উদরে শূল বেদনা, ডাইন পার্শ্বে বাহা অধিক অনুভূত হয় ; পেট কামড়ানী বা নাভি প্রদেশে কঠিনবৎ বেদনা (কলোস্) ; উদর অত্যন্ত ক্ষাত ও বিস্তৃত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে গড়্ গড়্ কল কল শব্দ হওয়া (চায়না, কার্কো-বেজ্, লাইকোপ্, সাল্ফ্) ; গুহু ছার দিয়া প্রচুব পরিমাণে দূষিত বায়ু (Flatulence) নিঃসরণ ।

মল । জলবৎ তরল, স্বাভাবিক মল সংযুক্ত, রক্তমিশ্রিত, কোমল মল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শূল বেদনা ; গরুর বাছুরের মাংশ খাইয়া উদরাময় ; কোষ্ঠবদ্ধ ।

মূত্রেযন্ত্র । বারম্বার অধিক পরিমাণে ফিকা মূত্রত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে লাল্‌চে, ঘোলাটিয়া পদার্থের সঞ্চার ; মূত্রে শ্লেয়া তলানি পড়ে ; উহার ঘন পদার্থের বৃদ্ধি হয় ; উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৩০-১০৪০ হয় ; মূত্রাবরোধ ; মূত্র ত্যাগের বারম্বার ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রনাশী ইত্যাদিতে জ্বালা ; বেগদিলে মাত্র কয়েক ফোঁটা মূত্র প্রথমতঃ নির্গত হয় ; উত্তেজক ওষধ সেবনের পর উক্ত প্রকারে মূত্রত্যাগ এবং তদরূপ উক্ত প্রকারের যাতনা ; প্রমেহ জনিত উক্ত প্রকারের মূত্র কৃচ্ছ ।

জননেন্দ্রিয় । পুষ্কবাঙ্গ প্রবল বেগে খাড়া হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা বৃদ্ধি হয় । স্ত্রীলোকের রক্তঃস্রাব ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং প্রচুর পরিমাণে রক্তঃস্রাব ; রক্তঃস্রাবের রক্ত কালীয় ভায় কাল (ক্রোকাশ্, সাইক্রেমেন্, সাবাইনা) ; উদর, কোমরের পশ্চাৎ ভাগ এবং উরুতে বেদনা (সিমিসিফ্, পাল্‌স্) ।

শ্বাসযন্ত্র । স্বরশূন্যতা ; কণ্ঠনালীতে চ্যুটিয়া ফেলার ভায় বা খশ্‌ খশে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ ; শ্বাস কষ্টের দরুণ জলাদি পানে অশক্তি, বাহার দরুণ রোগী জলাদি এক ঢোক এক ঢোক করিয়া পান করিতে বাধ্য হয় ; ছোট ব লক বালিকাগণ জলাদির পাত্র ছুই হাতে ধরিয়া আগ্রহের সহিত জলাদি পান করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু সে একবারে এক ঢোকের অধিক জলাদি পান কবিতে পারে না ; সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে সময়ে সময়ে শ্বাসকষ্ট এবং শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়, প্রাতঃকালে যাহা অনেক কম থাকে ; সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠিতে অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট (আর্স্, আক্সি পিরাস্, ক্যাক্-কার্ক্, মার্ক্) ; হাঁপানি কাশি ; একবারে সোজা হইয়া শয়ন করাতে অশক্তি এবং শ্বাস কষ্ট ও শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হওয়া (আর্স্, ইপিকাক্, সাযুকান্) ; কাশি ; শেষ রাত্রি ৩টার সময় অবসন্নকারক শিরঃপীড়া হইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; বহির্কায়ুতে কাশির উল্লেখ হয়, উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় অথবা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিলে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে কণ্ঠনবৎ ও হুচী বিধানের ভায় যাতনা ; গলাদিয়া জমাট রক্ত উঠা ; গলায় থেকুর দিয়া প্লেগ্মা নির্গমনের পর কাশি ; পৃষ্ঠদেশ পান হইতে ফুফুস আঁটিয়া ধরিলে স্ফেৰূপ হয়, বৃকে স্ফেৰূপ আঁটা বোধ ; দীর্ঘ নিশ্বাসে অথবা কাশিলে বৃকে হুচী বিধানের ভায় যাতনা (ব্রাই) ; বৃকে রক্তাধিক্তা বা বক্তাব্রোধ ; একটা বোকা চাপাইয়া দিলে স্ফেৰূপ হয়, বৃকে স্ফেৰূপ চাপ, ভারি এবং আঁটাবোধ, শ্বাস কষ্ট, বাহার দরুণ রোগী ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় ; ফুফুস যে পরিমাণে যকৃততবৎ কঠিন (Hepaticized) হয়, তদোপেক্ষা শ্বাস কষ্ট অধিক হয় ; ফুফুস পাকিয়া উহাতে পূর্ব উৎপন্ন হয় এবং তদরূপ অত্যন্ত দুর্গন্ধকারক ঘর্দ হয় (হিপ্-সাল্‌ফ্, কন্‌) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । তাড়াতাড়ী নড়িলে চড়িলে, অথবা বস। অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে, জ্বংস্পন্দন এবং উহাৰ সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলে উষ্ণ-মুভব ও বৃকে আঁটা বোধ ; জ্বংস্পন্দন, দ্বববর্তী স্থান হইতেও যাহার শব্দ শুনা যায় (স্পাইকেল) এবং উহাৰ সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস কষ্ট ও মনের উত্তেজনা, যাহার দরুণ রোগী শয়নাবস্থা হইতে বিছানায় উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় (একন) ; নাড়ী সাধারণতঃ পূর্ণ, কঠিন, দ্রুতগামী ; প্রাতঃকালে নাড়ী মৃদুগতি বিশিষ্ট, দুর্বল এবং সূত্রবৎ হয় ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশের কঠিনতা এবং উহাতে পক্ষাঘাতের স্থায় অবশ্য এবং অসাড় বোধ ; মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁতলিয়া গেলে যেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎ ভাগে সেরূপ যাতনা ; পৃষ্ঠদেশে চাপা এবং আলাবোধ, নড়াচড়াতে যাহার উপশম হয় ; মূত্র-কোষ প্রদেশে কসিবা ধরার স্থায় বেদনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতের স্থায় অবশ্য বোধ এবং উহাৰ কাঁপনি ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের বেদনার স্থায় বেদনা এবং ব্যক্তিহে উহাতে স্থলী বিধানের স্থায় যাতনা ; আক্রান্ত অঙ্গ যেন কাঠের স্থায় অনুভূত হয় ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা ।

চর্ম্ম । শরীরের স্থানে স্থানে চুলকানি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণ বা ফোঁস্কার স্থায় ফুসুড়ী ; স্থলীবিধাইলে বেরূপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ অনুভূত হয় এবং তৎপর আলামুভব ; শরীরে হরিজ্ঞা বর্ণের সিরাম পূর্ণ আলা-যুক্ত ফোঁস্কার স্থায় ফুসুড়ী, চুলকাইলে বাহা ফাটিয়া যায় ।

নিদ্রা । সর্বদা হাঁইতোলা এবং নিদ্রার ভাব ; ব্যক্তিহে অস্থির-নিদ্রা ; ব্যক্তি হুই প্রহরের পর বা শেষ ব্যক্তিহে নিদ্রা শূন্যতা ; ব্যক্তিহে-ঘুমের ঘোরে বোবায় ধরা (Night-mare) ।

জ্বর । অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার সময় শীত কম্প এবং ঠাণ্ডাবোধ, নড়াচড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয়, শয়ন কবিলে বাহা থাকে না ; শীত কম্প ও তৎপর বর্ণ এবং উহাৰ মধ্যবর্তী কালে শরীর উষ্ণ হয় না ; শীত এবং কম্প ও উহাৰ সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা ; ব্যক্তিহে শরীর উষ্ণ হয় ; কিন্তু উহাৰ সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা থাকে না এবং উহাৰ পর ঘর্ম্ম ও হয় না ; সামান্য

পরিশ্রমেই দুর্বলকারক ঘর্ষ হয় (ক্যাক্-কার্ক, চিনিলাম-সাল্ফ, ডিপ্-সাল্ফ, মার্ক, ফস্, সাল্ফ) ; রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ষ (আস্, ফস্, মার্ক) ।

ব্যবহার । ক্যাছারিস্, টার্পে-টাইন্স এবং মসলাদির অপব্যবহারের পর মূত্র কুঞ্চিত ; মূত্রাবরোধ ; অনাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্রতাগ বা স্বপ্নে বিছানায় প্রস্রাব করা ; মূত্রকোষের ব্রাইটস্ ডিজিজ্ ; বহুমূত্র ; উদরাময় ; অজ্ঞাবরক বিলী প্রদাহ (Peritonitis) ; কুক্ষস প্রদাহ ; হাঁপানি ক্যাশি ; যক্ষাকাল ; বাত রোগ ; শোথের ত্রায় ক্ষীতি (Edema) ; পক্ষাঘাত ; বুক আলা ; হৃৎপিণ্ডের কার্যের বৈলক্ষণ্য ; কোরিয়া (Chorea) ইত্যাদি অস্থখে ক্যালী নাইট্র-কাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সমুদয় শরীরের পেশীর স্পন্দন এবং কম্পন ; অত্যন্ত নিস্তেজতা এবং দুর্বলতা ; অঙ্গাদির কাঁপনির সহিত দুর্বলতা ; মনে হয় যেন সমুদয় শরীর বা উহার কোন কোন অংশ কাঠ নিখিত ; শরীরে কুট্‌কুটানি ; শরীরের অনেক অংশে আঁটা বোধ ; উজ্জল লাগ রক্তস্রাব (এক্ন্, ইরিজারেণ্, হামামেলিস্, ইপিকাক্, সিকেল্) ; শরীর, গ্রীবা এবং উরুর হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষীতি ; উনানের আঙনের তাপে, জল বৃষ্টির সময়, ঠাণ্ডা জ্বো, ঘর্ষের সময়, বহির্কায়ুতে, পূর্ণিমা তিথিতে, গরুর বাছুরের মাংশ খাইলে, কপূর্ব খাইলে, অস্থখের বৃদ্ধি ; উষ্ণ বায়ুতে এবং ঘর্ষের পর অস্থখের উপশম ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । একোনাইট্, ক্যাছারিস্, টিরিবিহুনা, আর্সিনিক ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম হইতে ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য । এই ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছু বলিতে পাবেন না, কারণ, তিনি ইহা অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।

ক্যালী পার্ম্যাঙ্গেনিকাম্, পার্ম্যাঙ্গেনেট্ অব্ পটাস্,-

ক্যালী-পার্ম্যাঙ্গেন্

(KALI PERMANGANICUM,-PERMANGANAT OF

POTASH,- KALI-PERMANG.)

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি । অস্থ শরীরে ইহা সেবনে গলার মধ্য প্রদাহযুক্ত হয় । এই প্রদাহ নানিকার গোড়া, কণ্ঠনাগী, লাল নিঃসারক গ্রন্থি এবং কর্ণের মধ্যদেশ পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় ও গলার মধ্যে ডিপথিরিয়ায় ত্রায় কৃত্রিম পর্দা উৎপন্ন হয় । লক্ষণ বিশেষে অন্ত্যস্ত ঔষধ দ্বারা কোন উপকার না দর্শিয়া মুখে অসহ্য দুর্গন্ধ, কাল্চে দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়, বমন দ্বারা উদরস্থ জলীর পদার্থ নাক দিয়া বাহির হয় এবং সাক্ষাৎ বসন্ত ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় । এমতাবস্থায় ডাক্তার আলেন্ (Dr. Allen) একটা ডিপথিরিয়া আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন । রাত্রি ৯টার সময় ৩ গ্রেইণ্ পার্ম্যাঙ্গেনেট্ অব্ পটাস্, ২ মাশ জলে মিশাইয়া, প্রত্যেক ঘণ্টায় এক মাত্রা সেবনের ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া আসিলেন । সেই দিনই রাত্রি ১২ টার সময় তিনি আবার রোগীকে দেখিলেন । তখন তিনি দেখিলেন রোগীর স্থান কণ্ঠ অনেক কমিয়াছে এবং শরীর হইতে উষ্ণ শর্ম্ম বাহির হইতেছে । এমতাবস্থায় এই ঔষধ আরো সেবন করিতে বলিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন । তৎপর দিবস প্রাতে গিয়া দেখিলেন রোগী অস্থ-বস্ত্রের ত্রায় বসিয়া রহিয়াছে এবং তাহার মুখাকৃতি অনেক ভালর দিকে পরিবর্তন হইয়াছে । গলার মধ্যে কৃত্রিম পর্দা বিগলিত হইয়া গিয়াছে এবং মুখে দুর্গন্ধ একবারেই আই । তৎপর রোগী জাগিয়া থাকার অবস্থায় ৩ ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা সেবনে রোগী অতি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিল । ডাক্তার ড্রামন্ড এবং ডাক্তার উড্গেট্‌দের (Dr. Drummund and Woodgates) মতে ৪ গ্রেইণ্ পার্ম্যাঙ্গেনেট্ অব্ পটাস্, ৮ আউন্স্ জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা কুলী (Gargle) করিলে ক্ষত সহ গলার মধ্যে বেদনায় বিশেষ উপকার দর্শে । ক্ষত সহ গলার মধ্যে বেদনায় ডাক্তার আলেনের (Dr. Allen) ত্রায় ইহার

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যবস্থা করিয়া ২৩ টী রোগীর চিকিৎসায় লেখক আশাতীত ফল পাইয়াছেন ।

লাইকোপাস্, বার্জিনিকাস্,-লাইকোপাস্,

(LYCOPUS VIRGINICUS,-LYCOPUS. VIRG.)

এই গাছের কাঁচা শিকড় দিয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । অত্যন্ত যন্ত্র অপেক্ষা ইহা হৃৎপিণ্ডে অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে । হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার কার্য ডিজিটালিসের ত্রায় । কিন্তু ডিজিটালিসের ত্রায় ইহা হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি উৎপাদন করে না । প্রথমতঃ ইহা হৃৎপিণ্ডের শক্তি এবং জীবনী শক্তির হ্রাস করে এবং ধমনিতে রক্তের চাপ কম করে । অতএব সকল দিকেই কদিয়া ধরার ত্রায় অনুভূত হইয়া থাকে । দ্বিতীয়তঃ ইহা হৃৎপিণ্ডের অতিরিক্ত চেতনা উৎপাদন করে এবং এই ঔষধ যদি অধিক কাল ব্যবহার করা যায়, তবে হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতির সহিত বিবৃদ্ধি হয় । ইহার প্রাথমিক কার্যের ফলের দ্রুত শরীরের সমুদয় যন্ত্রেই শিরা সম্বন্ধীয় রক্তাবরোধ (Venous Congestion) হয় । যকৃত, ফুফুস এবং মূত্র কোষেই এই রক্তাবরোধ অধিক হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

চক্ষু । চক্ষু যেন বহির্দিকে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ভয়ানক দপ্ দপ্ শব্দ হয় ; হৃৎপিণ্ডের অন্তরের দ্রুত চক্ষু বহির্দিক পানে বাহির হইয়া পড়ে ; বাম চক্ষুর কোটরের উপরিভাগে শুষ্পৃশ্বে বেদনা ; চক্ষুর গোলকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক চাপ পড়া (অলোজ, ব্যাপ্ট, সিমিসিফ) ।

পাকস্থলী । পাকস্থলীর কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে চাপিয়া বাঁধার ত্রায় বেদনা বা যাতনা ; অঙ্গীর্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরোচ্ছ্বাস প্রদেহে বেদনা এবং যাতনাবোধ ।

মূত্র । উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট কামড়ানী এবং পেটে গড়্গড়, কল কল শব্দ হওয়া ; দুর্বল হৃৎপিণ্ডের দ্রবণ কামল রোগে উদরাময় ; কোষ্ঠবদ্ধ ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র পরিমাণে অল্প, গাঢ়, কাদাটিয়া বা ঘোলাটিয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের পাতার শেথের ন্যায় স্বীতি ; মূত্রে অতিরিক্ত পলিমাণে শ্লেষ্মা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে এপিথেলিয়েন্ কোষ (Epithelial cells) এবং অক্সলেটে অব্ লাইম্ (Oxalate of Lime) থাকে ও মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১২-১০২০ হয় ; শর্করা বহুমূত্র (Diabetes Mellitus) ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের অণুকোষের মধ্য দিয়া ছুরিবিধানের দ্বায়া প্রথর বেদনা ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বাসকষ্ট ; কর্ণনালীতে আঁটাবোধ ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলাদিয়া সামান্য পরিমাণে ফিকা শ্লেষ্মা নির্গমন ; পাজরার হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা (সিমিসিক, রানান্ কুলাস্, রডোড্, রান্-টক্স) ; বুকে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস কষ্ট ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপিণ্ডের চতুঃস্পর্শবর্তী স্থানে আঁটিয়া ধরার দ্বায়া বেদনা বা যাতনা ; হৃৎপ্রদেশে হাতের বেদনার দ্বায়া কন্কনানি বা ছুরি বিধানের দ্বায়া প্রথর বেদনা (একন্, ক্যাল্ মিয়া, রাস্টক্স, স্পাই-জেল্) ; হৃৎপিণ্ডের প্রথম শব্দের (1st Sound) পরিবর্তে মাইটেল্ রিগার্জি-টেশনের (Mitral Regurgitation) বোয়িং শব্দ (Blowing Sound) শুনা যায় ; বক্ষাস্থির (Sternum) ডাইন দিকে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অধিক স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় ; হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত আঁটাবোধ এবং যাতনা ; হৃৎপ্রদেশে হাতের পাতা রাখিলে হৃৎপিণ্ডের দন্দপানি হাতে অতি সামান্য অল্পভূত হয় বা উহা একবারেই অল্পভূত হয় না (ডিক্টি) ; হৃৎপিণ্ডের অবসন্নতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী অসম (Intermittent) ও মুছুরি তাঁব (ডিক্টি) ; নিম্ন স্থান হইতে তাড়াতাড়ি উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় হৃৎপিণ্ডের উক্তাবস্থা (অন্) ; হৃৎপিণ্ডের শব্দ অস্পষ্ট ; হৃৎপিণ্ডের সিস্টোলিক্ (Systolic) শব্দ ডায়েটোলিক্ (Diastolic) শব্দে পরিবর্তিত হয় ; স্নায়ু ভাঙ্গিলে হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত কঠোর স্পন্দন, বাবধার বাহার বিরাম হয় ;

হৃৎপিণ্ডের হ্রস্বল, ক্রান্ত এবং অনিয়মিত কার্য (ডিজিট্) ; হৃৎপিণ্ডের প্রবল এবং উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট স্পন্দন বা দপ্পদপানি (স্পাইজেল, বিরেট, বিরাইড), বাহ্যিক বিজ্ঞান হইতে কএক হাত দূরেও শুনা যায় ; চক্ষু যেন উহার কোটরের বাহির হইয়া পড়ে ; নাড়ী ক্রান্তগামী, অসম (Intermittent) ; হ্রস্বল অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট এবং অসম ; প্রত্যেক বার নিশ্বাসে নাড়ী ক্রান্তগামী হয় ; নাড়ী লুপ্তশ্রায় ; নাড়ীর অবস্থা সৰ্বদা পরিবর্তনশীল ; নাড়ীর স্পন্দনের অসমতা বা অনিয়মিততা এবং আঙ্গুলের চাপে অনায়াসে ডুবিয়া যায় ।

পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরে বাতের বেদনার জ্বাশ বেদনা (রাস্টক্স) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের বেদনার জ্বাশ বেদনা (রাস্টক্স) ।

ব্যবহার । হৃৎপিণ্ডের অতিরিক্ত কার্যের চাক্ষুশ্য, বাতরোগ, ধাতুগত বা সার্বজ্ঞিক হ্রস্বলতা অথবা তামাকু ইত্যাদি হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক দ্রব্য বা ঔষধ সেবন দ্বারা হইক, হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা এবং হ্রস্বলতার লাইকোপাস্ বিশেষ উপকারী । ইহা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অপেক্ষাকৃত মৃদু, পূর্ণ এবং নিয়মিত করে । ইহা স্নায়বিক উত্তেজনা অথবা হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক অস্থখজনিত স্তম্ভস্পন্দনে বিশেষ উপকারী । ডিজিটালিসের পরিবর্তে ইহা কাশি এবং হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা নিবারণ করে, জ্বর এবং রক্তাধিক্য ধমনির কার্যের হ্রাস করে ; যক্ষাকালে ইহা হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত নির্গমন নিবারণ করে । হৃৎপিণ্ডের অস্থখ জনিত চক্ষু উহার কোটর স্রষ্ট হইয়া বহির্দিকে সরিয়া পড়া ; আমাশয় ; উদরাময় ; কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডাবরক ঝিল্লী প্রদাহ বা প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) ; বাতরোগ ; বায়ুশূল বা বায়ুশূলের জ্বাশ বেদনা ইত্যাদি রোগে লাইকোপাস্ ব্যবহার্য । ডাক্তার হেল্ (Dr. Hale) বলেন যে, হৃৎপিণ্ডের যেপ্রকার কার্য্যসম্বন্ধীয় অস্থখে হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের শক্তির হ্রাস হয়, তাহাতে লাইকোপাস্ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । বাতের জ্বাশ বেদনা, বাহ্যিক বায়বিক হইতে ভাইন দিকে বিস্তৃত হইয়া আবার পুনরায় বায়বিক দিকের দিকে

এবং বাহা পেশী ও সন্ধিগুলিই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে এবং বাহা নড়া চড়া বা ঠাণ্ডা বাতাসে ও বাতনাদিব দিকে মন গেলেন বৃদ্ধি হয় ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । একোনাইট্, ক্যাক্টাস্, ডিজিটালিস্, ক্যালমিয়া, স্পাইজেলিয়া, বিনেটুম আলবাম্ ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম হইতে ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহার্য্য ।

মিনিয়ান্থিস্ ট্রিফোলিয়েটা,-মিনিয়ান্থ্

(MENYANTHES TRIFOLIATA,-MENYANTH.)

এই গাছের সমুদয় অংশ প্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা শৈথিল্য ক্লান্তি আক্রমণ করিয়া উত্তেজনা এবং রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ উৎপাদন করে । চক্ষু এবং অপটিক্‌ নার্ভ্ (Optic nerve) প্রথমতঃ আক্রমণ করিয়া তৎপদ পীড়া এবং দৃষ্টিহীনতা উৎপাদন করে ও গ্যাংলিয়োনিক সিস্টেম (Ganglionic System of nerves) উপর কার্য্য করিয়া তৎপদ রিয়া জনিত অরের স্থায় অব উৎপাদন করে । টেষ্টিস্ উপর কার্য্য ড্রিসিয়ার স্থায় । কিন্তু ইহার কার্য্য ড্রিসিয়ার স্থায় নহে । তিনি আরো বলেন যে, এমন খুব কম অল্পই আছে যাহাতে ইহা হইয়া থাকে এবং বাধ্যতে মিনিয়ান্থিস্ ব্যবহৃত হইতে পারে । এই মতের সম্পূর্ণ পৌষকতা কবা যাইতে পারে না ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথার গোলমেলে এবং ভারি নোংরা ; মাথার উপর দিক হইতে নিম্নদিকে চাপপড়া, সজোরে হাতদিয়া চাপিয়া ধরিলে বাহার উপশম হয় ; মাথায় চাপিয়া ধরার স্থায় অবসরকারক বেদনা, কপালেই বাহা অধিক অগ্নুভূত হয় ; কপালের ডাইন পার্শ্বে কানের ঠিক উপবিভাগের

নিকটবর্তী স্থানে স্থচীবিধান বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা ; মক্ষিকের বাম দিকে বেদনা, যাহা মাথার উপরিভাগ পানে বিস্তৃত হয় ।

চক্ষু । চক্ষে অন্ধকার দেখা ; কৃয়াশার মধ্যদিয়া দেখিলে যেক্রপ হয়, চক্ষে সেক্রপ রাস্মা দেখা এবং চক্ষুব সম্মুখে পাখীর ডানা ঝাড়ার জ্বাৰ ধড়ফড়ানি (আগারিকাশ্, সাইক্লোমেন্, মার্ক্, কস্, সাল্ফ্) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের পেশীর স্পষ্ট স্পন্দন, যদিচও উহাদ্বারা কোন বিশেষ বাতনা অনুভূত হয় না (আগারিকাশ্, ইগ্নেনস্, নাক্স-বম্), ডাটন পার্শ্বেই যাহা অধিক হয় (বেল্) এবং বিশ্রাম কালীন যাহার বৃদ্ধি হয় ।

গলার মধ্য । গলার মধ্যে ঠাণ্ডাবোধ, যাহা আহাৰ বহা গলনাশী পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বমনোবেগ, পাকস্থলীতে চাপাবোধ হইয়া বাহার উদ্রেক হয় ; কাঠ উদ্গাব উঠা ।

উদর । অতিরিক্ত পরিমাণে আহাৰ করিলে যেক্রপ হয়, উদরের সেক্রপ ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি, কিন্তু আহারে রুচির কোন হ্রাস হয় না ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন উদরে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে এবং তদক্রপ বারম্বার দূষিত বায়ু নির্গত করার চেষ্টা (কার্কো-বেজ্, চায়না, লাইকোপ্) ; ভাষাকু থাইলে উদরের ক্ষীতি অনেকটা কমিয়া যায় (ইগ্নেনস্) ।

মল । কোষ্ঠবদ্ধ ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে একবারে অতি সামান্য পরিমাণ মূত্র নির্গত হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বভঙ্গ ; শ্বাসকষ্ট ; বুকের দুই পার্শ্বেই চাপাবোধ এবং উগার সঙ্গে সঙ্গে স্থচীবিধানের জ্বাৰ অত্যন্ত বাতনা, নিশ্বাসে যাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় ।

পৃষ্ঠদেশ । বায়ুস্ফীকৃতিতে ছিদ্র করা, বা বাটিয়া ধরার জ্বাৰ ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনা, যাহা মেরু দণ্ডের মধ্য দিয়া বিস্তৃত হয় ; দুই স্ফীকৃতির মধ্যবর্তী স্থানে ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বাৰ অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা, যাহা নিয়মিতকৈ বিস্তৃত হয় এবং দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণসেই অধিক অনুভূত হয় ; কোমরের

পক্ষাণ্ডুভাগে এবং শুষ্কদ্বারের ঠিক উপরিভাগ প্রদেশে চাপিয়া ধরা, মোচ-
ড়াইয়া পড়া বা খেঁতুলিয়া যাওয়ার ভ্রায় বেদনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । ডাইন হাতের উপরিভাগের পেশী স্পন্দন ; বাম
হাতের সম্মুখ অংশের পেশীতে দিলদার ভ্রায় (প্রায় পক্ষাঘাতের ভ্রায়)
বেদনা বাহা হাতের পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; ডাইন পায়ের পেশীতে
খিলধরার ভ্রায় বেদনা, বাহা নিম্নদিক হইতে পক্ষাঘাতের ভ্রায় উপরের দিকে
বিস্তৃত হয় ; সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে খিল ধরার ভ্রায় বেদনা বা যাতনা ।

নিদ্রা । যে বিষয় জাগরিতাবস্থায় অরণ থাকে না, ঘুমের ঘোরে সে
বিষয়ে স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা ।

জ্বর । শীতবোধ, আঙ্গুলেই বাহা অধিক অনুভূত হয় ; পায়ের
পাতা বরফের ভ্রায় ঠাণ্ডা (টেবেকাম্) এবং শরীরের অন্তঃস্থ অংশ গরম ;
শরীরের উর্দ্ধাংশে শীতকম্প এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাইতোলা ।

ব্যবহার । বেগরকার জ্বরে শীতলাবস্থা অধিক স্পষ্টরূপে প্রকাশ
পায়, হানিমানের মতে সেগরকার জ্বরে মিনিয়াস্‌ই ব্যবহার্য্য । গর্দ্বি জনিত
অসুখ ; অকতা ইত্যাদি অসুখে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ড্রিয়ার ।

ডাইলুশন বিচার । ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছু
বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।

মার্কিউরিয়াম্ সায়েনেটাস্,-সায়েনাইড্-অব্

মার্ক্যুরি,-মার্ক্-সায়েন্

(MERCURIUS CYANATUS,-CYANIDE OF MERCURY,-MERC. CYAN.)

রেক্টাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার আরোহ প্রস্তুত হয় এবং সুগার
অব্ মিকে মিশাইয়া ইহার মিশ্র গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি । ডাক্তার বিলার্স (Dr.
Villers), ডাক্তার বাট্ (Dr. Burt), ডাক্তার অ্যালেন (Dr. Allen),

এবং ডাক্তার জুসেটের (Dr. Jousset) মতে ডিপ্‌থিরিয়া রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী । তাঁহারা এই ঔষধ দ্বারা ডিপ্‌থিরিয়া আক্রান্ত অনেক রোগীকে আরাম করিয়াছেন । তাঁহারা বলেন যে রোগের প্রারম্ভে ডিপ্‌থিরিয়া হইয়াছে জানিতে পারিলে এই ঔষধ সেবনে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং ইহাতেই রোগ সারিয়া যায় । এই ঔষধের ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার্য্য ।

মার্কিউরিয়াম্‌ আয়োডেটাস্‌, - অয়োডাইড্‌ অব্‌ মার্ক্যারি, -
মার্ক্‌-আয়োড্‌

(MER. CURIUS IODATUS, - IODIDE OF MERCURY, - MERC. IOD.)

ইহাকে প্রটো-অয়োডাইড্‌ অব্‌ মার্ক্যারিও বলে । কোন এক বিদগ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত অয়োডাইড্‌ অব্‌ মার্ক্যারি ক্রয় করিয়া বথানিরমে সুগার অব্‌ মিকে মিশাইয়া ইহার মিশ্র গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথাব উপরিভাগ বা ডাইন পাশ্বে বেদনা ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথায় ঘুশ্‌ঘুশ্‌ বেদনা ; কপালে ঘুশ্‌ঘুশ্‌ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাকের গোড়ায় বেদনা (ক্যালো-বাই, নেট্রাম্‌-আর্স্‌) ; মাথার হাড়ে চুলকানি (গ্রাক্‌, নাইট্রিক্‌-আর্স্‌, সাগ্‌ফ্‌) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের হাড় কন্‌কনানি এবং টাটানি ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণের লেপ-যুক্ত ; ওষ্ঠ এবং উহার ধার লালবর্ণ ; জিহ্বার নিম্নভাগ পুরু, কালচে হরি-দ্রাবর্ণের লেপযুক্ত (চিনিলাম্‌-সাগ্‌ফ্‌), বাহ্য প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই অধিক হয় । গলার মধ্যে চট্‌চট্‌য়া আঠা স্লেম্মার সঞ্চার ; গলার ক্ষেতুর দিলে কাঠবর্মীর উদ্রেক হয় ; গলার মধ্যে জালা (আর্স্‌, ক্যাপ্স্‌, ক্যাঙ্ক্‌, মার্ক্‌-কর) ; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ এবং জ্বাহার বহা গলনালীর উপরিভাগ

লালবর্ণ এবং প্রদাহযুক্ত ; টনসিল্ (Tonsils) ক্ষীত ; ডাইন্ টনসিল্ ই অধিক ক্ষীত হয় ; গিলিবার সময় গলার মধ্যে বেদনা ; গলার মধ্যে ডেলার স্থায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অস্বভূত হয় (বেল্) ; আহার বহা গলনালীর উপরিভাগের পশ্চাৎ ভাগের স্থানে স্থানে স্লেয়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ পড়ে, বাহা ক্ষতের স্থায় দেখায় ।

মল । মল পুটির স্থায় কঠিন এবং অতি কষ্টে নির্গত হয় ; মল তরল, ফিকা কটাবর্ণ, ফেণাযুক্ত ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষাঙ্গের মাথায় কঠিন আকারের গরমীর ঘা (ইহা ব্যবহারে একবারে সারিয়া যায় এবং পরবর্তী অস্বথ বা লক্ষণাদি প্রকাশ পাইতে পারে না) ; পুরুষাঙ্গে বেদনাহীন গরমীর ঘা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কুঁচ্কির গ্রন্থির ক্ষীতি (বাগী) বাহা পাকে না । স্ত্রীলোকের হৃদ্রাবণের খেত প্রদর, বিশেষতঃ শিশু বা ছোট বালিকাগণের ।

ব্যবহার । গ্রন্থির অস্বথ ; গণ্ডমালা জনিত অস্বথ ; গরমীর পর-বর্তী পীড়া বা গোগ উপদংশ (Secondary Syphilis) ; ডিপ থিরিয়ার স্থায় অস্বথ, প্রধানতঃ ডিপ থিরিয়ার লক্ষণাক্রান্ত গলার মধ্যে বেদনা, টাটানি বা ক্ষত ; গলার মধ্যে গ্রন্থির অস্বথ সম্বলিত অস্বথে মার্কিউরিয়াম্ আয়োডাইড্ ব্যবহার্য্য । ডাক্তার কুপারের (Dr. Cooper) মতে টনসিলের পুরাতন আকারের প্রদাহে (Chronic Tonsillitis), প্রদাহের ভাব এবং ক্ষত বর্তমানে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী । ডাক্তার ব্লেকলী (Dr. Blakely) যিনি এই ঔষধ সূস্থ শরীরে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, গলার মধ্যে বেক্রপ অস্বথে রোগীর জিহবার তলা উজ্জল দরিদ্রাবণের লেপযুক্ত এবং উহার উপরি ভাগ পরিষ্কার, সেপ্রকার গলার মধ্যে অস্বথে তাঁহার মতে ইহা বিশেষ উপকারী ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । মুচ্ছার ভাব ; সর্বদা শয়ন করিয়া থাকার ইচ্ছা (নাক্স-মক্) ; সমুদয় শরীরের কষ্টদায়ক চুলকানি ; রাত্রিতে, বিশেষতঃ বিছানায় শয়ন করিলে, বাহার বৃদ্ধি হয় ; গ্রন্থির ক্ষীতি এবং কঠিনতা (মাক্) ; পিত্তা, মাতার গরমীর ব্যারাম জনিত দোষে শিশুগণের মুখ মণ্ডলে ফস্কুড়ী ; পক্ষ্যার সময়, রাত্রিতে, অস্ত্রে নাড়িলে, বিশ্রামে, অস্বথের

বৃদ্ধি এবং দিনের বেলা, বহির্বিদ্যুতে, প্রবল নড়া চড়াতে, অল্পখের উপশম ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । বেণাজোলা, ক্যালী বাইক্রমিকাম্, ল্যাক্স-সিস্, মার্কিউরিয়াম্, নাইট্রিক্ অসিড্, মাল্ফার ।

ডাইলুশন বিচার । গরমীর ব্যারাম এবং গলার মধ্যের অল্পখে ১ম হইতে ৩ষ্ঠ দশমিক ক্রমের ড্রুডা, ১ বা ২ গ্রোইণ মাত্রায়, ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন । আবার কোন কোন চিকিৎসকের মতে ইহার ৬, ১২ এবং ৩০ ক্রমের আরোক ব্যবহার্য ।

নেজা ট্রিপুডিয়ান্স,-নেজা

(Naja Tripudians,-Naja.)

এই প্রকার স্বর্পবিষ-ঔষধ ক্রোটেলাস্ হরিডাসের ভ্রায় প্রস্তুত হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । অস্ত্রাত্ত প্রকারের স্বর্প বিষের ভ্রায় ইহা মস্তিষ্ক এবং কসেফকা মর্জ্জা সম্বন্ধীয় দ্বায়ু এবং তদ্রূপ নিউমোগ্যাস্ট্রিক্ এবং প্লগো-কারিজিয়াল্ দ্বায়ুই (Pneumogastric and Glosso-pharyngeal Nerves) অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে । অতএব ঝাঁস কষ্টে, জ্বংপ্রদেশে কষ্টবোধ এবং রক্ত পচন ও তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শরীরের স্থানে স্থানে লোমচ্ছা যাওয়ার ভ্রায় হয়, রক্তস্রাব এবং স্বর্প বিষ দ্বারা বিষাক্ত হওয়ার ভ্রায় অস্ত্রাত্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । আত্ম হত্যার প্রবল ইচ্ছা বা উন্নততা (অরাম্, নাজ্-বম্) ; মন নানা বিষয়ে ধাবিত হয় ; বিনম্র ভাব এবং সমুদয় বিষয়ে গভীর চিন্তা ; অস্থির মতি ; স্তব্ধভাব ; কাল্পনিক অনিষ্ট এবং জ্বংটনা ঘটবে ভাবিয়া অস্থিরতা (নাজ্-বম্, ইগনেস্) ; সকল বিষয় ভুলিয়া যাওয়া ; অশ্রমনকতা (আনাকার্ড, এপিস্, কার্লস্, নাজ্-বক্, ফস্-আস্) ; স্পর্শজ্ঞান রহিততা ; চেতনানশ্রুতা ।

মস্তক । মাথায় গোলমেলে বোধ ; কপালে বৃণ্ডুশ্রে বোধনা ;

কপালের পার্শ্বে দণ্ডপানি এবং কনকনানি ; মাথায় উচ্চাভূত এবং উহাতে রক্তাধিকা বা রক্তাবরোধ ।

চক্ষু । চক্ষু স্থির এবং একদৃষ্টে তাকানোর ভাৱ বিশিষ্ট (বেল্, ট্রায়ম্) ; চক্ষু বিস্তৃত রূপে খোলা এবং উহাতে আলোকজ্ঞান রহিততা (ওপিয়াম্, হায়োস্, ট্রায়ম্) ; চক্ষুর পাতায় ভারি বোধ (কোনায়াম্, জেল্‌স্, নেট্রায়-কার্ক) ; দৃষ্টিরোধ ।

নাসিকা । প্রবল সর্দি এবং নাক দিয়া উগ্র, জ্বালা উৎপাদক ভরল স্লেমা নির্গমন ; নাক উষ্ণ, ক্ষীত এবং উহাতে জ্বালা বা টাটানি ।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডল ফিকা, দীর্ণ এবং কণ্ঠ, সব্জের আভাযুক্ত হরিদ্রা বা নীলবর্ণ ; মুখ মণ্ডলে স্বাদ শূলের ভাৱ বেদনা, যাহা কখন কখন চক্ষু এবং কপালের পার্শ্বেও সরিয়া যায় ; ওষ্ঠ শুষ্ক, উষ্ণ এবং ফাটা-যুক্ত (আর্স্, ল্যাক্), উষ্ণ এবং জ্বালা বা টাটানিযুক্ত ; দৃঢ় ভাবে দাঁত লাগা (সিকুটা, ইগ্নেস্, হায়োস্, লরোস্, নাক্স-বম্) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখ বিস্তৃত রূপে খোলা ; জিহ্বা কীতল (ক্যাম্ফার) ; দাঁতের গোড়ায় চর্কনবৎ বেদনা ; মাড়ি উষ্ণ, ক্ষীত এবং স্পর্শনে বেদনাযুক্ত ; জিহ্বা গাঢ় হরিদ্রার লেপযুক্ত ; জিহ্বা সাদা লেপ-যুক্ত, শুষ্ক, কিন্তু পিগাসা থাকে না (নাক্স-মক্) ; জিহ্বার তলার ঘোষক সন্ধি বিন্নীতে (Frenum) কত ; মুখগহ্বর অভ্যন্ত শুষ্ক (আর্স্, ব্রাই, নাক্স-মক্) ; মুখে কেণা উঠা (সিকুটা, ককিউলাস্, কুপ্রাম্, লরোস্) ; মুখে স্বাদ শূন্যতা বা মুখে তিক্ত, টক বা তামাদি ধাতুর স্বাদ (ককিউল্, ইক্সলাস্, মার্ক্) ; বাকরোধ (ডোল্‌ক্, জেল্‌স্, কষ্ট্, হায়োস্, লরোস্) । গলার মধ্যে অধিক পরিমাণে স্লেমার সঞ্চয় ; গলার মধ্যে চাপাবোধ এবং তদ্রূপ কঠিনতা ; গলার চাঁচিয়া ফেলার ভাৱ বা খশ্‌খশে বোধ ; ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়ার দৰ্শন রোগী গলা চাপিয়া ধরে (একন, আরোড্) ; গলার মধ্য এবং মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগে শুষ্ক এবং জ্বালা বোধ ; গলার মধ্যের বায়ুপার্শ্বে টাটানি এবং কুট্‌কুটানি ; আহার বহা গলনালীর সঙ্কোচন ; কোন প্রত্য শিলা কষ্টকর বা একবারে অসম্ভব ; মুখগহ্বরের পশ্চাৎ ভাগ কাল্পে লাল-বর্ণ (এইলাই-ব্যান্ট্, ফাইটোণ্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । কচি শূন্যতা ; বেসকল উত্তেজক দ্রব্যে রোগের বৃদ্ধি হয়, পেসকল দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা ; উদগাব উঠা ; বুক জালা ; বমনোদেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুচ্ছার ভাব ; বমন ; অজীর্ণ হইলে বেক্রপ হয়, পাকস্থলীতে সেক্রপ অস্থখ বোধ ; একখানি পাণর চাপাইয়া রাখিলে যেক্রপ হয়, আহাষের পর পাকস্থলীতে সেক্রপ চাপা বোধ (আস্, ব্রাই, নাস্-বন্, পাল্‌স্) । উদরে কর্ভনবৎ, মোচ্‌ডাইয়া ধরার স্থায় বেদনা বা পেট কামড়ানী ; উদরে প্রচুর দূষিত বায়ু সঞ্চাব এবং উহাতে গড়্‌ গড়্‌, কল্কল্‌ শব্দ হওয়া ও শূল বেদনার স্থায় বেদনা ।

মল । হঠাৎ বাহ্যের বেগ ; পিত্তযুক্ত উদরাময় ; কোষ্ঠবদ্ধ ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাধারে অস্থখ এবং চাপাবোধ ; মূত্রে লাল তলানি পড়ে এবং উক্ত তলানিতে শ্বেয়া মিশ্রিত থাকে ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের জা সহবাসেব অতিরিক্ত ইচ্ছা ; স্রাবিতে স্বপ্নে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক ধাতু নিঃসরণ । জ্রীলোকের বাম ডিম্ব-কোষে থিগ ধরাব স্থায় বেদনা ; পাতলা সাদাটিয়া শ্বেত প্রদর নিঃসরণ ; স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারেব হ্রাস ।

শ্বাসযন্ত্র । কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ভনালীতে পূর্ণ এবং আঁটা বোধ ; কর্ভনালী এবং বায়ুনলে জালা, উত্তেজনা এবং স্ফুস্ফুড়ী ; স্বরভঙ্গ ; অন্নকাল স্থায়ী স্বরভঙ্গ সম্বলিত কাশি ; শুক খুশুশে কাশি ; রক্তোৎকাশ (একন্, হামাগেলিস্) ; নিশ্বাস প্রশ্বাস মৃত, ভাসান এবং প্রায় অস্বভূত হয় না ; শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর ; নিশ্বাস প্রশ্বাসের অন্ত অত্যন্ত প্রেরাস পাওয়া (খাপি খাওয়া) ; বুক অস্থখ এবং বেদনা বোধ ; বৃকে ছুরি দিয়া কাটার স্থায় বাতনা, দীর্ঘ নিশ্বাসে বাহার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই) ; বৃকে হাঁপানি কাশির স্থায় আঁটাবোধ এবং তৎপর গলাদিয়া প্রুর শ্বেয়া নির্গমন ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে অবসন্ন এবং অস্থখ বোধ ; হৃৎপ্রদেশে প্রবল বেদনা ; হৃৎস্পন্দন বা উহার ধড়্‌ড়ানী ; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শব্দ দূর হইতে শুনা যায় (স্পাইজেল) ; নাড়ীর স্পন্দন এবং গতি উভয়ই অনিয়মিত (ডিজিট্) ; নাড়ী হ্রস্ব এবং স্রবৎ স্রব্ধ, লুপ্ত গায় (একন্, আস্) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশে বাতের বেদনা ; হৃদয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা ; কোমরে কনকনানি ; কোমরের পশ্চাৎ দেশে প্রথর বেদনা ; কোমরের পশ্চাৎ দেশে চর্কনবৎ বেদনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হঠাৎ বলক্ষয় ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের ভ্রায় বেদনা ।

চর্ম্ম । চর্মে কোন প্রাণী হামা দিয়া যাওয়ার ভ্রায় অহুভূত হয় ; চুলকানি এবং টন্টনানি ; চর্ম্ম ক্ষীত, কোঁচকান এবং কাল্চে বেঙবী, নীলবর্ণ ; কোন এক প্রদাহযুক্ত ক্ষীত স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণের ভ্রায় ফুসুড়ী ; ক্ষীত এবং প্রদাহযুক্ত স্থানে ফোকার ভ্রায় সাদা ফুসুড়ী এবং উহাতে অত্যন্ত চুলকানি ; অক্রান্ত স্থানের ক্ষতে সপুষ্প পচা লাগা (Gangrene) ।

নিদ্রা । হাঁইতোলা ; অত্যন্ত নিদ্রাবেশ ; অস্থির বা ভগ্ন নিদ্রা ; ঘুমেরঘোরে স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা ।

জ্বর । শরীর শীতল এবং অবশ বা পতনাবস্থা প্রাপ্ত (Collapsed) (কার্কী-বেজ্, কাম্ফার) ; হাত পা বরফের ভ্রায় ঠাণ্ডা (টেবেকাস) ; মুখ-মণ্ডলে আগুনের ভ্রায় জ্বালালুভব ; রোগী অত্যন্ত অস্থির, গরম এবং অরতাব অহুভব করে ; প্রচুর ঘর্ম্ম ।

ব্যবহার । যে সকল অবস্থায় ল্যাকেসিস্ ব্যবহার্য্য, সে সকল অবস্থায় নেজাও ব্যবহার্য্য । কিন্তু ল্যাকেসিসের ভ্রায় নেজা অধিক ব্যবহৃত হয় না । হাঁপানি কাশি ; আক্ষিপিক ফুড়ী কাশি ; কামল রোগ ; হৃৎপ্রায়-শূল বা হৃৎবেদনা ; হৃৎপ্রায়বদক বিল্লীপ্রদাহ ; বাত জনিত হৃৎপ্রদাহ ; নায়ু শূল ; হৃৎপিণ্ডের বাস্ত্রিক অস্থখ ; সত্তাপিত, উত্তেজক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের অস্থখ ; ডিপথিরিয়া ; ক্ষত বা ঘা ; হাঁপানির লক্ষণাক্রান্ত সন্ধি ; জ্বালাতন ; মুখাদিতে ঘা ; সপুষ্প পচায়ুক্ত ঘা (Gangrene) ইত্যাদি অস্থখে নেজা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । গা মাটি মাটি করা ; ক্রান্তিবোধ ; জড়তা ; শারীরিক এবং মানসিক শক্তির অবসন্নতা ; কোন প্রকারের উত্তেজক দ্রব্যে অস্থখের বৃদ্ধি ; বহির্কায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে অস্থখের উপশম ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । এপিস্, আসিনিকাস্, ক্যাক্টাস্, ক্লোটন, হিণার সাল্ফিউরিস্, ল্যাকেসিস্, মার্কিউরিয়াস্, নাইট্রিক্ আসিড্, ফফরাস্, রাস্ টম্, সাল্কার, স্পাইজেলিয়া ।

প্রতিষেধক ঔষধ । উত্তাপ ; হুয়া এবং ক্ষারগুণ বিশিষ্ট ঔষধ বা পদার্থ ।

ডাইলুশন বিচার । ল্যাকেসিসেব গ্রায়ুড, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য । ওলাউঠার পতনাবস্থায় এই ঔষধেব ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোকই সচ-রাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । লেখক এই ঔষধ অধিক ব্যবহার করেন নাই । অতএব ইহার মাত্রা সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না ।

জ্যাবোরাণ্ডি,-জ্যাবোর

(JABORANDI, -JABOR.)

এই গাছের পাতা বথা নিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণক্রিয়া । ইহা লাল এবং ঘর্ম্ নিঃসারক গ্রন্থি আক্রমণ করিয়া উহার উত্তেজনা এবং অতিরিক্ত নিঃসরণ উৎপাদন করে । ইহার প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি নিয়ে লিখিত হইতেছে ;—“ইহা সেবনের অনতিকাল বিলম্বেই মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয় ; টেম্পোরেল্ ধমনি (Temporal arteries) অধিক দপ্ দপ্ করে এবং তৎপর মুখগহ্বর ও মুখমণ্ডলে এক বিশেষ প্রকৃতির উষ্ণাহুত্ব হয় এবং তৎপর মুখদিয়া লাল পড়িতে আরম্ভ হয় । উহার কিয়ৎক্ষণ পর কপাল আর্দ্র হয় এবং মুখ মণ্ডল অধিকতর লাল বর্ণ হয় ও তৎপর কপাল, পাল এবং কপালের পার্শ্বে সারি সারি বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ প্রকাশ পায় । অধিক পরিমাণে লাল গড়াইতে থাকে এবং ক্রমে সকল লাল নিঃসারক গ্রন্থিরই লাল নিঃসরণে কার্য্য বৃদ্ধি হইতে থাকে ; মুখগহ্বর প্রচুর পরিমাণে তরল পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, যোগী অনবরত থুথু ফেলিতে থাকে, উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল এবং গ্রীবা দেশে প্রচুর

ঘর্ষ প্রকাশ পায় ও তৎপর সমুদয় শরীর লালবর্ণ এবং আর্দ্র হয় ও শরীরে একপ্রকারের সন্তুষ্টিজনক উষ্ণত্বত্ব হয়; কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যেই সমুদয় শরীরে ঘর্ষ হয় এবং উহা শরীরের সকলদিকে গড়াইয়া পড়ে। ইতি মধ্যে অজ্ঞাত লক্ষণ প্রকাশ পায়। চক্ষুর পাতা প্রথমতঃ আর্দ্র হয়, ক্রমে চক্ষুর জলের স্ফার বৃদ্ধি পায় এবং উহা চক্ষুর কোণে সঞ্চিত হইয়া গড়াইয়া গালে পড়ে ও উহার সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়াও জলবৎ স্লেথার স্রাব পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। এতদ্বিন্ন আহার বহা গল নালীর উপরিভাগ, বায়ুনল এবং বায়ুনলের প্রৈম্বিক স্নায়ু প্রস্থিগুলির নিঃসরণও পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই ঔষধ খাওয়ার পর ঠু ঘণ্টার মধ্যে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া ৩০। ৪০ মিনিট ব্যাপিয়া থাকে। একপাশে শয়ন করিলে পাছে লাল গড়াইয়া পড়ে সে ভয়ে রোগী প্রতি মিনিটে ১০। ১৫ বার থুথু ফেলিতে বাধ্য হয় এবং লালের এত শীঘ্র শীঘ্র স্ফার হয় যে, উহার দরুণ রোগী কথা বলিতে পারে না; লাল নিঃসারক প্রস্থিগুলি বৃদ্ধিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং মুখগহ্বর অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়। সমুদয় শরীর ঘর্ম্মাবৃত্ত হয়, গায় কাপড় থাকিলে উহা ভিজিয়া যায় এবং তৎপর রোগী আপনাকে আপনি কতক পরিমাণে স্নান, নতুবা দুর্বল মনে করে। পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; চক্ষুর তারা কতক পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়। ক্রমে লাল, ঘর্ম্মাদির স্ফারের পরিমাণ কমিতে থাকে এবং এক বা দেড় ঘণ্টার মধ্যে চক্ষের জল, নাসিকার স্লেথ, বায়ুনল দিয়া স্লেথ নিঃসরণ এবং অবশেষে লাল এবং ঘর্ম্মের পরিমাণ স্পষ্টতঃ কমিয়া যায় ও শরীরের আক্রান্ত অংশগুলি উহার স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ঘর্ম্ম এবং লাল নিঃসরণ কমিয়া গেলে, রোগী নিস্তেজ ভাবে নিদ্রিতের স্রাব পড়িয়া থাকে। যে সকল অংশে উক্ত নিঃসরণের স্ফার হয়, সে সকল স্থান, বিশেষতঃ মুখ গহ্বর এবং আহার বহা গলনালীর উপরি ভাগ, অত্যন্ত শুষ্ক হয়। এই সময় পিপাসাও অত্যন্তও বৃদ্ধি পায়। রক্ত স্ফালন ক্রিয়ার চাক্ষু্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু উহার দরুণ ধমনিতে রক্তের চাপের বৃদ্ধি হয় না এবং শরীরের বস্তুপও অনেক কমিয়া যায়।

ব্যবহার। কোন প্রকার তরুণ রোগের ভোগ বা উহার আরম্ভ

হওয়ার সময় অথবা বক্ষাকাশির জ্বায় পুরাতন আকারের ঝোণের, ভোগ
সময়ে অতিরিক্ত বর্ষ্য; মুখ দিয়া প্রচুর বা অতিরিক্ত পরিমাণে লাল পড়া;
দূরবর্তী বস্তু দেখিতে অশক্তি (Myopia); ফুফুস এবং উহার আবরক
ঝিল্লীতে শোথের জ্বায় দূষিত জলীয় পদার্থের সঞ্চার; হৃৎপিণ্ডের অস্বা-
ভাবিত শোথ; মূত্রবস্তুর অস্বাভাবিত শোথ; মূত্রে শর্করা ব্যতীত বহুমূত্র
(Diabetes Insipidus); চুলকানি ইত্যাদি অস্বাভাবিক জ্বাবোরাণ্ডি ব্যবহার্য্য ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আমিল্‌নাইট্রেট্‌, ফাইসিট্রিংগা, মাফে-
রিয়াস্‌, আট্রোপিয়া ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রমের আরোক ব্যবহার্য্য ।

নেট্রাম্‌ সাল্‌ফিউরিকাম্‌,-নেট্রাম্‌,-সাল্‌ফ্‌

(NATRUM SULPHURICUM,-NATR.-SULPH.)

কোন এক বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত সোডিক্‌
সাল্‌ফেট্‌ (Sodic Sulphate) ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে চুয়ান জলে মিশা-
ইয়া ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয় । ইহার ১ম শততমিক
বা ২য় দশমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে ডাইলুট্‌ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়;
৩য় দশমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে ২০° ডিগ্রী ওবার ফ্রক্‌ স্পিরিটে
প্রস্তুত হয় এবং তৎপর সমুদয় ক্রমের আরোকই যথা নিয়মে রেক্‌টিকাইড্‌
স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । সুস্থ শরীরে যে এই ঔষধ কিরূপে কার্য্য করে
সে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু বুঝিতে পারি না । রক্তের উপর ইহার
প্রবল কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুন ইহা শরীরের সমুদয় অংশ,
প্রধানতঃ স্নায়িক ঝিল্লী এবং শরীরের আর্শাল অংশ স্নেহা জনিত এবং
বাতের প্রদাহ দ্বারা অক্রান্ত হয় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মনের অবসন্নতা; সর্ব্বদা কঁাদ কঁাদ ভাব; বাণেয় রোগীকে

(জীলোক্) অত্যন্ত হুংখিত করে (নেট্রাম্-কার্ক্, সাবাইন) ; অত্যন্ত চিড়্, চিড়্, থিট্ থিট্ করা, প্রাতঃকালে বাহা অধিক হয় ।

মস্তক । মাথাঘোরা ; মাথায় গোলমেলে এবং চিমাঝে ; কপালে চাপাবোধ, আহারের পর বাহা অধিক অনুভূত হয় এবং বাহার দ্রবণ মনে হয় যেন কপাল ফাটিয়া যাইবে (ব্রাই) ; মাথায় ভারিবোধ ; কপাল এবং কপালের বাম পার্শ্বে ছিদ্র করার ভ্রায় বেদনা ; মাথা আক্রান্ত হইয়া মস্তকের উত্তেজনা ।

চক্ষু । চক্ষে বাপ্পা দেখা ; দৃষ্টির দুর্বলতা এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া ; চক্ষে আলোক সহ্য হয় না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরা ; ডাইন চক্ষে আগা ; চক্ষু দিয়া জল পড়া ; দৃষ্টিহীনতা, বাহা আঙণের নিকট অধিক হয় ; চক্ষুর পাতায় প্রাস্ত জালা করে ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে আলোক সহ্য হয় না (ক্যাক্-কার্ক্, গ্রাফ্, সাল্‌ফ্) ; প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতায় প্রাস্ত চুলকায় ।

কর্ণ । কানে ঘণ্টার ভ্রায় টন্টন্ শব্দ হয় ; ডাইন কানের মধ্যে ছুরি ইত্যাদি বিধানের ভ্রায় বেদনা বা যাতনা ; কানের মধ্যে স্থতীবিধানের ভ্রায় হঠাৎ বেদনা, ঠাণ্ডা বাতাস হইতে উষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; আর্দ্র বাতাসে এবং শেত শেথিয়া বা ভিজা মাটিতে শয়ন করিলে অস্বথের বৃদ্ধি ।

নাসিকা । জীলোকের রজঃস্রাবের সময় নাক দিয়া রক্ত পড়া (ব্রাই, হামামেলিস্), বাহা কখন কখন থামিয়া পুনরায় আরম্ভ হয় ; নাক বন্ধ হইয়া যায় ; হাঁচি দেওয়া এবং নাক দি প্রচুর পরিমাণে জলবন্তরল স্লেয়া নির্গমন ; গরমীর ব্যারাম জনিত নাকে পূর্ণ সম্মলিত ঘা, মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে ঘা হইয়া বাহার আরম্ভ হয়, কিন্তু ঘার গন্ধ থাকে না (পুঁয়ে গন্ধ থাকিলে অরাম্ ব্যবহা) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল ফিকা বা শিটা এবং হবিদ্রাবর্ণ বা পাক্-সিয়া, কানের নিকটবর্তী গালের হাড়ে ছিঁড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা ।

মুখগহ্বরের এবং গলার মধ্য । জিহ্বার অগ্রভাগে কোষ্ঠার ভ্রায়

কুসুড়ী এবং উহাতে জালাবুল্ল যাতনা ; গোলমরিচ খাইলে যেক্রপ হৃৎ-মুখের মধ্যে সেক্রপ জালা ; মুখগহ্বর শুষ্ক ; পিপাসা ; মাড়ি লাগবর্ণ ; তালুকাতে কোকা পড়া, যাহা অত্যন্ত টাটার এবং যাহার স্বরূপ খাইতে কষ্ট অনুভূত হয় ; ঠাণ্ডা দ্রব্য খাইলে যাতনার উপশম হয় ; আহারের পর মুখে অধিক পরিমাণে লাল উঠে । গলার মধ্যে শুষ্কবোধ ; পিপাসা থাকে না (নাস্ত-বক, পাল্‌স্) ; টন্সিল্ এবং আল্‌জিন্ প্রদাহযুক্ত এবং ক্ষীত ; টন্সিলে বা ।

পাকস্থলী এবং উদর । সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত পিপাসা এবং বরফ বা বরফ মিশ্রিত ঠাণ্ডা জল পানের ইচ্ছা ; আহারের পূর্বে গা বমী বমী করা ; মুখে অনবরত টক জল উঠা । বহির্কায়ুতে চলিয়া বেড়াইবার সময় যকৃত প্রদেশে সূচীবিধানের জ্বাৰ যাতনা ; স্পর্শনে, চর্নিতে, দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহে অথবা হঠাৎ বাকি লাগিলে যকৃত প্রদেশ অত্যন্ত বেদনাবৃত্ত হয় বা টাটার ; প্রাতঃকালে আহারের পূর্বে নাভির চতুর্দিকে ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা এবং উহাৰ সঙ্গে সঙ্গে উদরে দ্বিতি বায়ুর সঞ্চার ও বায়্বার পেট গুলিয়া উঠা এবং উহাতে গড়্‌গড়্‌কলকল শব্দ হওয়া ; উদরে, প্রধানতঃ ডাইন পার্শ্বে, দ্বিতি বায়ু ক্রম হইয়া থাকা এবং তদ্বন্ধন অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হওয়া, শুষ্ক ঘাৱ দিয়া দ্বিতি বায়ু নিঃসরণের পর যাহার উপশম হয় (আলোজ্‌, লাইকোপ্) ; ডাইন কুঁচ্কির প্রদাহ ; অন্ত্রের সিকাম্ (Cæcum) নামক অংশের প্রদাহ (Typhlitis) ; উদরের ডাইন পার্শ্বের মাংসবিশিষ্ট অংশে ছুরি বিধানের জ্বাৰ যাতনা এবং উহাৱ সঙ্গে সঙ্গে বমনোদগেগ ।

মল । উদরাময়, আত্ম বাতাদিতে যাহার বৃদ্ধি হয় ; প্রাতঃকালে উদরাময় ; শাক সব্জী বা তৈলাক্ত বা চর্কিবুল্ল দ্রব্য খাইয়া উদরাময় ; সন্ধ্যা কালের ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া উদরাময় ; মল কঠিন গুট্‌লে এবং উহাৱ সঙ্গে রক্তের ছিট থাকে ও মলত্যাগ করার পূর্বে গুল্মধারে জালা এবং চিড়িক্‌ মারা ; স্বল্প রজঃস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় উক্ত প্রকারের মল-ত্যাগ ; শুষ্ক ঘাৱ দিয়া প্রচুর পরিমাণে দ্বিতি বায়ু নিঃসরণ ; শুষ্ক ঘাৱে ও উক্কর মধ্যবর্তী স্থানে আঁচিলের জ্বাৰ কুসুড়ী ; সাইকোদিস্ (Sycosis) ।

মূত্রবস্ত্র । মূত্রপরিমাণে অল্প ; মূত্রত্যাগের সময় মূত্রনালাতে আগামুভব ।

জননেন্দ্রিয় । সন্ধার সময় পুরুষের স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা ; প্রাতঃকালেও স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গ খাড়া হওয়া ; পুরুষাঙ্গ ইত্যাদি জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি ; প্রমেহরোগ ; সাইকোসিস্ (Sycosis) । স্ত্রীলোকের মূত্র রজঃস্রাব ; গোণে রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুটলে মলত্যাগ ; রজঃস্রাবের পূর্বে নাকদিয়া রক্ত পড়া ।

শ্বাসযন্ত্র । চলিয়া বেড়ানের সময় শ্বাসকষ্ট, বিশ্রামে ক্রমে ক্রমে যাহার উপশম হয় ; বায়ু উপনলেব শ্লেষ্মার দরুণ যুবা পুরুষ এবং যুবতী স্ত্রীলোকের হাঁপানি কাশি, শুষ্ক বায়ু আর্দ্র বায়ুতে পরিবর্তিত হইলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; বারম্বার কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলাদিয়া কতক পরিমাণ শ্লেষ্মা নির্গমন ; দাঁড়াইয়া থাকা অবস্থায় কাশিলে বুকের বাম পার্শ্বে স্থচীবিধানের জ্বাৰ যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট ; একটী ভারি বোঝা চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, বুকে সেরূপ চাপাবোধ ; বুকের পার্শ্বে, কোমর প্রদেশের নিকটবর্তী স্থানে, চাপাবোধ, নড়াচড়া এবং প্রচাপনে যাহার বৃদ্ধি হয় ; বুকের বাম পার্শ্বে স্থচীবিধানের জ্বাৰ যাতনা ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । মেরুদণ্ডের উপরি এবং নিম্নভাগে ও গ্রীবাদেশে টাটানি ; কোমরের পশ্চাৎদেশে খেঁতলিয়া যাওয়া বা ঘোড়াইয়া পড়ার জ্বাৰ বেদনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সন্ধিতে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা । বাহু এবং হাতে টন্‌টন্‌ করা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন উহা পক্ষাঘাত হইয়াছে ; নখকোণী (Onychia), ঘরের বাহিরে যাহার যাতনার বৃদ্ধি হয় ; শেত্‌শেতিয়া স্থানে, আর্দ্র প্রাচীর বিশিষ্ট ঘরে বাসের দরুণ রোগী শিটা, ফিকা বা রুগ্ন হয় । ডাইন উরু বা কুঁচ্কির সন্ধিতে বেদনা, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, বসে অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে, অথবা পিছানায় নড়িলে এবং চলিলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; চলিয়া বেড়ানের সময় বাম ঝুঁকি বা উরুর সন্ধিতে হঠাৎ স্থচীবিধানের জ্বাৰ অসহ্য যাতনা, যাহার দরুণ রোগী চলিয়া বেড়াইতে পারে না ।

জ্বর । সন্ধ্যার সময় শীতকম্প ; আত্যন্তিক শীতবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা ভাঙ্গা ও হাঁটতোলা ; সন্ধ্যা হওয়া হওয়া সময়ে শরীরে হঠাৎ বা দমকা উকানুভব ।

চর্ম । গায় বিকচ (Eczema), বাহা হইতে প্রচুর কল্কানি নির্গত হয় ; গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলার সময় চুলকানি ; সমুদয় শরীরে অঁচিলের ন্যায় লাল ডেলা ডেলা ফুসুড়ী ।

ব্যবহার । সাইকোসিস (Sycosis) ; রক্তের ষেতকণার বৃদ্ধি জনিত অম্লধ (Leukœmia) ; শ্বেয়া এবং বাতজনিত অম্লধ ; প্রমেহ ; হাঁপানি কাশি ; শর্শকরা বহুমূত্র (Diabetes Mellitis) ; বক্ষাকাশ ; পুরাতন আকারের উদরাময় ; উদরে দূষিত বায়ু বসকার, (Flatulenco) ; সায়েটিক স্নায়ু প্রদেশে বেদনা বা সায়েটিকা (Sciatica) ; প্রদাহজনিত শূলবেদনা, বাহা প্রায় সকল সময়ই ডাইন কুঁচকিতে আরম্ভ হয় ইত্যাদি অম্লধে নেট্রাম্ সাল্‌কিউরিকাম্ ব্যবস্থা ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ । বলক্ষয়, ক্লান্তি এবং শ্রান্তিবোধ, প্রধানতঃ হাঁটতে ; বেদনাদির হঠাৎ আক্রমণ ; উদরের মধ্য দিয়া আড়ো পার্শ্বে এবং পৃষ্ঠদেশে টাটানি ; ভিজা শেত্শেতিয়া স্থানে, উষ্ণ এবং শুষ্ক বায়ু আর্দ্র বায়ুতে পরিণত হইলে, অম্লধের বৃদ্ধি, এবং বহির্কীর্ন, মধ্যাহ্নে আহারের পর, নড়া চড়াতে ও রাত্রিতে অম্লধের বৃদ্ধি ; অল বৃষ্টি এবং শেত্শেতিয়া স্থান বা বায়ুতে অম্লধ হওয়ার ধাতু (Hydrogenoid Constitution) এবং সাইকোসিসের (Cycotic) ধাতু ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ডাল্‌কেমেরা, রাস্ টক্স, ষ্টাকিসেগ্রিয়া, পুলা ।

ডাইনুশন বিচার । ২য় হইতে ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার্য্য । ওষ্ঠের উপর কোকার দ্বারা লাগা ফুসুড়ীতে কোন একটা রোগীর চিকিৎসায় ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবস্থা করিয়া ১০ দিবসের মধ্যে লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন ।

নুফর লুটিয়াম্,-নুফর

(NUPHAR LUTEUM,-NUPH.)

এই গাছের সমুদয় অংশ যথানিয়মে ডাইলুট্ আল্ কোহলে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা অস্ত্রের নিম্নাংশ এবং জননেন্দ্রিয় আক্রমণ করিয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । কপাল এবং উহার দুই পাশে চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা, বহির্বিষ্মতে বাহার বৃদ্ধি হয় ; কপালের বাম উন্নত স্থানের পশ্চাৎ-ভাগে ছুরিবিধানের ভ্রায় গভীর, ঘৃণ্ণুশ্বে বেদনা ; চলিবার সময় প্রত্যেক ধাপেই মস্তিকে যেন থেঁতলিয়া যাওয়া, মোচড়াইয়া পড়া বা ধাক্কা গালার ভ্রায় বেদনা অনুভূত হয় ।

চক্ষু । চক্ষুর কোটরের মধ্যে ভারিবোধ এবং ঘৃণ্ণুশ্বে বেদনা ; চক্ষুর সম্মুখে উজ্জল আলোকের কণার ভ্রায় অনুভূত হয়, কঠিন কাশির পর বাহার অধিক উদ্রেক হয় ।

মল । মল কোমল এবং নির্গত হওয়ার পূর্বে পেটে শূলবেদনার ভ্রায় বেদনা, প্রাতঃকালেই বাহা অধিক হয় ; প্রাতঃকালে হরিদ্রাবর্ণের উদরাময় ; মলত্যাগের পর শুষ্কদ্বারে জ্বালা এবং চিড়িক্‌মার (আন্, সাল্‌ক্) ; স্থলীবিধাইল বেক্রপ হয়, শুষ্ক মধ্যে সেক্রপ বাতনা ; প্রাতঃকালে বেদনাহীন উদরাময় (পডোফ) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রে ঐচ্ছিক লাল বালির ভ্রায় তলানি পড়ে (চারণা, নেট্রাম্ মিউব্, লাইকোপ্, ফস্), বাহা পাত্রেয় গায় দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকে ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের জীসহবাসের ইচ্ছা একবারেই থাকে না (আগ্নাশ্) ; জীসহবাস-বিষয়ে চিন্তা করিলেও পুরুষাঙ্গ খাড়া হয় না (আগারিকাশ্, আগ্নাস্, কোনায়াম্) ; পুরুষাঙ্গ শিথিল হয় বা কৌচ্কাইয়া যায় ; অণ্ডকোষাধার ঢল্‌ঢলে হয় ; উত্তর অণ্ডকোষে ছুরিবিধানের ভ্রায়

বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গের মাথায় বেদনা ; ধ্বজভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক ধাতু নিঃসরণ (আগারিকান্স, আগ্নাস্, কোনারাম্, কস্, কস্-আস্) ; যুমেবধোরে ধাতু নিঃসরণ (স্পন্নদোষ) ; মলত্যাগের সময় ধাতু নিঃসরণ ; প্রস্রাব করার সময় ধাতু নিঃসরণ ।

চন্দ্র । মাছিতে কামড়াইলে যেৰূপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ অল্পতৃত হয় ; গায় খোসের ভায় শুকনা ফুসুড়ী ।

ব্যবহার । প্রাতঃকালে উদরাময় ; অস্ত্র এবং পরশাস্ত্রের শৈথিল্য ক্রমীর প্রদাহ ; স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের কমতার অভাব বা ন্যূনতা ; ধ্বজভঙ্গ ; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক ধাতু নিঃসরণ বা স্পার্মেটোরিয়া (Spermatorrhœa) ইত্যাদি অস্থখে রুক্ষর লুটিয়াম্ ব্যবহার্য্য ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আগ্নাস্, ক্যাষ্টাস্, কমেজ্, আর্সিনিক্, ব্যারাইটা কার্ব্, কোনারাম্, পডোফিলাম্, সাল্ফার ।

ডাইলুশন বিচার । ডাক্তার হিউজের (Dr. Hughes) মতে ইহার ১ন হইতে ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহার্য্য । লেখক ইহার মাত্রা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।

ওরিগেনাম্ মার্জোরেনা,-ওরিগেন্

(ORIGANUM MARJORANA,-ORIG.)

এই গাছ কাঁচা অবস্থায় সংগ্রহ করিয়া ফ্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি । জননেত্রির, প্রধানতঃ স্ত্রীজননেত্রির উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল । স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা হইলে যেৰূপ হয়, সেরূপ মস্তিক এবং বায়ুমণ্ডলী ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং তদ্বৎ স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছার উদ্ভেদ হয় । অতিরিক্ত স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের ইচ্ছা, স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস

সঙ্গে চিন্তার উদ্রেক করা এবং যথ্য দেখান এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত । স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের ইচ্ছা, হস্তমৈথুন জনিত (প্রধানতঃ বালিকাগণের) উত্তেজনা হেতু স্বেতপ্রসর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ সহবাসের ইচ্ছার পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী । ইহার ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহার্য্য ।

স্যাবাডিলা,-স্যাবাড্

(SABADILLA,-SABAD.)

ইহার খোসা সমেত ব্রিচি যথানিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । যথানিয়মে জ্বার অব্ মিকে মিশাইয়া ইহার মিশ্র গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মর্জ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ু মণ্ডলী দিয়া ইহা শরীরের পরিপোষণের সহায়কারী যন্ত্রণাদি আক্রমণ করিয়া থাকে । শৈল্পিক বিল্লীর উপরিভাগই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মনের অত্যন্ত অশান্তি এবং চিন্তা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের অত্যন্ত আন্দোলন ; সহজেই ভয় থাকিয়া ; ব্যারাম না থাকিলেও মনে হয় ব্যারাম হইয়াছে ।

মস্তক । কপাল এবং উহার দুই পার্শ্বে অবসন্নকারক বেদনা, যাহার দরুণ রোগী চলিবার সময় হেলিয়া টলিয়া পড়িবার উপক্রম হয় ; মাথার ভাঙ্গি এবং চিমাবোধ ; মাথাধরা, প্রত্যেকবার চলিয়া বেড়ানের পর বাহা সচরাচর অধিক অশুভ হয় ; অনেক চিন্তা করা বা কোন বিষয়ে অত্যন্ত মনযোগের সহিত চিন্তা করার দরুণ মাথা ধরা ; মাথার উপরিভাগ যেন জ্বলিয়া থাকে হয় ।

চক্ষু । শরীরের কোন অংশে সামান্য চোট লাগিলেই চক্ষু দিয়া জল পড়ে; বহির্জায়তে শারীরিক পরিশ্রম করিলে চক্ষু দিয়া জল পড়া; চক্ষুর পাতার প্রান্ত লালবর্ণ ।

কর্ণ । কানের মধ্যে স্ফুট্‌স্ফুট্‌ ।

নাসিকা । নাকের মধ্যে চুলকানি এবং টন্‌ টন্‌ করা ; নাক দিয়া রক্ত পড়া ; আক্ষেপিক হাঁচি ; হাঁপানির লক্ষণাজ্ঞান সর্দি ; সর্দি ও তদ্রূপ নাকদ্বারা প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল স্লেমা নির্গমন ; একটী না একটী নাসারন্ধ্র প্রায়ই বন্ধ হইয়া থাকে ; নাক দিয়া নিখাস টানা অত্যন্ত কষ্ট-কর ; নাক ডাকা বা নাকে গৌঁ গৌঁ শব্দ হওয়া ।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডল উষ্ণ এবং আশ্রয়ের ছায়া লালবর্ণ (ফেরাম); বামদিকের উপরের মাড়ির পেশীতে দণ্ডপানি এবং লাফানি ; মদ্যপানের পর যেরূপ হয়, মুখমণ্ডল সেক্রপ উষ্ণবোধ ; মুখমণ্ডল এবং চক্ষু লালবর্ণ ; হাঁপানি এবং অরের লক্ষণ সম্বলিত সর্দি ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । কপের দাঁতের গোড়ার খোঁচা বিধার ছায়া বাতনা ; জিহ্বার অগ্রভাগে জালা ; মুখে তিক্তবাদ (ব্রাই, নাস্ক-বন্‌, পাল্‌স্‌) । গলার মধ্যে শুষ্কবোধ ; গলার মধ্যে ডেলার ছায়া কোন পদার্থ লাগিয়া বহিয়াছে এরূপ অনুভূত হওয়ার দরুন রোগী বারম্বার চোক গিলিতে বাধ্য হয় ; খশ্‌খশে এবং চাঁচিয়া কেলিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেক্রপ অনুভূত হওয়ার দরুন বারম্বার চোক গিলার ইচ্ছা ; কোন এক বহুব্যাপক গলার মধ্যে বেদনাপ (Epidemic Sore-throat) সময় সকলেরই বেদনাদি বান দিক হইতে আরম্ভ হইয়া ডাইন দিকে বিস্তৃত হয় (ল্যাক্‌) ।

পাকস্থলী এবং উদর । মিষ্ট দ্রব্য, মধু, পিষ্টক, লুচি, কচুরি ইত্যাদি খাওয়ার অত্যন্ত স্পৃহা ; মাংসে অরুচি ; বমনোদ্বিগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনের ইচ্ছা ; ক্রমি বমন ; পাকস্থলী এবং আহার বহা গল-নালীতে ক্ষত কারক জালাভূতব । ক্রমি থাকিলে যেরূপ হয়, উপরে সেক্রপ বেদনা ; ছুরি দিয়া কাটিলে যেরূপ হয়, অস্ত্রের মধ্যে সেক্রপ কর্ত্তনবৎ বেদনা ; উদরে জালা (আস্‌) ; খালিপেটে যেরূপ হয়, উদরে সেক্রপ গড়্‌ গড়্‌, কলকল শব্দ হওয়া (লাইকোপ্‌) ।

মূল এবং মলদ্বার। শুষ্ক এবং শুষ্কদ্বারে হামা দেওয়ার ভায়
হুড্‌হু; হুড্‌হু কুমি; উদরাময়; মল কটাবর্ণ এবং টক গন্ধযুক্ত; লম্বা
গোল কুমি; কিতার ভায় কুমি; কুমি জনিত জ্বর।

জনেন্দ্রিয়। হুড্‌হু কুমির উত্তেজনার দরুণ জ্বীলোকের পুরুষ
সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা।

মূত্রযন্ত্র। বারম্বার মূত্রতাগের ইচ্ছা, সন্ধ্যার সময়ই বাহ্যিক অধিক
হয়; মূত্র কালচে, কাদাটিরা, গাঢ় এবং ঘোলাটিরা; প্রস্রাব করার সময়
মূত্রনালীতে জ্বালাহুতব।

শ্বাসযন্ত্র। শ্বাস কষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের উদ্বেগ;
রাত্রিতে শুক কাশি (হায়োন); গলার মধ্যে টাটিরা ফেনার ভায় অল্পভূত
হওয়ার দরুণ ক্ষণস্থায়ী শুক কাশি; বুকের পাশে স্ত্রীবিধানের ভায় যাতনা,
নিশ্বাস এবং কাশিবার সময়ই বাহ্যিক অধিক অল্পভূত হয় (বাই)।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শ্রান্তি এবং ভারিবোধ; উরুতে
ছল ফুটানের ভায় অল্পভূত হয়; পায়ের ডিমে ঘাটিরা ধরা; পায়ের পাতার
ভারি বোধ।

নিদ্ৰা। দিনের বেলা ঘুমের অত্যন্ত ইচ্ছা; রাত্রিতে বারম্বার
ঘুম ভাঙিয়া যায় এবং ঘুম দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করে
না ও ঘুমেরঘোরে চিন্তা উৎপাদক স্বপ্ন দেখে।

চর্ম। শরীরের স্থানে স্থানে লাল চিহ্ন এবং লাল রেখার ভায়
পড়ে, বহির্জগৎতেই বাহ্যিক অধিক স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্বর। জ্বর, কিন্তু উহার সঙ্গে পিপাসা থাকে না (এপিদ্, পাল্‌স);
শরীর কম্পন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন উষ্ণহুতব, বাহ্যিক মাথা এবং
মুখ মণ্ডলেই অধিক অল্পভূত হয়; অপরাহ্ন বা সন্ধ্যার সময় শীতকম্প, বাহ্যিক
প্রায় সকল দিনই রোগীকে এক নির্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ করিয়া থাকে
এবং অনেক সময় উহার পর শরীর উষ্ণ হয় না; জ্বর ভাব; গা বমী বমী
করা; মনের উদ্বেগ, সহস্র চমকিয়া উঠা, শরীর কম্পন, নিশ্বাস প্রস্রাব ঘন
ঘন এবং গরম; অত্যন্ত শীত, হাত পায় বাহ্যিক অধিক অল্পভূত হয় এবং উহার
সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলের উষ্ণতা।

ব্যবহার । সবিরাম বা পাল্লা জ্বর ; গলার মধ্যের গিরাতন আকারের বেদনা বা ক্ষত ইত্যাদি কৃমি বা কৃমি জনিত অশুধ ; আহার বহা গল নালীর প্রদাহ ; পাকস্থলী প্রদাহ ; উদরাময় ; ফুফুসাবরক বিল্লী প্রদাহ বাহাতে প্রদাহ জনিত জ্বর বা পিপাসা থাকে না ইত্যাদি অশুখে স্ত্রাবাভিলা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । গা মাটি মাটি করা ; শরীরের স্থানে স্থানে থেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার স্থান ক্ষণস্থায়ী প্রবল বেদনা ; একখানি ধারাল ছুরি দিয়া চাঁটিলে বা কাটিলে বেরূপ হয়, সমুদয় হাড়ের মধ্যে, প্রধানতঃ সন্ধিতে, সেরূপ বেদনা ; ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য হয় না ; লক্ষণাদি প্রথমতঃ ডাইন দিকে আরম্ভ হইয়া বামদিকে বিস্তৃত হয় ; শয়ন করিয়া থাকিলে অবিকাংশ লক্ষণের উপশম ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ষ্ট্রাকিসেগ্রিয়া, বিরেটাম্ আল্‌বাম্, একোনাইট্, ব্রাইওনিয়া, চায়না, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্, পাল্‌সেটিল্য, সিলিয়া ।

প্রতিষেধক ঔষধ । পাল্‌সেটিল্য ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক সচরাচর ব্যবহার্য্য । কোন কোন চিকিৎসক ইহার ৬ এবং ১২ ক্রমও ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

শ্যাম্বুকান্ নাইগ্রা,-শ্যাম্বুক

(SAMBUCUS NIGRA,-SAMBUC.)

এই গাছের কচি কাঁচা ডালের বাকলের মধ্যের অংশ বধা নিয়মে প্রক্ষিপ্তিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ষাণ্ড যন্ত্রের প্লেম্বিফ বিল্লী এবং চন্দ্র ইহা দ্বারা বিশেষ রূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহার দরুণ সন্ধি বসিয়া বাইধা অশুখ এবং প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অনবরত খিট্ খিট্ করা ; সহজেই চমকিয়া উঠা ; শরীর কম্পন, মনের উদ্বেগ এবং অস্থিরতা (একন্) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল ক্ষীত এবং টল্ টলে অথবা কাল্ চ লীল বর্ণ ।

জননেন্দ্রিয় । জীগোকের সম্মান প্রসবের পর প্রচুর পরিমাণে হর্ষলকারক ঘর্ম ।

উদর । ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরে খুল বেদনার জ্বাৰ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুল্মহার দিয়া প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ ।

শ্বাসযন্ত্র । স্বরভঙ্গ এবং কঠিনালীতে প্রচুর পরিমাণে কঠিন শ্লেষ্মার সঞ্চয় (ক্যালী-বাই, কমেস্) ; বুকে আঁটাবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে চাপাবোধ ও বমনোদ্বেগ ; বুকের বামপার্শ্বে ও স্তনের বোটার নিচে আঁটাবোধ এবং সূচী বিধানের জ্বাৰ যাতনা (ক্যালী-কার্ক) ; রাত্রি দুই প্রহরের পর শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হওয়া (একন্, আন্টি-টার্ট, আন্স, চায়না), বাহার দরুণ রোগী হঠাৎ আগিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়, নীলবর্ণ হয় এবং নিশ্বাস প্রস্থানের প্রয়াস পায় ; শিশু বা ছোট বাগক বালিকাগণের শ্বাসরোধক কাশি এবং তন্দ্ররূপ ক্রন্দন ।

নিদ্রা । নিদ্রার ইচ্ছা থাকে বটে, কিন্তু নিদ্রা হয় না (কাস্, বেল্, ল্যাক্) ।

জ্বর । জ্বরের উষ্ণাবস্থায় গায়ের কাপড় ফেলিতে ভয় হওয়া বা অনিচ্ছা ; মুখ মণ্ডলে আগ্নেয় উষ্ণায়ত্তব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পরিমিত উত্তাপ, পায়ের পাতা বরফের জ্বাৰ ঠাণ্ডা, কিন্তু পিপাসা থাকে না ; জাগ্র অবস্থায় থাকিলে প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত হর্ষলকারক ঘর্ম ; রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম (চায়না, কস্, কস্-আন্স, সাল্ফ্) ।

ব্যবহার । সর্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গমন ; সর্দির দরুণ শিশুগণের নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া থাকা ; ঘুড়ী কাশি ; হুপিং কফ ; হাঁপানির লক্ষণ বিশিষ্ট সর্দি ; শোথ ; হাতের সমুখ ভাগে স্নায়ুশুল্কের জ্বাৰ বেদনা ইত্যাদি অস্থে শ্যাঙ্কশ্চ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । হাত পায়ের পাতা স্ফীত, টপ্‌টপে এবং নীলবর্ণ; শোণের ভ্রাগ স্ফীতি; বিশ্রামকালীন অঙ্গুথের বৃদ্ধি এবং নড়া চড়া ও বিছানার সোজা হইয়া বসিলে অঙ্গুথের উপশম । ওপিয়ামের পর শ্রাবু কাশ্ বিশেষ উপকারী ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । একোনাইট, আর্সিনিক, বেলাডোনা, চায়না, ইপিকাকিউএনা, রাস্টল্, সিপিয়া, সাল্‌ফার ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আর্সিনিক, ক্যাম্ফার ।

ডাইলুশন বিচার । অতিরিক্ত ঘর্ষ এবং হাঁপানিতে ১ম দশমিক ক্রমের আরোক উপকারী । হানিমানের মতে এই গাছের আদত রস অধিক উপকারী ।

সিলা ম্যারিটিমা, স্কুইল্, -সিলা

(SCILLA MARITIMA, -SQUILL, -SCILLA.)

ইহার কাঁচা শিকড় যথানিয়মে প্রক্ষ্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহাকে স্কুইলও বলে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মর্জ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ু-মণ্ডলী আক্রমণ করিয়া উহাতে অত্যন্ত উত্তেজনা উৎপাদন করে, বাহ্যে বায়ু যত্র এবং মূত্রযন্ত্রেই অধিক প্রকাশ পায় ও যাহার দক্ষণ উহাতে প্রদাহও হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথায় কিম্ব কিম্ব করা; কপালের ডাইন পার্শ্বে স্থলীবিধা-নের ভ্রাগ ব্যতন্য; কপালের দুই পার্শ্বে স্কেচক বেদনা বা ব্যতন্য; মাথার পশ্চাৎভাগে হঠাৎ ক্ষণস্থায়ী কদ্রিয়া ধরার ভ্রাগ বেদনা; বাহ্যে বামদিক হইতে ডাইন দিকে বিস্তৃত হয় ।

চক্ষু । চক্ষুর ভ্রাগ সঙ্কুচিত ।

কর্ণ। বাম কর্ণের নক্ষত্র ভাগে ছিঁড়িয়া কেনার জায় বেদনা ।

নাসিকা। সর্দি এবং প্রাতঃকালে নাকদিয়া প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ কতকরক স্লেচ্ছা নির্গমন; হাঁচি এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া (আর্স, সিপা, ইউক্রেস); নাসারন্ধ্রের ধারে জ্বালা এবং টাটানি ।

গলার মধ্য। তালুকা এবং গলার মধ্যে জ্বালা; গলার মধ্যে খুঁখুনি এবং হুড়হুড়ী, বাহ্যার দরুণ কাশির উল্লেখ হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর। আহার দ্রব্যে তিক্ত বা মিষ্ট স্বাদ; অনিবার্য ক্ষুধা; বমনোদ্বেগ, গলার মধ্যব পশ্চাত্তাগ হইতে বাহ্যার উল্লেখ হয় বলিয়া অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লালের দরুণ; একখানি শাখর চাপিয়া রাখিলে বেরুণ হয়, পাকস্থলীতে সেকণ ভারিবোধ (আর্স, ব্রাই, নাক্স-বন্, পাল্‌স) । উদর এবং মূত্রাধার প্রদেশে অসহ্য বেদনা এবং টাটানি ।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রাধারে ক্রমাগত চাপাবোধ; মূত্রত্যাগের অত্যন্ত ইচ্ছা এবং প্রচুর পরিমাণে জলবৎ মূত্রত্যাগ (এপিস, আপোসাইনাম্); লালবর্ণ গাঢ় মূত্রত্যাগ (একন্, আর্স, ক্যাঙ্ক.); মূত্র পরিমাণে অধিক চর (এপিস, আপোসাইনাম্) ।

শ্বাসযন্ত্র। প্রবল কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের পার্শ্বস্থতীব্রিধানের জায় যাতনা, গলার থাইরয়েড্ উপস্থিতি (Thyroid Cartilage) নীচে হুড়হুড়ীর দরুণ বাহ্যার উল্লেখ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলাদিয়া স্লেচ্ছা নির্গমন; নিশ্বাস টানিবার সময় অল্পক্ষণস্থায়ী শুষ্ককাশি; শ্বাসকষ্ট, বাহ্যার দরুণ রোগী বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস টানিত বাধা হয় এবং বাহ্যার দরুণ কাশির উল্লেখ হয়; শ্বাসকষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে স্থতীব্রিধানের জায় যাতনা, নিশ্বাস টানিবার সময়ই বাহ্যার বৃদ্ধি হয়; বুকে স্থতীব্রিধানের জায় যাতনা, কোন দ্রব্য সোঁকিবার সময় বা কাশিবার সময় বাহ্যে অধিক অনুভূত হয়; কুক্ষ্মাবরক বিল্লী প্রদাহ (ব্রাই) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; বাম স্ক্লাম্বার উপরিভাগে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ঝাকনি বা লাকনি; বাম কক্ষে বেদনাহীন কসিয়া ধরার জায় অনুভূত হওয়া ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ। বাহ এবং পায়ের আক্ষেপিক স্পন্দন বা লাকানি।

নিদ্রা। অস্থির নিদ্রা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় বারবার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্ ফট্ করা (একন্)।

জ্বর। হাত পায়ের পাতা বরফের জায় ঠাণ্ডা এবং শরীরের অন্ত্রাঙ্ক অংশ উষ্ণ; শরীর শুষ্ক এবং উঠাতে আঙুলের, জায় উজ্জ্বল ও গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলেই শীতকম্প এবং বাতনা।

ব্যবহার। স্নেহা জনিত অস্থ; হাঁপানির লক্ষণাক্রান্ত সর্দি; বায়ু উপনল প্রদাহ; ফুফুস প্রদাহ; ফুফুসাবরক বিষ্রী প্রদাহ; হাম; মূত্রকোষ প্রদাহ; মূত্রে শর্করা ব্যতীত বহুমূত্র (Diabetes Insipidus); শোথ জনিত অস্থ; মূত্র কৃচ্ছ্র; মূত্রাবরোধ, রক্ত বা আৰ্দ্ৰমেন্ বৃক্ষ মূত্র-তাগ ইত্যাদি অস্থে দিলা ন্যারিটিয়া ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। ঘুম পায় না, অথচ গা ভাঙ্গা এবং হাই তোলা; সমুদয় শরীরে শ্রান্তিবোধ এবং হ্রস্বলতা; প্রত্যেক সন্ধিব পশ্চাত্তাগের চামড়ার ভাজে ভাজে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জায় কত।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাফার।

ডাইনুশন বিচার। ডাক্তার হিউজের (Dr. Hughes) মতে কাশি বা শ্বাসযন্ত্র সম্বন্ধীয় অস্থে ১ম দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহার্য্য। মৌত্রিক যন্ত্রের অস্থে ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহার্য্য। শ্বাস ও মৌত্রিক যন্ত্রের অস্থে লেখক মূল আরোক, রোগী শিশু বা ছোট বালক বালিকা হইলে, ½ ফোঁটা এবং রোগী যুবা বা যুবতী হইলে ১, এবং কখন কখন, ২ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অনেক রোগীর চিকিৎসায় মিশ্র আরোক দ্বারা বিশেষ ফল না পাইয়া তিনি এইরূপ মূল আরোক ব্যবহার করেন এবং তদ্রূপ বিশেষ ফলও পাইয়া আসিতেছেন।

সেনিগা,-সেনিগা

(SENEGA,-SENEG.)

এই গাছের শুকনা শিকড় ঝপানিয়মে প্রক্স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। - ঝাণষন্তেব শৈল্পিক ঝিল্লী ইহা বিশেষরূপে আক্রমণ করিয়া থাকে বাহাতে ইহা শ্লেষ্মাক্রান্ত প্রদাহ উৎপাদন করে। ইহা চক্ষু এবং উহার বোজক ঝিল্লীর উপরও উক্ত প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা পাকস্থলী এবং অন্ত্রের শৈল্পিক ঝিল্লীকে উত্তেজিত করে, বাহার দরুণ বমন, শূলবেদনা এবং উদরাময় হয়। ইহা ফুসুসাবরক ঝিল্লী এবং সন্ধিগুলিও আক্রমণ করিয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। মাথার গোলমেলে বোধ; মাথাবোঁরা, বাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন সে টলিয়া পড়িবে; মাথার চিমাবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে চাপাবোধ ও উহার হ্রস্বতা; মাথা যেন ভারি হইয়াছে একপ অমুভূত হয়; কপাল, মাথার পশ্চাৎদেশ এবং পার্শ্বে এক প্রকারের কন্কনানি যাহা রোগীকে প্রত্যহ আক্রমণ করিয়া থাকে এবং যাহা উক্ত ঘরে বসিয়া থাকিলে অমুভূত হয় ও বাহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে চাপাবোধ হয় ও বাহাতে কোন প্রকারের চাপ সহ হয় না, অথচ চাপ দিলে মাথার বেদনা বৃদ্ধি হয় না; বহির্বিষ্মুতে অঙ্গ চালনায় অঙ্গের উপশম; মধ্যাহ্নে জাহ্নরের পর কপাল এবং চক্ষুর কোটরে চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনা, মাথার বাম পার্শ্বে ই বাহা অধিক অমুভূত হয় এবং বহির্বিষ্মুতে বাহার উপশম হয়।

চক্ষু। চক্ষুর কোটরের উপরিভাগে কন্কনানি; কোন বস্তুর দিকে একদৃষ্টে স্থিরভাবে ডাকাইয়া থাকিলে চক্ষু কাঁপে এবং চক্ষু দিয়া জল পড়ে; পুস্তকাদি পাঠকরার সময় চক্ষে হ্রস্বলবোধ এবং চক্ষে জগের সঞ্চার হয়; চক্ষুর গোলকে কসিয়া এবং চালিয়া ধরার জ্বায় যাতনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি শক্তির হ্রাস; দৃষ্টি শক্তির হ্রস্বতা এবং পুস্তকাদি পাঠ করিবার সময়

চক্ষুর সম্মুখে পাখীর স্ফীত আড়িবার জায় ষড়্‌ফড়ানি, বাহার দরুণ-রোগী বারম্বার চক্ষু মুছিতে হয় ; সূর্য্য অন্ত বাওরা কালীন পশ্চিম মুখা চলিবার সময় নিম্ন দিকে ফাকাইলে রোগী যেন সূর্য্যের নীচে আর একটি ভিষাকাবের সূর্য্য দেখে, মাথা পশ্চাদিকে ফিরাইলে বা চক্ষু বুজিলে যাহা অদৃশ্য হয় ; চক্ষে এক নস্ত দুইটির জায় দেখায়, পশ্চাৎ দিকে মাথা ঈঁকা বাকা করিলে বা ফিরাইলে যাহা অদৃশ্য হয় না ; চক্ষুর পাতার পদ্মে (Eye-lashes) কঠিন পিছুটি (কেতুর) জড়াইয়া ঝুলিয়া পড়ে ; সাবান প্রবিষ্ট হইলে বেক্রপ হয়, চক্ষুর যোজক ঝিল্লীতে নেক্রপ জ্বালা এবং চিড়িক মারা, প্রাতঃকালেই যাহা অধিক হয় ; চক্ষুর পাতার প্রদাহ এবং উহার দরুণ চক্ষুর পাতার পাতায় এত দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকে যে জলদিয়া ভালক্রপে না ভিজাইলে উহা খোলা যায় না ।

নাসিকা । নাসিকার শৈথিল্যিক ঝিল্লীর অভ্যন্ত কঠিনায়ক শুকতা ; যত অধিক হাঁচি হয়, তত অধিক মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে এবং ভারি হয় ; হাঁচির পর নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমন ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের বার অর্দ্ধাংশে পক্ষাঘাতের জায় অবশ্য বা অসাড় বোধ ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । প্রাতঃকালে জিহ্বা সাদা, হ্রি-দ্রার আভাবুক, সাদা বা চট্‌চটিয়া আঠা লেপযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে চট্‌চটিয়া বিস্তীর্ণ । মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য শুষ্ক ; গলার মধ্যে চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মার সঞ্চাব, যাহা গলায় থেকুর দিলেও সহজে নির্গত হয় না ; গলার মধ্যে চট্‌চটিয়া ফেলা এবং থলুথলে বোধ হয় ; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে আঁটা বোধ ; বারম্বার গলায় ফেকুর দেওয়া ।

পাকস্থলী । উল্কাবউঠা, যাহাতে গলার মধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চাবের ত্রাস হয় এবং গলায় ফেকুর দেওয়ার আবশ্যকতা থাকে না ; পাকস্থলীর মধ্যের নিম্নভাগে চাপা বোধ ; অত্যন্ত প্রবল ক্ষুধা ; পাকস্থলীতে জ্বালা ; পরিপাক কার্যের বৈলক্ষণ্য ।

মল । মল জলবৎ তরল, যাহা শুষ্কতার দিয়া প্রবল বেগে পিচ্‌কারীর খারের জায় নির্গত হয় (কোটন, গ্রাটিয়েলা, থুড়া) ।

মূত্রবস্তু । মূত্রের পরিমাণ কমিয়া যায় ; মূত্র কাল্পে এবং ফেনা-বৃদ্ধ ; মূত্র ত্যাগের পর মূত্র ঠাণ্ডা হইলে ঘোলাটিয়া এবং অস্বচ্ছ হয় ও উহার নীচে গাঢ়, হরিদ্রার আভাযুক্ত লাল তলানি পড়ে, তলানির ঠিক উপরিভাগ হরিদ্রা বর্ণ এবং গোলানির স্থায় দেবায় ।

শ্বাসযন্ত্র । বুকের মধ্যে চট্‌চট্‌িয়া আঁটা স্লেয়ার সঞ্চার, বাহার দক্ষণ বারম্বার গলায় ফেঁকুরু এবং কাশির উদ্ভেদ হয় ; উঠেঃষরে পুস্তকাদি পাঠ করার সময় হঠাৎ স্বরভঙ্গ হয় ; নিচের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠিবার সময় শ্বাসকষ্ট এবং বুকে আঁটাবোধ ও গলার মধ্যে ধংশ্বেশ বোধ ; কণ্ঠনালীতে স্লেয়ার সঞ্চার, স্ফুঃস্ফুঃ বা জ্বালাত দক্ষণ অল্পক্ষণ স্থায়ী শ্বশ্বশে কাশি, বহির্কায়ুতে এবং তাড়াতাড়ি চলিয়া বেড়াইলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; সামান্য সর্দিতে যেক্রপ হয়, হাঁচি হইয়া কাশির সেক্রপ শেষ হয় ; বুকে টাটানি, শুষ্ক কাশি, গলার মধ্যে শুষ্ক বোধ, স্বরভঙ্গ এবং তৎপর বায়ুনল ও বায়ু উপনলের মধ্যে প্রচুর স্লেয়ার সঞ্চার ; সঞ্চার সময়, রাত্রিতে, বিশ্রাম কালীন, বসিয়া থাকিলে, (বাম) পার্শ্বে শয়ন করিলে এবং উচ্চ ঘরে কাশির বৃদ্ধি ; রক্ত যেন গরম হয় ; কষ্টানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার দমকা উচ্চানুভব ; কষ্টানুভব, বিশ্রাম কালীন বাহার বৃদ্ধি হয় ; বুকে আঁটা বা বাটিয়া ধরার স্থায় অহুভূত হয় (মার্ক্‌কর) ; বুকে কন্‌ কন্‌ প্রবল বেদনা, রাত্রিতে এবং বিশ্রাম কালীনই যাহা অধিক অহুভূত হয় ; স্পর্শ করিলে বা হাঁচিদিলে বুকের প্রাচীরে বেদনা বা টাটানি, ঠাণ্ডা লাগিলে বাহা অনেক কাল ব্যাপিয়া থাকে (রেনান্‌কুলাম্) ; বৃক খুব আঁটা হইলে যেক্রপ হয়, নড়া চড়াতে বুকে সেক্রপ বাতনা, বাহার দক্ষণ বাহাতে বৃক বিবৃত্ত হয় সে জন্ত রোগী ব্যাকুল হয় এবং বাহার দক্ষণ বুকে টাটানি থাকিয়া যায় ; বক্ষস্থির নীচে জ্বালাযুক্ত বেদনা বা টাটানি, নড়াচড়া এবং দীর্ঘ নিশ্বাসে যাহা অধিক অহুভূত হয় ; বুকে স্থচীবিধান বা খোঁচা বিধর্মী স্থায় বাতনা, নিশ্বাস এবং বিশ্রামে বাহার বৃদ্ধি হয় ; কণ্ঠ-নালী, বায়ুনল এবং বুকের মধ্যে স্লেয়ার সঞ্চার (আন্টি-টার্ট্‌, ইপিকাক্‌, ষ্টোনাম্) ।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎপ্রদেশে ছিদ্রকারার স্থায় প্রবল বেদনা (ট্রিনিজ) ।

জ্বর । শীত বোধ ; পৃষ্ঠদেশের কম্পন ; মুখমণ্ডলে উষ্ণমুখত্ব ; দুর্বলতা ; চক্ষু জ্বালা ; দপ্-দপিয়া শিরঃশীতা ; শ্বাস কষ্ট ; তেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বেরূপ হয়, সমুদ্র শরীরে সেরূপ অস্বভাব হয় ; চর্ম উষ্ণ ; নাড়ী কঠিন এবং দ্রুতগামী ।

ব্যবহার । শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর (প্রধানতঃ কণ্ঠশালা, বায়ুনল এবং বায়ু উপনলের শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর) অস্বভাব ; যে প্রকার শ্লেষ্মা জনিত অস্বভাবে অস্বভাব সন্নিবিষ্ট গেলেও বুকের প্রাচীরের স্থানে স্থানে সীমা বিশিষ্ট বেদনা বা টাটানি থাকিয়া যায়, সে প্রকার প্রদাহ জনিত অস্বভাব ; বুকের মধ্যে বস্ত্রাদির প্রদাহের পর বক্ষ শোথ ; গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পূর্বে সংলগ্ন চক্ষু প্রদাহ ; চক্ষুর ঘোজক ঝিল্লী প্রদাহ ; চক্ষুর আইরিস্ নামক অংশের প্রদাহ (Iritis) ; চক্ষুর ছানি কাটার পর বিশেষ উপকারী ; পুণ্ড্রন আকারের বায়ু উপনল প্রদাহ (বৃদ্ধ বয়সে অধিক উপকারী) ; ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ ; ফুস্ফুস প্রদাহ ইত্যাদি অস্বভাবে সেনিগা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত দুর্বলতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অল্প প্রত্যঙ্গে স্ত্রীবিধানের জায় বাতনা ও মাথায় গোলমেলে বোধ ; শরীরের উর্দ্ধাংশে অবশ বোধ এবং উহার সামান্য কাঁপনি ; বহির্কায়ুতে চলিয়া বেড়ানোর সময় মূর্ছার ভাব ; বিশ্রাম কালীন, চলিয়া বেড়াইলে, বহির্কায়ুতে অস্বভাব বৃদ্ধি । ডাক্তার হেরিং (Dr. Hering.) বলেন যে, ভোপ্‌গা বা চর্মবৃদ্ধ শরীর বিশিষ্ট ছোট বালক বালিকাগণ বাহ্যিকের সহজে সর্দি লাগে, অথবা বাহ্যিকের সর্দি অনবরতই লাগা থাকে এবং সম্পূর্ণরূপে সারে না, তাহাদিগের পক্ষে সেনিগা বিশেষ উপকারী ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । শ্বাস বস্তুর উপর সেনিগার কার্য্য অনেকটা ব্রাইওনিয়া এবং হিগার সাল্‌ফিউরিসের জায় । এতদ্বির ইহার কার্য্যের সঙ্গে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্বোনিকা, কণ্টিকাম্, ব্যারাইটা কার্ব্ এবং সিলি ম্যাগ্নিটিয়ার কার্য্যেরও সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ২য় এবং ৩য় ক্রমের আরোকই সচরাচর ব্যবহৃত হয় । ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

সেনা,-সোনাঁমুখী,-সেনা

(SENNA,-SENNA.)

সোনাঁমুখীর পাতা যথা নিয়মে প্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক
শ্রুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি। আলোপ্যাথিক মতে
চিকিৎসাশ্রাণী এবং বৈদ্যশাস্ত্র মতে সোনাঁমুখী এক উগ্র রেচক বা সারক
ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ইহা ক্ষুদ্রান্ত্রই (Small Intestines) অধিক
আক্রমণ করিয়া থাকে এবং উহার রেচক কার্যের সঙ্গে সঙ্গে উদরে শূল
বেদনার স্থায় প্রবল বেদনা উৎপাদন করে। হোমিওপ্যাথির নিয়মানু-
সারে ইহা কোন কোন রকমের উদরাময়ে উপকারী। ইহা মূত্রের
ইউরিয়া (Urea), ক্লোরাইড্‌ অব্‌ সোডিয়াম্‌ (Chloride of sodium);
আর্থি ফসফেট্‌স্‌ (Earthy Phosphates) এবং ইউরেটেস্‌স্‌ (Urates)
পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অতএব মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্বও বৃদ্ধি পায় এবং
তদনুগ মূত্রে অক্সালেট্‌ অব্‌ লাইম্‌ (Oxalate of lime) এবং উহার
সঙ্গে সঙ্গে ইউরিয়া থাকিলে ও মল উদরাময়ের স্থায় তরল হইলে, সেনার
মূল আরোক ২ কোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন দুই মাত্রা সেবনে বিশেষ উপকার
দর্শে। ডাক্তার ড্রাইস্‌ডেল্‌ (Dr. Drysdale) উক্ত রোগাক্রান্ত একটা
রোগীকে সেনা সেবন করাইয়া আরাম করিয়াছিলেন।

ষ্টিক্টা পাল্‌মোনেরিয়া,-ষ্টিক্টা

(STICTA PULMONARIA,-STICTA)

এই গাঁছের সমুদয় অংশ যথা নিয়মে প্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল
আরোক শ্রুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা শ্বাস যন্ত্রের শৈল্পিক ঝিলী আক্রমণ
করিয়া স্বেদা জনিত অসুখের লক্ষণাদি উৎপাদন করিয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ

মন । নানা প্রকারের চিন্তা আসিয়া মনকে অস্থির করিয়া ফেলে, যাঁহার দরুণ কোন বিষয়েই মন নিবিষ্ট হয় না ।

মস্তক । মাথার চিমা বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপরি ভাগ দিয়া, মুখ মণ্ডলের পার্শ্বে এবং নিম্ন মাড়িতে, ছুরী বিধানের স্তায় প্রথর বেদনা ; কপাল এবং নাকের গোড়ার স্তায় এবং চাপ পড়ার স্তায় অনুভূত হয় (একন্, ক্যালী-বাই, ফাইটোল্) ; নাক দিয়া স্লেয়া নির্গমনের পূর্বে সর্দি জনিত মাথা ধরা ।

চক্ষু । চক্ষুর পাতায় জালাহুভব ও উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বৃদ্ধিবার সময় বা ঘুরাইবার সময় চক্ষুর গোলকে টাটানি ; সর্দি জনিত চক্ষুর বোজক ঝিল্লীর প্রদাহ এবং তদ্রূপ চক্ষু দিয়া জালা উৎপাদনের শক্তি হীন জল পড়া ।

নাসিকা । নাকের গোড়ার পূর্ণ, ভারি এবং চাপা বোধ (একন্, ক্যালী বাই) ; নাকের ডাইন পার্শ্বে টুন্টনানী ; শ্রাণ শক্তির বিনাশ ; শুষ্ক সর্দি ; নাসিকার স্লেয়া জনিত অন্থথ ; হাঁপানির লক্ষণাক্রান্ত সর্দি (একন্) ; বারম্বার নাক ঝাড়িবার চেষ্টা, কিন্তু নাক ঝাড়িলে কিছুই নির্গত হয় না ; নাকের স্নৈয়িক ঝিল্লীতে অত্যন্ত কঠকর শুষ্কবোধ, নাকের মধ্যের নিঃসরণ শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া যায় এবং তদ্রূপ নাকের মধ্যে মাম্‌ডী (চুমটী) পড়ে, বাহ্যে সহজে বাহির করা যায় না ।

শ্বাসযন্ত্র । শুষ্ক কাশি, রাত্রিতে এবং সন্ধ্যার সময় যাহার বৃদ্ধি হয় এবং যাহার দরুণ ঘুমাইতে বা বসিয়া থাকিতে পারা যায় না ; শুষ্ক পুশ্-পুশে কাশি, কণ্ঠনালী এবং বায়ু উপনলে স্বড়্‌স্‌ডী় দরুণ যাহার উজ্জেক হয় ; বক্ষাকাশাক্রান্ত রোগীর অনবরত শুষ্ক পুশ্-পুশে কাশি ; হুপিং কফের আক্কেপিক অবস্থা ; বৃকে কষ্ট এবং জাঁটা বোধ ।

ব্যবহার । ইহা শ্বাস যন্ত্রের স্লেয়া জনিত রোগেই বিশেষ উপকারী । হাঁপানির লক্ষণ বিলিষ্ট সর্দি ; হুপিং কফ ; বায়ু উপনল প্রদাহ ; বক্ষাকাশ ; চক্ষুর বোজক ঝিল্লী প্রদাহ ; সর্দি এবং উহার দরুণ নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল স্লেয়া নির্গমন ইত্যাদি অন্থথে ষ্টিক্টা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সর্দি লাগিবার পূর্বে বেঙ্গল হয়,

সেৱণ গা মাটি মাটি করা (জেল্‌স্, হাইড্রাট্‌) ; মনে হয় যেন পা বাতাসে
ঝুলিতেছে ; রোগীর (স্ত্রীলোক) মনে হয় যেন সে বাতাসে ভাসিতেছে এবং
সে যেন বিছানায় শোয় নাই (আসেরাম্) ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । এঁকোনাইট, ডাল্‌কেমেরা, হাইড্রাট্‌শ, ক্যালী-বাইক্রমিকাম্, মার্কিউরিয়াম্, ক্রমেণ্, সাল্‌ফুনেরিয়াম্ ।

ডাইনুশন বিচার-। এই ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে লেখক কিছুই
বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।
ডাক্তার হিউজের (Dr. Hughes) মতে ১ম এবং ২য় দশমিক ক্রমের
আরোক ব্যবহার্য্য ।

টোবেকাম্,-তাগাকু,-টোবেক্

(TABACUM,-TOBACCO,-TABAC.)

তাগাকের কাঁচা পাতা যথা নিয়মে প্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক
পেষিত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা নিউমোগ্যাস্ট্রিক্‌ স্নায়ু এবং মেডুলা অব্
লঙ্গেটা (Pneumogastric Nerve and Medulla oblongata) আক্রমণ
করিয়া ইচ্ছা পূৰ্বক সঞ্চালনের শক্তি বিহীন পেশী গুলির পক্ষাঘাত এবং
শিথিলতা উৎপাদন করে । নিউমোগ্যাস্ট্রিক্‌ স্নায়ু দিয়া ইহা পরিপাক
সম্বন্ধীয় যন্ত্র গুলিকেও অত্যন্ত প্রবল রূপে আক্রমণ করিয়া থাকে ।
বার্থোলো (Bartholow) ইহার কার্য্য তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন ।
(১) মস্তিষ্কের উপর কার্য্য ; (২) পাকস্থলীর শৈথিল্য বিস্তার উপর
স্থানিক কার্য্য ; (৩) বমনোৎপাদক শক্তি । ইহা অন্ত্রের শৈথিল্য বিস্তার
নিঃসরণ বৃদ্ধি করে এবং অন্ত্রের শৈথিল্য অংশের ধনুষ্ঠকারের জ্ঞান সঙ্কোচনের
অবস্থা উৎপাদন করে, বাহার বন্ধন তরল ভেদ হইয়া থাকে । উরানক
আকায়ের বমনোধেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর শিটা বা নীলের

আড়ায়ুক হওয়া, মাথা ঘোরা, শীতল বর্ষ এবং নাড়ী অসম (Intermittent) হওয়া এই ঔষধের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ বিশেষ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের উদ্বেগ, কান্দিলে যাহার অনেক উপশম হয়; কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে।

মস্তক। মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট গুলিয়া উঠা বা গা বমী বমী করা, ঘোমতের মধ্যে থাকিলে যাহার বৃদ্ধ হয় এবং বহির্জ্বতে যাহার উপশম হয়; মাথায় ভারি বোধ।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল মৃতবৎ শিটা বা ফিকা হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা বমী বমী করা (অ্যান্টি-টার্ট, অ্যাস্, ইপিকাক্); মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা হয় ও বসিয়া যায় এবং শীতল ঘর্ষে আরুত হয় (অকজ্ অ্যাস্); মুখমণ্ডলের চাড় এবং দাঁতে ছিঁড়িয়া ফেলার ভার প্রবল বেদনা।

মুখগহ্বর। মুখ দিয়া ফেলা উঠা (ককিউল, সিকুটা, লরোস্); মুখে প্রচুর পরিমাণে লালউঠা (হিল্-সাল্‌ক্, মাক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্); মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে সাদা চট্‌চটিয়া আঠা স্লেয়ার সঞ্চার, খুঁখুর ভার যাহা বারম্বার ফেলিতে হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। অত্যন্ত পিপাসা; পেট গুলিয়া উঠা, গা বমী বমী করা, বমনোদ্বেগ এবং বমন, নড়াচড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয়; ভয়ানক বমনোদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা, থাকিয়া থাকিয়া যাহার উদ্বেগ হয়; সমুদ্র শরীর শীতল বস্ম দ্বারা আরুত (বিরেট্-অ্যাল্‌ব্); সমুদ্র পথে জাহাজাদিতে যাওয়া কাণীন বমন বা বমনোদ্বেগ (Sea-Sickness) (ককিউল); পাকস্থলীর মধ্যে ঠাণ্ডা বোধ (ক্যাম্‌ফার, কল্‌চ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ; পেটে পিটে যেন লাগিয়া যায়; পাকস্থলীতে শিথিল বোধ (ইপিকাক্)। নাভি যেন পঞ্চাংদিকে আকৃষ্ট হয়, যাহার দরুণ অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয়; উদরের উপরস্থিত পেশী গুলির সঙ্কোচন (চেলিভন, মাসাম, পডোফ্); বৃদ্ধ অঙ্গ বৃদ্ধি (Incarcerated Hernia)।

মল। কোমল মল নির্গত হওয়ার সময় কোমরের পঞ্চাংদেশ

শ্রবণ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কৌণপাড়া এবং শুষ্কবাবে আলা ;
উদরায়ণ ; মল হরিদ্রাবর্ণ, অথবা সবুজের আভাযুক্ত চট্‌চটিয়া আঠা ;
ওলাউঠার গ্রাণ ভেদ (আস্, ক্যান্ফার, কুশাম্, বিরেট্-আল্‌ব্) ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বাস কষ্ট ; বৃকে ভয়ানক আঁটা বোধ ; হৃপিং কক্ষের
প্রত্যেক আক্রমণের পর হিকা ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । শ্রাগ হৃৎস্পন্দন (একন্, আস্, অরাম্,
স্পাইজেল্) ; রাত্রিতে হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত কষ্টবোধ, থাকিয়া থাকিয়া
বাহ্যার উদ্রেক হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন ও হৃই স্বক্কে
মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা ; নাড়ী অত্যন্ত দুর্বল, কোমল এবং মৃদুগতি বিশিষ্ট ;
নাড়ী ক্ষুদ্র এবং অসম (Intermittent), প্রায় অল্পভূত হয় না ।

জ্বর । হাঁটু হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত বরফের গ্রাণ শীতল ;
(মিনিয়াহ্) ; হাত, কপাল এবং মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম (বিরেট্-আল্‌ব্) ;
গায় শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ম (আস্, ক্যান্ফার, মার্ক্, ফস্, টিরিবিহ্) ।

ব্যবহার । যেসকল অস্থি মস্তিষ্কের উত্তেজনার দরুণ হইয়া
উহার পর বমনোদ্বেগ, বমন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় ; স্বাভাবিক এবং
হৃৎপিণ্ডের যে সকল অস্থি ভয়ানক আকারের বমনোদ্বেগ থাকে ; নৌকা
জাহাজাদিতে চাপিয়া সমুদ্রাদিতে যাত্রায়াতের দরুণ বমন বা বমনোদ্বেগ
(Sea-sickness) হয় ; ওলাউঠা ; শিশুগণের ওলাউঠা ; রুদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি ;
হাঁপানি কাশি ; শ্বাসরোগ ; তবেদনা বা সংসায়শূল ; অক্ষতা ; শুক্রক্ষরণ বা
অনিচ্ছা পূর্বক ধাতু নিঃসরণ (স্বপ্নদোষ) ইত্যাদি অস্থি টেবেকাম্ ব্যবহার্য্য ।
ডাক্তার ব্লেকের (Dr. Blake) মতে হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতির দরুণ নিদ্রা
শূন্তভাবে ইহা বিশেষ উপকারী । টেষ্টার (Taste) মতে পাকস্থলী এবং
অন্ত্রের আক্ষেপ বা বেদনায় এই ঔষধ ব্যবহার্য্য । যেপ্রকার মাথাঘোরা
পাকস্থলীর কার্যের বৈলক্ষণ্য হেতু হয়, তাহাতে ডাক্তার জুসেটের (Dr.
Jousset) মতে টেবেকাম্ উপকারী ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত হর্ষগতা এবং নিস্তেজতা
(আস্, চায়না) ; অত্যন্ত অস্থিরতা, রোগী বারম্বার বা অনবরত পাশ পরি-
বর্তন করিতে চাহে ; রাত্রিতে অবসন্নকারক বা অজ্ঞানবৎ নিদ্রা ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। আন্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্, ডিজি-টালিস্, লোবিলিয়া, বেলাডোনা, ইপিকাকিউএনা, নাক্স-বমিকা, ওপিয়াম্, ট্রিমোনিয়াম্, বিব্রোটাম্ আল্‌বাম্।

প্রতিষেধক ঔষধ। আর্গিনিন্স, ক্যামোমিলা, ইপিকাকিউএনা, নাক্স-বমিকা, ইগ্নেসিয়া, পাল্‌সেটিল্লা।

ডাইলুশন বিচার। ১ম হইতে ৬ষ্ঠ কেম ব্যবস্থা। কোন কোন চিকিৎসক আবার মূল আরোক ২৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

ট্যারেক্সে-কাম্,-ট্যারেক্স্

(TARAXACUM,-TARAX.)

এই গাছের সমুদয় অংশ সংগ্রহ করিয়া যথানিয়মে উহা প্রফ্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা পরিণাক সঞ্চকীয় বস্তুর মৈথ্রিক বিষ্মী এবং যকৃত আক্রমণ করিয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। বসিয়া থাকিলে কপালের বাম পার্শ্বে কসিয়া ধরার স্তায় বেদনা, দাঁড়াইলে বা চলিয়া বেড়াইলে যাহার উপশম হয়; মাথার পশ্চাৎ-ভাগে ছিঁড়িয়া ফেলার স্তায় বেদনা; বসিয়া থাকিলে কপালের বাম পার্শ্বে সূচীবিধানের স্তায় যাতনা, দাঁড়াইলে যাহার উপশম হয়; শয়ন করার পর মাথার পশ্চাৎদেশের নিম্নভাগে চাপা এবং ভারিবোধ।

চক্ষু। বাম চক্ষুর গোলকে জালা।

কর্ণ। কর্ণের বহির্দেশে কসিয়া ধরার স্তায় বেদনা।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল লাগবর্ণ এবং উষ্ণ।

মুখগহ্বর। টক দ্রব্যাদি খাইলে যেক্রপ হয়, দাঁত সেক্রপ টকে থাকিয়া;

জিহ্বা, সাদা লেপযুক্ত, সাদা লেপ উঠিয়া যাইয়া জিহ্বার স্থানে স্থানে কালচে, লাল দাগ থাকিয়া যার এবং বাহা অভ্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায়; মুখে প্রচুর পরিমাণে লালের সঞ্চার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন কঠিনাগী কেহ চাপিয়া বন্ধ করিতেছে; আহারের পর মুখে তিক্ত স্বাদ ।

পাকস্থলী এবং উদর । টক উদ্গার উঠা; হিষ্কা; অতিরিক্ত পরিমাণ চর্বিযুক্ত দ্রব্য খাইলে ঘেঁষাপ হয়, সেরূপ বমনোদ্বেগ এবং বমনের ইচ্ছা (পাল্‌স্) । উদরের বাম পার্শ্বে স্থতীবিধানের জায় বেদনা; বুদ্ধবল উঠিয়া ফাটিয়া গেলে ঘেঁষাপ হয়, উদরের মধ্য সেরূপ অনুভূত হয় ।

মল । মল কঠিন নহে বটে, কিন্তু উহা অতিকষ্টে নির্গত হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । বৃক্কে স্থতীবিধানের জায় বেদনা (ব্রাই); ডাইন পার্শ্বের পাল্লার হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের পেশীতে স্পন্দন ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড়ের বাম পার্শ্বে স্পন্দন বা ফাটিয়া ধরার জায় যাতনা; ডাইন স্বন্ধে গড়্‌গড়্‌ শব্দ হওয়া ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । • বাহুর পেশীর স্পন্দন; হাতের আঙ্গুলের মাথা বরফের জায় শীতল; ডাইন হাতের শেষ তিনটি আঙ্গুলে চাপিয়া ধরার জায় বেদনা । বাম উরুতে স্থতীবিধানের জায় যাতনা; বাম পায়ের ডিবে চাপিয়া ধরার জায় বেদনা; ডাইন পায়ের ডিবে লাকানের জায় বেদনা, স্পর্শ করিলেই বাহা থামিয়া যায়; ডাইন পায়ের পাতার উপরিভাগে কদিয়া ধরার জায় বেদনা; ডাইন পায়ের পাতার তলার স্থতীবিধানের জায় প্রবল বেদনা; পায়ের আঙ্গুলে আলাহুতব ।

নিদ্রা । দিনের বেলা হাই উঠা এবং নিদ্রার ভাব; যে সকল বিষয় একবারেই স্মরণ থাকে না, সে সকল বিষয়ে স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা ।

জ্বর । আহার বা পানের পর শীতবোধ (ক্যাম্প্) ।

ব্যবহার । শিরঃপীড়া; পাকস্থলীর অসুখ; যকৃতের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা; কামলরোগ; বাতরোগ; শ্বাসশূল; উদরাময় ইত্যাদি রোগে ট্যারেলেকাম্ ব্যবহার্য্য । কখন কখন প্রচুর মূত্রত্যাগ, রাজিতে প্রচুর ঘর্ম্ম এবং অল্প কালের চর্ম্ম রোগও ইহা দ্বারা আরাম হইয়া থাকে । বলা অবস্থায় সমুদয় লক্ষণের বৃদ্ধি এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সম্মুখণ বিশিষ্ট ঔষধ । ব্রাইওনিয়া, কাপসিকা, নাস-
বমিকা, পালসেটিল, স্পাইজেলিয়া ।

ডাইলুশন বিচার । হানিমান্ ইহার মূল আরোক ছই কোঁটা
মাত্রায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন । ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছু
বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসায়
ইহা অধিক ব্যবহার করেন নাই । যে কএকটা রোগীর চিকিৎসা তিনি
এই ঔষধ দ্বারা করিয়াছেন, উহার সমুদয় রোগীকেই তিনি হানিমানের
মতামুসারে মূল আরোক, ১ কোঁটা মাত্রায়, ব্যবহারের ব্যবস্থা দিগাছেন ।

টেলুরিয়াম, -টেলুর

(TELLURIUM, -TELLUR.)

কোন এক বিষমত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় ইহাতে আদত টেলুরিয়াম
ক্ৰয় করিয়া যপানিয়মে সুগার অব্যমিকে মিশাইয়া ইহার মিশ্র গুঁড়া প্রস্তুত
হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা প্রধানতঃ চর্ম আক্রমণ করিয়া উহাতে
দাঁদের জায় কোঁড়া বিশিষ্ট এক প্রকার ফুসুড়ী উৎপাদন করে । এই ফুসুড়ী
কখন কখন চক্রাকারের হার্পিসের (Herpes Circinatus) আকার ধারণ
করে । ইহা মেরুদণ্ড, উরুদেশ এবং গুহদ্বারের উপরিভাগের হাড়েও
সায়োটিকার (Sciatica) জায় বেদনা উৎপাদন করে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

চক্ষু । চক্ষুর লেন্স নামক অংশের (Lense) সম্মুখে চাকড়ির জায়
এক প্রকার পদার্থের সঞ্চার হয় ; চক্ষু দিয়া পূর্বের জায় পদার্থ নিঃসরণ ;
চক্ষের পাতার উপর ইম্পিটিগোর আকার বিশিষ্ট বিকচ (Eczema Im-
petigoides) ; ফুসুড়ী ; চক্ষুর বোজক ঝিল্লীর মধ্যে দাঁদের জায় ফুসুড়ী ;

চক্ষুর শিরার বিবৃতি এবং কর্ণিরার প্রান্তের নিকটবর্তী স্থানে কোঙ্কার জ্বায় ফুসুড়ী, কানদিলে বাহার রুজি হয় ।

কর্ণ । দিবা রাজি কানের মধ্যে যুগ্মযুগ্মে রক্তের দগ্ধপিয়া বেদনা, কান দিয়া জলবৎ তরল ক্ষতকারক নিঃসরণ ; কানের পটহতে কোঙ্কার জ্বায় ফুসুড়ী, বাহা পাকিয়া কাটিয়া বাইয়া পটহে ছিন্ন হয় ; পটহতে ক্ষত হইয়া শ্রবণ শক্তির অনেক হ্রাস হয় ; কানের মধ্যের ক্ষীতি এবং উহাতে চুল্কানি ও কানের বহির্দিশে অত্যন্ত কষ্টদায়ক দগ্ধপানি ; উহার ৩৪ দিবস পর কানদিয়া তরল কল্কতানি নির্গত হয় ; এই কল্কতানি যেখানে লাগে সেখানেই ঘা হয় ; কানে শোধের জ্বায় ক্ষীতি এবং উহাতে কোঙ্কার জ্বায় ফুসুড়ী ; শ্রবণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ ।

নাসিকা । বহির্কায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে সর্দিলাগা এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল স্লেথা নিঃসরণ ও চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল নির্গমন ; অন্নকালস্থায়ী কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বক্ষা-স্থির নীচে চাপাধোষ ।

মুখগহ্বর । মুখের মধ্যে রক্তের জ্বায় গন্ধ ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের স্ত্রীসহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা ; অণু-কোষাধার এবং অণুকোষাধার ও গুহ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁদের জ্বায় ফুসুড়ী ।

পৃষ্ঠদেশ । মেরুদণ্ডের হাড়ের, ঘাড় হইতে কোমর পর্য্যন্ত অংশে, টাটানি, চাপিলে এবং স্পর্শনে বাহা অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় ও বাহার দরুণ রোগী কাহাকেও তাহার নিকট আসিতে দেয় না ; গুহ্বারের উপরিভাগে বেদনা, বাহা ডাইন উরুতে বিস্তৃত হইয়া সায়োটিক স্নায়ুর (Sciatic nerve) পাশা পাশি আগা গোড়া অহুভূত হয়, মলত্যাগের সময় কৌথ পাড়িলে, কাশিলে, হাসিলে, আক্রান্ত পার্শ্বেশয়ন করিলে বাহার রুজি হয় (সায়োটিকা, - Sciatica) ।

চর্ম । সমুদয় শরীরে দাঁদের জ্বায় ফুসুড়ী বাহা নিম্নাঙ্গেই অধিক হয় এবং কখন কখন কেবল শরীরের কোন কোন অংশে প্রকাশ পায় ।

ব্যবহার । দাঁদ বা দাঁদের জ্বায় ফুসুড়ী ; দাঁদের জ্বায় কোঙ্কা

বিশিষ্ট ক্ষুধা ; মেরুদণ্ডের উত্তেজনা ; সায়োটিক স্নায়ুতে বেদনা বা, সায়েটিকা (Sciatica) ; কান দিয়া পচা মাছের গন্ধ বিশিষ্ট জলবন্তরল নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ শক্তির হ্রাস ইত্যাদি অন্তর্থে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য ।

ডাইলুশন বিচার । ওষু ক্রমের শুঁড়া ব্যবহার্য্য । ডাক্তার ডানহামের (Dr. Dunham) মতে ৩০ক্রম ব্যবহার্য্য ।

ট্রিলিয়াম্ পেণ্ডুলাম্,-ট্রিলিয়াম্

(TRILLIUM PENDULUM,-TRILL.)

এই গাছের শিকড় দিয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেফকা মর্জ্জা সম্বন্ধীয় বস্ত্রদিয়া ইহা শৈল্পিক ঝিল্লী এবং রক্তবহা কৈশিক নালী (প্রধানতঃ অরায়ূর) গুলি আক্রমণ করিয়া থাকে, বাহার দরুণ অরায়ূ হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

নাসিকা । নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (একন, বেল, ব্রাই, হামামেলিস) ।

মুখগহ্বর । মাড়িদিয়া আপনা আপনি রক্তপড়া বা দাঁত তুলিয়া ফেলার দরুণ মাড়িদিয়া রক্তপড়া (হামামেলিস) ।

পাকস্থলী । পেটে পিটে লাগিয়া যাওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে গরমবোধ ; পাকস্থলী হইতে গলাদিয়া রক্ত উঠা বা রক্তবমন (হামামেলিস, ইপিকাক) ।

মল এবং মলদ্বার । রক্তমাশয়ে মল যখন প্রায় টাট্কা খাটি রক্ত অথবা জলবন্তরল এবং রক্তের ছিটযুক্ত হয় ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের অরায়ূ হইতে রক্তস্রাব ; শেষ রক্তঃ স্রোধের সময় অরায়ূ হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ; রক্ত সাদাটিয়া, ফিকা,

এবং প্রতি দুই সপ্তাহেই রক্তস্রাব হয় ; জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়া এবং কটকট অতিরিক্ত রক্তস্রাব ; সামান্য নড়াচড়াতেই জরায়ু হইতে হঠাৎ পিচ্কারির ষারের জায় উজ্জল লালবর্ণ রক্তস্রাব এবং তৎপর রক্তাল্পতার দরুণ রক্ত ফিকা হয় ; গর্ভস্রাব শীঘ্রই হইবে এরূপ লক্ষণাদি প্রকাশ পায় ; জরায়ু হইতে প্রচুর রক্তস্রাব ; পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ঠাণ্ডা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে রক্তস্রাব ; অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের দরুণ অত্যন্ত অবসন্ন হওয়ার অতিরিক্ত রক্তস্রাব ; সম্ভ্রান্ত প্রসবের পর অনেকদিন ধরিয়া রক্ত বা লোকিয়া (Lochia) নিঃসরণ (কলোফিলাম) ।

স্বাসযন্ত্র । কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলাদিয়া পুঁষ বা রক্ত মিশ্রিত স্লেয়া নির্গমন ; রক্তোৎকাশ (Haemoptysis) (ইপিকাক্) ।

ব্যবহার । জরায়ু হইতে সকল প্রকারের রক্তস্রাবেই উপকারী (কলোফিলাম) । জরায়ু হইতে রক্তস্রাব যখন হামামেলিস এবং মিলিকো-লিয়ামে না থাকে, তখন ট্রিলিয়াম দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । রক্তস্রাবে রক্ত সচরাচর উজ্জল লালবর্ণ এবং পরিমাণে অধিক ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন কুঁচকির সন্ধি খসিয়া পড়িবে, যাহার দরুণ রোগী উক্ত স্থানে কসিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহে ; জরায়ু হইতে রক্তস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলার জায় বেদনা ; কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বেরুপ হয়, আক্রান্ত স্থানের শিরাতে মেরুপ যাতনা, পা এবং পায়ের পাতার সন্ধিতেই যাহা অধিক অনুভূত হয় ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । হামামেলিস্, ইপিকাকিউএনা, জাবা-ইনা, সিকেল্ কর্ণুটাম ।

ডাইলুশন বিচার । ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই । আমেরিকান চিকিৎসকগণ ইহার মূল আরোক ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

বুফো রাণা,-বুফো

(BUFO RANA,-BUFO.)

কটকটরা বেজের বিষধানিরমে সুগার অবস্থিকে মিশাইয়া মিশ্রণ্ডা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই ঔষধ রীতিমত সুস্থ শরীরে পরীক্ষা করা হয় নাই।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি। মস্তিষ্ক এবং কলেক্‌কা মজ্জাস্বকীয় স্নায়ুশুলী দিয়া ইহা নৈতিক জ্ঞান এবং গতি উৎপাদনের সহায়কারী স্নায়ুগুলিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত নিচ প্রকৃতিতে উত্তেজিত করিয়া মনুষ্যকে পশুত্ব করিয়া ফেলে। ইহা মনুষ্যানের ইচ্ছাকে উত্তেজিত করে এবং হস্তমৈথুন করার জন্য রোগী নির্জন স্থানে যাইতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ইহা পুরুষের ধ্বংসজনক উৎপাদন করে। ইহা কথিত আছে যে, যাহাতে জীলোকের সন্তান না হয়, সে অভিপ্রায়ে জীলোকেরা তাহাদিগের স্বামীগণকে এই ঔষধ খাওয়াইয়া থাকে। ইহা মৃগীরোগের ভাব লক্ষণাদি উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব ইহা মৃগীরোগের চিকিৎসায় অনেক ব্যবহার করিয়া থাকেন। যদি স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের সময় মৃগীর আক্রমণ হয়, অথবা মৃগী রোগ যদি হস্তমৈথুন জনিত হয়, তবে এই ঔষধ আরো উপকারী। ডাক্তার লিপির (Dr. Lippe) মতে ভর খাইয়া মৃগীরোগ হইলে এই ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে। যদি মৃগী রোগের আক্রমণের পূর্বে রোগী অত্যন্ত রাগ করে এবং অসংলগ্ন কথা বলে ও তাহার নিকটবর্তী লোকে যদি তাহার কথা না বুঝার দরুন সে অত্যন্ত রাগ করে, তবে এই ঔষধ ব্যবহার্য। ইহা লিম্ফেটিক নালী ইত্যাদি (Lymphatic System) আক্রমণ করে, তাহার দরুন লিম্ফেটিক নালীর গতির সঙ্গে সঙ্গে আঁগা গোড়া নীল বর্ণের স্বাভাবিক বর্তমান থাকে। ইহা সচরাচর কোন প্রকারের বা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা সাজ্যাতিক আকারের ফোকার ভাব ফুসুড়ীতে বিশেষ উপকারী এবং উহা গাল এবং মুখগহ্বর আক্রমণ করিয়া যদি আক্রান্ত স্থান ছিন্ন করিয়া ফেলে, তবে ইহা আরো উপকারী। ডাক্তার আলেনের (Dr. Allen's)

ভৈষজ্যতত্ত্বে বুফোর যে সকল লক্ষণাদি পাঠ করা যায়, তাহার উপর বিশেষ নির্ভর করা যায় না। অতএব এষ্ট ঔষধের অধিক বাহুল্য বিবরণ নিম্নরোজন। ডাক্তার হেল্ (Dr. Hale) বলেন যে, মৃগী রোগে বুফো ব্যবহার করিয়া তিনি কোন ফল পান নাই। ৬, ১২ এবং ৩০ এবং ২০০ ডাইলুশন ব্যবহার্য।

প্লাণ্টেগো মেজার,-প্লাণ্টেগো

(PLANTAGO MAJOR,-GREAT PLANTAIN,-PLANTAGO.)

এই গাছের কাঁচা শিকড় এবং পাতা যথা নিয়মে প্রক্স্পিরিটে তিজিয়া হয়। মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। সুইজারল্যাণ্ডে এই গাছের শিকড় এবং পাতা দস্তশূলে অনেক কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার শিকড় বা পাতা আক্রান্ত পার্শ্বের কানের মধ্যে দিয়া রাখিতে হয়। হোমিও প্যাথিক চিকিৎসকগণ দস্তশূলে ইহার আরোকের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ডাক্তার রুটলিংগার (Dr Reutlinger) বলেন যে, ইহার ২য় দশমিক ক্রমের আরোক সেবনের ১৫ মিনিট মধ্যে দস্তশূল সারিয়া যায়। ডাক্তার হাম্ফ্রিজ্ (Dr. Humphreys) উক্ত মতের পোষকতা করিয়াছেন। ডাক্তার হেল্ (Dr. Hale) উক্ত বিবরণের সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রথমতঃ সন্দেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়ার দক্ষণ উক্ত মতের পোষকতা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, যত রকমের দস্ত শূলের ঔষধ আছে তন্মধ্যে প্লাণ্টেগোর জায় সম উপকারী একটি ঔষধও নাই। ডাক্তার হিউজ্ (Dr Hughes) ডাক্তার হেলের উক্ত মতের পোষকতা করেন। চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দস্তশূলের চিকিৎসায় প্লাণ্টেগোর উপকারীতার বিষয় পাঠ করিয়া লেখক স্বয়ং অনেক রোগীকে উহা দিয়া আশাশূরূপ ফল পান নাই। তবে ইহা দ্বারা যে প্রায় সকল রোগীরই অনেক আশু উপকার দর্শিয়াছে তাহা তিনি অস্বীকার

করিতে পারেন না। কোন কোন চিকিৎসক স্বপ্নে বিজ্ঞানায় প্রস্রাব করার চিকিৎসায় এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। অতিরিক্ত পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। ১ম, ২য়, ৩য় দশমিক ক্রমের আরোকই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাটান্‌হিয়া,-রাটানিয়া,-রাটান্

(RATANHIA, -RATANIA, -RAT.)

এই গাছের শুকনা শিকড় যথা নিয়মে প্রফস্পিরিটে তিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। চক্ষুর সম্মুখে যেন একখানি চামড়া ঝুলিতেছে এরূপ অনুভূত হওয়া এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ দেখিয়া ডাক্তার মেডেন্ (Dr. Madden) ইহা চক্ষুর টেরিজিয়াম্ (Pterygium)* নামক অস্থি বিশেষ ফল পাইয়াছেন। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, চক্ষুর উক্তপ্রকার অস্থি তিনটি তিনটি রোগীর চিকিৎসায় এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল পাইয়াছেন। ইহা সেবনে শুষ্কদ্বারে শুষ্কবোধ এবং হঠাৎ চুরী বিধাইয়া দেওয়ার ভায় বাতনা অনুভূত হয়। এই প্রাকৃতিক লক্ষণটি দেখিয়া ডাক্তার আলেন্ (Dr. Allen) গুহ ফাটা (Fissure of the Anus) আক্রান্ত বোগীর চিকিৎসায় এই ঔষধের ৩য় ক্রমের আরোক ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। টেষ্টি (Teste) বলেন যে, কোমর প্রদেশে কোন প্রকারের কুস্ফী বসিয়া যাইয়া জরায়ুতে বেদনা হইলে রাটান্‌হিয়া সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহার ২য় দশমিক ক্রমের আরোকই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ১ম এবং ৩য় দশমিক ক্রমের আরোকও কখন কখন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

* এই প্রকার রোগে চক্ষুর নাকের নিকটবর্তী কোণ হইতে চক্ষুর গোলাক এবং কণির দিকে পর্দার ভায় পদার্থের সঞ্চার হয়।

এবিস্ নায়গ্রা,-এবিস্ নায়গ্ (ABIES NIGRA,--ABIES-NIG.)

গঁদের জায় পদার্থ দ্বারা যথানিয়মে ইহার আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি । পাকস্থলীর শৈল্পিক কিল্লীর উপরই ইহার কার্য্য প্রবল, যাহার দক্ষণ অঙ্গীর্ণ এবং তজ্জনিত লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে । ইহার গঁদের জায় পদার্থ চুমিয়া পাকস্থলীর মধ্যে একটি সিদ্ধ করা ডিম লাগিয়া রহিয়াছে, ডাক্তার স্টেইন্ট্ ক্লেয়ার স্মিথ্ (Dr. St. Clair Smith) এরূপ অনুভব করিয়া ছিলেন । ইহা দেখিয়া ডাক্তার আলেন্ (Dr. Allen) এবং অন্ত্রাণ্ট চিকিৎসকগণ এই লক্ষণ-ক্রান্ত অঙ্গীর্ণ রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন । ডাক্তার হিউগ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, এক ব্যক্তি বাইসাইকেল্ (Bicycle) হইতে পড়িয়া ঘাইয়া রক্ত বমন করে এবং রক্ত বমনের সঙ্গে সঙ্গে আহার বহা গলনালীর নিম্নাংশের মধ্যে বেন ডেলার জায় কোন একটি পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হইয়াছিল । আর্গিকা দ্বারা তাহার রক্ত বমন থামিয়া গেল । কিন্তু আহার বহা গলনালীতে উক্ত প্রকারের অসুখ বোধ দূরীভূত না হওয়ায়, ডাক্তার হিউগ্ (Dr Hughes) এবিস্ নাইগ্রার ওষু দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবস্থা করা মাত্রই উক্ত অসুখ সারিয়া গেল ।

আকালিকা ইণ্ডিকা,-আকালিফ্-ইণ্ড্

(ACALYPHA INDICA,-ACALYPH. IND.)

কলিকাতাহ ভূতপূর্ব চিকিৎসক ডাক্তার টনিয়ার (Dr. Tonnerre) ইহার মূল আরোক ১০ কোঁটা মাত্রার খাওয়ারে তাহার শুককাশি হইয়া তৎপর স্নেহের সঙ্গে গলাদিয়া রক্ত উঠিয়াছিল । ডাক্তার হলকোম্ এবং ডাক্তার টমাস্ (Drs. Holcombe and Thomas) ফুফুস হইতে রক্তস্রাবে

(Pulmonary hæmorrhage) ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন। ক্লিফটন সাহেবের (Mr. Clifton) মতে ফুফুসের ফোঁটক রোগের (Pulmonary Tuberculosis) দরুণ গলাদিয়া রক্ত উঠার পক্ষে আকালিকার ভায় সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ আছে কি না সন্দেহ। ডাক্তার হেল্ (Dr. Hale) বলেন যে, প্রাতঃকালে গলাদিয়া উজ্জল লাল রক্ত এবং বৈকালে কালচে ডেলা ডেলা বা ধানা ধানা রক্ত উঠা এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধো পরিগণিত। উক্ত চিকিৎসক গণের মতে ৬ হইতে ১২ ডাইলুশন ব্যবহৃত। লেখক যে কয়েকটা যক্ষাকাশাক্রান্ত রোগীর গলাদিয়া রক্তউঠার চিকিৎসায় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছেন, উহার সকলকেই ইহার মূল আরোক ২১০ ফোঁটা মাত্রায় সেবন করাইতে হইয়াছে। ইহার ১ম হইতে ১২ ক্রম পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া কোনও ফল পাওয়া যায় নাই।

আব্‌সিন্থিয়াম্,-আর্টিমিসিয়া। আব্‌সিন্থিয়াম্,-আব্‌সিন্থ্

(ABSINTHIUM,-ARTEMISIA ABSINTHIUM,-ABSINTH.)

সাধারণ ক্রিয়া। স্বাভাবিক মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য এক বিশেষ প্রকৃতির, যাহার দরুণ মৃগী রোগের ভায় লক্ষণ, পেশীর কাঁপনি, পেশীর আক্কেপ এবং তদরুণ উহার একবার প্রসারণ এবং একবার সংকোচন মূখে ফেণাউঠা, অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মল এবং শুক্র নিঃসরণ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব এবং কালনিক দৃষ্ট দেখা ও কসেবকা মজ্জা এবং মস্তিষ্কে রক্তাবরোধের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। মেডালা অব্‌লংগেটাই (Medulla Oblongata) উক্ত লক্ষণাদি দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রকারান্তরে শরীরের পরিপোষণের সহায়কারী যন্ত্রের উপরও ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ প্রথমতঃ কৃথা বা রুচির বৃদ্ধি হয়, পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি হয়, রক্ত সকালন ক্রিয়া সতেজ হয়, শরীরের স্বাভাবিক নিঃসরণের কতক পরিমাণে বৃদ্ধি হয় এবং কতককাল পর উহার

সমুদ্রই বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অজীর্ণ রোগ এবং তজ্জনিত অস্বাস্থ্য লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে । তরুণাবস্থার ইহার কার্য্য অনেকটা হ্রাস জ্ঞায় । পুরাতনাবস্থায় ইহার কার্য্যের ফল অধিক অনিষ্টকর বা প্রথর ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অতি অল্প কাল হইল যে ঘটনা ঘটয়াছে তাহাও ভুলিয়া যাওয়া ; উন্নত ; নির্কোষ এবং গম্ভীর জ্ঞান ভাব ; অল্প লোকের সঙ্গে কোনও কার্য্য করিবার অনিচ্ছা ; ভয়ানক দৃষ্ট দেখা (ওপিয়ারাম্) এবং তদ্ব্যপাদক কাল্পনিক ভয় ; (আনাকাড্, কানাবিস্-ইণ্ড, হায়োস্, ট্রামন্) ; অর্দ্ধজ্ঞান রহিততা (Stupor) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে তদ্ব্যপাদক প্রলাপ, অচেতনতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্কেপ (Convulsions) ।

মস্তক । মাথাঘোরা ; মাথায় গোলমেলে বোধ ; মাথা নিচু করিয়া শুইবার ইচ্ছা ; মস্তিষ্ক এবং কপেরকা মজ্জার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ।

চক্ষু । চক্ষুর যোন্ধক ঝিল্লী লালবর্ণ ; চক্ষের মধ্যে বেদনা এবং চুলকানি ; চক্ষুর পাতায় ভারিবোধ (কষ্ট, কোনায়াম্, নেট্রাম্-কার্ক) ।

কর্ণ । কান দিয়া পূঁবাঙ্গি নিঃসরণ ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল নির্কোষের জ্ঞায় ; মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য (একন্, বেল) ; মূগীরোগের জ্ঞায় মুখে পোঁটা এবং গ্যাঙ্গ্‌লা উঠা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মাড়িতে মাড়িতে দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকা (সিকুটা, ইগ্‌নেস্, হায়োস্, নাক্স-বম্) ; মূগীরোগের জ্ঞায় জিহ্বা কামড়ান ; জিহ্বা পুরু এবং মুখের বাহির হয় ও তদ্রূপ কথা বলিতে অশক্তি ; জিহ্বা কাঁপে এবং গলগাঘাতের জ্ঞায় অবশ বলিয়া অরুচুত হয় ; পুড়িয়া গেলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে দেরূপ ঘাতন ।

পাকস্থলী এবং উদর । অকুণ্ঠ বা অরুচি ; আহারে অনিচ্ছা ; আহার দ্রব্য যেন পাকস্থলীতে ভারি হইয়া থাকে, যাহার দরূপ মনে হয় যেন উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি হজম হইবে না (আস্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, সিটাস্, কল্‌চ) ; পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা এবং কষ্টবোধ ; উপার উঠা ; বমনোদ্বেষ ; বমন ; বমনোদ্বেষ যাহা যেন যকৃতের পিত্তাধারে কোন

অল্পখের দ্রুণ উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়; পাকস্থলী অত্যন্ত উত্তেজিত এবং উহাতে অল্পখ বোধ। মনে হয় যেন প্লীহা এবং বৃক্কত স্থীত হইয়াছে; পেট যেন ঠোঁশ মারিয়া থাকে; উদরে অধিক দূষিত বায়ুর (Flatulence) লক্ষ্য (কার্কো-বেজ, চায়না, লাইকোপ্, সাল্ফ)।

মূত্রযন্ত্র । অনবরত প্রস্রাব করার ইচ্ছা; মূত্রগাঢ় কমলালেবুর মতের স্থায়, উগ্র গন্ধযুক্ত (বেজ-আন্), ঘোড়ার মূত্রের স্থায় (নেট্রাম্-কার্ক, নাটিক্-আন্)।

স্ত্রী জননেদ্রিয় । ডাইন ডিম্বকোষে ছুরি বিধানের স্থায় বাতন্য (এপিস্); মূত্রিকা-পাণুরোগ (ফেরাম্, হেলোনিয়াম্)।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎপিণ্ডের কম্পন পৃষ্ঠদেশ পানে অধিক অল্পভূত হয়; হৃৎপিণ্ড দপ্‌দপ্ করে, যাহার শব্দ স্বক্কারিত ও শুনা যায়।

বাবহার । মস্তিষ্ক, মেডালা অবলম্বেটা এবং মেরুদণ্ডের রক্তা-দিক্য বা রক্তাবরোধ; চক্ষুর যোজক ঝিল্লীর শৈথিল্য প্রদাহ (Catarrhal Conjunctivitis); বৃক্কত এবং প্লীহাব বিবৃদ্ধি; অল্পে দূষিত বায়ু আটকাইয়া শূল বেদনা (Flatulent-colic); মৃগীরোগের স্থায় আক্ষেপ; অজীর্ণ রোগ; মূত্রিকা পাণুরোগ; কোরিয়া (Chorea); নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া জাগরিতের স্থায় আপন কার্যাদি করা (Somnambulism); শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের মৃগীরোগের স্থায় আক্ষেপ বা দাঁত উঠার সময় আক্ষেপে আবিস্থিয়াম্ বিশেষ উপকারী বলিয়া চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। রোগের আরাম হওয়ার পূর্বে প্রচুর তর্কযুক্ত ঘর্ম হওয়া এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক নিদ্রিষ্ট লক্ষণ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । পায়ের পাতা অত্যন্ত ঠাণ্ডা; মৃগী রোগের আক্রমণের স্থায় হঠাৎ পড়িয়া বাইয়া অজ্ঞান হওয়া, আকৃতি বিকৃত হওয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষেপ, মুখে রক্ত মিশ্রিত ফেনা এবং জিহ্বা কামড়ান (সিকুটা) ও তৎপর অত্যন্ত তর্কল হইয়া পড়া; মূত্রিকারের স্থায় শরীর পশ্চাৎ দিকে বাকিয়া পড়া; দাঁতে দাঁতে কড়মড় শব্দ করা এবং তৎপর অর্দ্ধ চেতনাবস্থায় থাকা (নাক্স-বম্, ওপিয়াম্); আত্যন্তিক যন্ত্রের পক্ষাঘাত; যুবা বয়স।

সুস্ফুগ বিশিষ্ট ঔষধ । আর্টিমিসিয়া বা লংগারিস্‌, আব্রোটে-
নাম্‌, হুয়া, বেলাডোনা, ক্যামোমিলা, হায়োসায়েরনাম্‌, ট্র্যামোনিয়াম্‌ ।

ডাইলুশন বিচার । ইহার মাত্রা সযত্নে লেখক কিছুই বলিতে
পারেন না, কারণ, তিনি ইহা কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।

আসিটিক্‌ আসিড্‌, -আসিট্‌-আস্‌

(ACETIC ACID, -ACET. Ac.)

সাধারণ ক্রিয়া । শৈথিল্যক ঝিল্লীর উপরের অংশের উপর ইহার
কার্য অতি প্রবল, যাহার দক্ষণ উক্ত ঝিল্লীগুলি উত্তেজিত ও প্রদাহযুক্ত হয়
এবং উহার স্বাভাবিক নিঃসরণ বৃদ্ধি পায় । বাহ্য প্রয়োগে ইহা উত্তেজক এবং
বারক (Stimulant and Astringent) ঔষধের ভাষ্য কার্য করে ও যে
স্থানে প্রয়োগ করা যায়, উহাতে কষ্টিক্‌ (Caustic) ইত্যাদি ঔষধের ভাষ্য
ইহার কাল, পচা এবং কঠিন বা উৎপাদন করিবার শক্তি আছে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মানসিক অবসন্নতা এবং চিন্তাবোধ ; মানসিক উত্তেজনা
(ব্রাই, কাম্‌, নাক্স-বম্‌) ; পর্যায়ক্রমে অর্ধজ্ঞান রহিততা (Stupor)
এবং প্রলাপ (Delirium) ।

মস্তক । মাথায় ভারিবোধ এবং ঘৃণ্ণাশ্বে বেদনা ; তামাক্‌,
মদ্য, আফিম বা কাফির অপব্যবহার জনিত মাথাধরা (ইগ্নেন্স, নাক্স-বম্‌) ।

নাসিকা । বারবার বা ঘন ঘন সর্দি লাগা ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল চিন্তাযুক্ত, পাগলের ভাষ্য, গাল উষ্ণ এবং
আরক্ত (একন্‌, বেগ্‌) ; জরের সময় বাম গাল অত্যন্ত লালবর্ণ ; মুখ
মণ্ডল কিঁকি বা শিটা, মোমের ভাষ্য এবং রুধি ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতে যেন কোন শক্তি থাকে না ;
মুখে দুর্গন্ধ (আস্‌, নাক্স-বম্‌) । শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণ অতি
কষ্টে এক চাম্‌চা জল গিলিতে পারে ।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত পিপাসা, বমনোবেগ এবং বারম্বার বমন (আস্, ইপিকাক্, আন্টি-টার্ট্) ; পাকস্থলীস্থ জ্বালাদি যেন ফুটিতেছে এরূপ অনুভূত হয় ; পাকস্থলী এবং বকের মধ্যে জ্বালা যুক্ত প্রবল যাতনা এবং তৎপর শরীর ঠাণ্ডা এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম । উদর ক্ষীত ও বিস্তৃত এবং শূল বেদনার ভায়ে বেদনা ।

মূত্র । উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পারের পাতার ক্ষীতি (বিশেষতঃ বক্ষাকাশাক্রান্ত রোগীগণের) ; উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শূল বেদনার ভায়ে বেদনা এবং উদরে টাটানি ; রক্তভেদ (আস্, হামা-মেলিস্, নাইটিক্-আস্) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র পরিমাণে বৃদ্ধি হয় (ফস্-আস্) ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুনলের উপরিভাগে উত্তেজনা (হিপ্-সাল্ফ্, ক্যালী কার্ব্, স্পঞ্জ) ; বায়ুনল এবং উহার উপরি ভাগ ঘূড়ী কাশির ভায়ে ফাইব্রিন্ বিশিষ্ট (Fibrinous) পদার্থ দ্বারা আবৃত (ব্রোমিন্, ক্যালী-বাই) ; গলার মধ্যে হিম্ হিম্, ঘড়্-ঘড়্ শব্দ হওয়া ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । গা এবং পারের পাতার শোথের ভায়ে ক্ষীতি (আস্, এপিস্) ।

জ্বর । চর্ম্ম শীতল (ক্যাস্কার) ; ঘৃণ-বুণে জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিতে ঘর্ম্ম (সাল্ফ্) ; প্রচুর ঘর্ম্ম (চারনা) ।

ব্যবহার । শিরঃপীড়া ; নাক দিয়া রক্তপড়া ; ফুফুস্, পাকস্থলী, অস্ত্র এবং জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ; অজীর্ণ রোগ ; উদরাময় ; ঘূড়ী কাশি ; সার্বজনিক শোথ এবং শোথ ঘটিত বা শোথ সম্বলিত অস্থি ; প্লাম্বাদি রসক্ষয় হেঁহু জ্বর বা হেকটিক্ ফিবার (Hectic Fever) ; আগ্নিক জ্বর বা জ্বরবিকার ; শুক্রক্ষরণ (Spermatorrhœa) ; পোড়া ঘা ; কীটাদির কামড়, জট বা জড়ুল (Noevi) ; আঁচিল ; কড়া (Corns) ; কর্কট রোগ ইত্যাদি অস্থখে আন্টিটিক্ আসিড্ ব্যবহার্য্য । কর্কট রোগের পক্ষে 'আন্টিটিক্ আসিডের ভায়ে সম উপকারী ঔষধ নাই ইউরোপ এবং আমেরিকাহ্ অনেক চিকিৎসক এরূপ বিশ্বাস করেন ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । আক্ষেপ, পাগলের ভায়ে লাকান

এবং হামা দেওয়া ও যাতনায় চীৎকার করা; শরীর রুগ্ন (আস্, ফেরাস্, আর্দোড্, গ্রাক্, নেট্রাম্-মিউর, ফস্); চন্দ্র শিটা এবং মোমের জ্বাশ; সার্বাস্থিক শোথ এবং শোথজনিত অস্থখ (আস্); শরীরের মধ্য এবং বহির্দেশে জ্বালা ইত্যাদি আসিটিক্ আসিডের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

প্রতিষেধক ঔষধ। অধিক মাত্রায় বিবাক্ত হইলে তরল মাগ্নে-সিয়া; চূনের জল ব্যবস্থা। এতদ্বিত্ত টেবেকাম্, একোনাইট্, নেট্রাম্-মিউরি-য়াটিকাম্ এবং সিপিগা সেব্য।

ডাইলুশন বিচার। ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না। কাবণ, তিনি কেবল ৫।৬ টী বোগীব চিকিৎসায় ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। কর্কট রোগের চিকিৎসায় আদত আসিটিক্ আসিড্, ১ ফোঁটা মাত্রায় অধিক পরিমাণ জলে মিশাইয়া সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

আম্ব্র। গ্রিসিয়া,-আম্ব্র।

(AMBRA GRISEA,-AMB.)

যথানিয়মে সুগার অব্ মিক্ মিশাইয়া ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। স্নায়ুগুণীর উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাঁহার দরুণ উক্ত মণ্ডলীর উপরের অংশের কার্যের বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা স্ত্রী জননেদ্রিগই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে, যাঁহার দরুণ উক্ত যন্ত্রাদি উত্তেজিত হইয়া অনেকানেক স্বাভাবিক এবং হিষ্টিরিয়া রোগের জ্বাশ লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাৰ গন্ধ মৃগনাভি, রেড়ির তৈল এবং বেণিবিয়ানের জ্বাশ অভ্যস্ত ভীত এবং ভদ্ররুগই গলায় মধ্য হইতে থক্ থক্ করিয়া স্লেয়া বাহির করিবার সময় রোগী ফাঁপড় হয় এবং বমন নিবারণ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে; যল তরলই হউক, আর

কতিনই হউক, মলত্যাগের সময় কোষ্ঠপাড়িতে হয়; বারম্বার প্রচুর পরিমাণে ফিকা মূত্রত্যাগ, জ্বী মহবাসের ইচ্ছার কতক পরিমাণে উদ্ভেজনা এবং জ্বীলোকের যোনির উত্তেজনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত রোগীর মানসিক অবসন্নতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের উদ্বেগ, নিদ্রাশূন্যতা এবং তদ্রূপ শ্রবণ ও দৃষ্টির হ্রাস, শ্বাসরোধক আফেপিক কাশিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ডাক্তার লরেন্স্ নিউটান্ (Dr. Lawrenco Newton) লিখিয়াছেন যে, একটা জ্বীলোকের সন্তান প্রসবের পর কোষ্ঠ বন্ধে তিনি এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। স্নায়বিক মাথা ঘোরাতেও ইহা বিশেষ উপকারী। যোনিতে চুলকানি বিশিষ্ট কুসুড়ীতে ডাক্তার গারেন্সির (Dr. Guerenzy) মতে ইহা বিশেষ উপকারী। রক্তশ্রাবের সময় সামান্য রাগ হইলেই রক্তশ্রাব বৃদ্ধি হওয়া, ডাক্তার গারেন্সির মতে, এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । স্মরণশক্তির হ্রাস বা দুর্বলতা (অনাকাউ, ফ্রিয়াজ, ল্যাক্, মার্ক্, নেট্রান্-মিউর, নাক্স-গক্); কোন বিষয় সহজে বুঝিতে অশক্তি; চিন্তা করিবারে অশক্তি (জেল্‌স্, নাক্স-বম্, ফস্); শুক্রবায়ু (Molancholia); সন্ধ্যার সময় মনের অত্যন্ত উদ্বেগ; উত্তেজিত ভাব; নানা বিষয়ে চিন্তা; কথা বলিতে (জ্বীলোকের) ক্লান্তিবোধ; রাত্রিতে ঘুমাইবারে অশক্তি।

মস্তক । মাথাঘোরা এবং পাকস্থলীতে দুর্বলবোধ হওয়ার দরুন শুইয়া থাকিতে বাধা হওয়া, কপালের বামপার্শ্ব হইতে মাথার ঠিক উপরিভাগ পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলার ভায় বেদনা এবং কপালের ডাইন পার্শ্বের উন্নত স্থানে উক্ত প্রকারের বেদনা; মাথার ঠিক উপরিভাগে ছিঁড়িয়া ফেলার ভায় অতি কষ্টদায়ক বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল শিটা এবং বাম হাতের পাতা ঠাণ্ডা; মাথার পশ্চাৎভাগে চিমা এবং গোলমলে বোধ; বাদ্যের শব্দে মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয়; মাথায় চুল পড়িয়া যাওয়া (গ্রাক্, হিপ্-সাল্‌ফ্, নেট্রান্-মিউর, ল্যাক্, ফস্, সিন্‌পিয়া)।

চক্ষু । অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে চক্ষু বুজিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ বেদনা

বা যাতনা ; চক্ষে চাপাবোধ ; চক্ষের পাতার চুলকানি, বাহার দ্রবণ মনে হয় যেন চক্ষে অঞ্জনী (Stye) হইবে ।

কর্ণ । অপরাহ্নে কানের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া ; বান্দ্যের শব্দে কাণির বৃদ্ধি এবং মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (একন্) ; কানেন কম শুনা ।

নাসিকা । অতি প্রভাবে নাক দিয়া রক্ত পড়া (আপারিকান্, জাই) ; নাকের মধ্যে শুকনা রক্ত সঞ্চিত হওয়া ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলে দম্কা উচ্ছাস্তব ; মুখমণ্ডল কামল রোগের জ্বায় হরিদ্রাবর্ণ (চেলিডন্, ক্রোটন্, পডোফ্) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখে ছুর্গন্ধ (আর্গিকা, হিপ্-সাল্‌ফ্, আয়োড্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, নাক্, ফ্রিয়াজ্) ; দাঁতে কসিয়া ধরায় জ্বায় বেদনা বা যাতনা । গলার মধ্যে ধূসরের আভাযুক্ত স্লেথায় জ্বায় পদার্থ সঞ্চিত হওয়া, বাহা তুলিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে ছাল উদ্ভিবা যাওয়ার জ্বায় যাতনা ; দমকা বাতাস লাগিয়া গলার মধ্যে বেদনা (বেল্) ; গলার মধ্য হইতে ডাইন কান পর্যন্ত মুচী বিধানের জ্বায় যাতনা (ল্যাক্), জিহ্বা সঞ্চালনেই বাহা অধিক হয় ; গল-নালীর উপরিভাগের উপরাংশে ছাল উদ্ভিবা যাওয়ার জ্বায় যাতনা ।

পাকস্থলী এবং উদর । বারম্বার কাঠ উল্গার উঠা (কার্কো-বেজ্, নাক্স-বম্, ফস্, সাল্‌ফ্) ; বুক জ্বালা এবং উল্গার উঠা বন্ধ হওয়া (অাস্) ; পাকস্থলী এবং উদরের দুই পার্শ্বে চাপাবোধ ; প্রতিদিন সন্ধ্যায় সময়ই মনে হয় যেন পেট খারাপ করিয়াছে এবং গলা দিয়া ওগা উল্গার উঠা । উদরে ঠাণ্ডাবোধ (এথুজা, ক্যান্ডার) ; উদরের এক পার্শ্বে ঠাণ্ডা-বোধ ; বক্রত প্রদেশে কনু কনানি ।

মল । বারম্বার বাস্তের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না (নাক্স-বম্) বাহার দ্রবণ রোগী (জ্রীলোক) চিস্তাযুক্ত হয় ; মলত্যাগের সময় অজ্ঞ লোক সম্মুখে থাকিলে রোগী অত্যন্ত বিরক্ত হয় ; কোষ্ঠবদ্ধ (আলান্, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, ফস্) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রত্যাগের সময়ও মূত্র ধোঁয়াটিয়া থাকে এবং উহাতে

কটার আত্মগুক্ত তলানি পড়ে ও তলানীর উপরের মুখ স্বচ্ছ এবং হরিত্রাবর্ণ থাকে (আস্) ; রাত্রিতে বারম্বার প্রস্রাব করা (বোরাজ্, কন্-আস্) ।

স্রী জননেন্দ্রিয় । যোনির ভ্রমণক অনিবার্য চুলকানি (ক্যাহ্, ক্রিয়াজ্, মার্ক্, সাল্ফ্), যাহার দরুণ রোগী যোনি সজোরে চুলকাইতে বা রগড়াইতে বাধ্য হয় (ক্রিয়াজ্) ; যোনিতে টাটানি এবং চুলকানি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে যোনির লেবিয়া (Labia) নামক অংশের ক্ষীতি ; উদরের উপর চাপ দিলে বা নিশ্বাস টানিলে ডিম্বকোষ প্রদেশে স্রুটিবিধানের স্রাব বাতনা ; রক্তস্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তস্রাব (ক্যাক্ট্) ; মলত্যাগের সময় সামান্য কৌথ পাড়িলে বা চলিয়া বেড়াইলে যোনিদ্বার দিয়া রক্ত স্রাব ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব (আলোজ্, আমন্-কার্ব্, ক্যাক্-কার্ব্, নাক্স-বম্) ।

আময়ন্ত্র । অত্যন্ত প্রবল আক্ষেপিক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার উদগার উঠা এবং স্বরভঙ্গ ; গলাব মধ্যের উত্তেজনার দরুণ কাশি, যাহা রাত্রিতেই অধিক হয় (হারোস্) ; প্রতি দিন সন্ধ্যার সময় কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাম পার্শ্বের পাজিরার হাড়ের নীচে বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন উক্ত স্থান ছিঁড়িয়া ঢল্‌ঢলে হইয়াছে ; হৃদি কক্ষ, থাকিয়া থাকিয়া যাহার উল্লেখ হয়, কিন্তু নিশ্বাস টানিবার সময় গলার মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয় ; গলাদিয়া অত্যন্ত লোন্‌তা স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন (কার্কো-বেজ্, লাইকোপ্, ফস্, সিলিয়া) ; বৃকে চাপাবোধ ; বৃকের মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার স্রাব অমূল্য হয় (ফস্, ক্রমেজ্) ; বৃকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হওয়া ; জ্বপিতে অত্যন্ত যাওনা, যাহার দরুণ স্বাস কষ্ট ও দম্বকা উচ্চাশ্রুত হয় ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । বায়বীয় সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলার স্রাব বেদনা ; হাতের আঙ্গুলে কসিয়া বা টানিয়া ধরার স্রাব বাতনা । পায়ে ভারিবোধ ; প্রায় প্রতি রাত্রেই পায়ের ডিমে' এবং পায়ের বিল ধরা (সাল্ফ্) ; পায়ের পাতার তলার মধ্য দিকের প্রান্তে চুলকানি ।

নিদ্রা । অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল না হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত চিন্তা উৎপাদক স্বপ্ন দেখা ।

ব্যবহার। স্নায়বিক এবং হিষ্টিরিয়া জনিত অস্থব, যথা হাঁপানি কাশি, আক্কেপিক কাশি, হপিংকফ, যুনির চুলকানি, ডিম্বকোষ প্রদাহ, পুরুষ সহবাসের অভ্যস্ত ইচ্ছা বা কামোদ্ভূততা, জিহ্বার নীচে আবেয় জায় ক্ষীতি (Ranula) ইত্যাদি অস্থবে আঙ্গাস্টুরা গ্রিসিয়া ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সামান্য পরিপ্রমেই বর্ষ (সিপিয়া, সাইলিনি); শরীরের পেশী বিশিষ্ট অংশে আক্কেপ এবং স্পন্দন (আগারিকাশ, দিকুটা); বাহ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সহজেই ঝিঁ ঝিঁ ধরে; অত্যন্ত দুর্বলতা এবং গা মাটি মাটি করা (আর্স, চায়না); প্রাতঃকালে, স্নাত্তিতে, উষ্ণ দ্রব্য পানে, উষ্ণ ঘরে, উচ্চঃস্বরে পড়িলে বা কথা বলিলে, শুইয়া থাকিলে, বাদ্যের শব্দে অস্থথের বৃদ্ধি এবং আহ্বারের পর, ঠাণ্ডা বাতাসে, ঠাণ্ডা দ্রব্য আহ্বারে বা পানে অস্থথের উপশম ইত্যাদি আঙ্গাস্টুরা গ্রিসিয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। বৃদ্ধ বয়সে, শিশু ও ছোট বালিকা, স্নায়বিক, কৃষাঙ্গ বিশিষ্ট, পিত্তাদিক্য ধাতুতে বিশেষ উপকারী।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। আর্সিনিক, আনাকিটিডা, ক্যাকেরিয়া কার্বোনিকা, ককিউলাস, কফিয়া, ইগ্নেসিয়া, লাইকোপডিয়াম, মকাশ, নাক্স-বমিকা, ফফুরাস, পাল্‌মেটো, সিপিয়া, ষ্টাকিসেগ্রিয়া, বেলেগিয়ান।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, কফিয়া, নাক্স-বমিকা, পাল্‌মেটো, ষ্টাকিসেগ্রিয়া।

ডাইলুশন বিচার। হানিমান ইহার ৩য় ক্রম ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। মার্সি (Marcy) মতে ৬ এবং ১২ ডাইলুশন ব্যবস্থা। এই ঔষধ দ্বারা যত রোগীর চিকিৎসা করা গিয়াছে, উহার সমুদয় রোগীকেই লেখক ৬ষ্ঠ ক্রম সেবন করাইয়া যথোচিত ফল পাইয়াছেন।

আঙ্গাস্টুরা বিরা,-আঙ্গাস্ট.

(ANGUSTURA VERA,-ANGUST.)

যথানিয়মে ইহার আরোহ এবং শুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি। মস্তিষ্ক এবং কসেরক

মজ্জার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দরুণ ধনুষ্ঠকারের জায় আক্ষেপ হয়, কিন্তু উহাতে চেতনার কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। শরীরের পরিপোষণের সহায়কারী বস্তুর উপর ইহার কার্য অনেকটা সিক্কোনার জায়। যে যে স্থানে এই গাছ জন্মে, সে সকল স্থানে ম্যালেরিয়া (Malaria) জনিত সবিরাম এবং স্নায়বিরাম জরে ইহা সিক্কোনা বা কোইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ধনুষ্ঠকার, হৃৎপিণ্ডের আক্কেপিক অস্থখ; মুখমণ্ডলের বেদনা বা স্নায়ুশূল (Prosopalgia); হৃৎপিণ্ডের হ্রস্বলতা; হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি সম্বলিত হৃৎপিণ্ডের বিরুদ্ধি; আক্ষেপ, অসাড়ি বা অনিচ্ছাপূর্বক বা বিছানার বা স্বপ্নে প্রভাব করা; গতি উৎপাদক স্নায়ুর যেপ্রকার অস্থখের দরুণ পক্ষা-ক্ষাত হয়, তাহাতে আঙ্গাঠুরা ব্যবহার্য। ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা কখনও স্বয়ং ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। ফার্মাকোপয়ার মতে ইহার গুঁড়া, আরোক অপেক্ষা অধিক উপকারী।

আসিডাম্ বেঞ্জোয়িকাম্,-বেঞ্জোয়িক্ আসিড্,-বেঞ্জ-আস্

(ACIDUM BENZOICUM,-BENZOIC ACID,-AC. BENZ.)

কোন এক বিষমত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত বেঞ্জোয়িক্ আসিড্ ক্রয় করিয়া যথানিয়মে রেকটাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার মিশ্র আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথানিয়মে সুগার অব্ মিকে মিশাইয়া ইহার মিশ্র গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মূত্রবদ্ধ, শক্তি এবং শরীরের অংশাল অংশের উপরই ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্র গাঢ় লালবর্ণ করা এবং মূত্রে অত্যন্ত উগ্র গন্ধ উৎপাদন করা এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বায় আব্‌ড়ু, খাব্‌ড়ু, ঠুহু

নিচু, ফাটিবিশিষ্ট বিস্তৃত আকারের ঘা। গলার মধ্যের উপরিভাগ এবং টনসিল্ প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা, ক্ষত এবং টাটানি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র অত্যন্ত গাঢ় লালবর্ণ।

মল । শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের উদরাময়; প্রচুর পরিমাণে জলবন্তরল, সাদাটিয়া বা ফিকা, দুর্গন্ধযুক্ত, দুর্বলকারক উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র গাঢ় লালবর্ণ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র গাঢ় লালবর্ণ এবং অত্যন্ত উগ্র গন্ধযুক্ত (নাইট্রিক্-অ্যাসিড); মূত্র অত্যন্ত কাল গুণবিশিষ্ট, উগ্র দুর্গন্ধযুক্ত (অ্যাসিড, অ্যাস্পার); বাম মূত্রকোষে টাটানি, উৎসাহিত এবং জালাযুক্ত যাতনা; মূত্রের তলানিতে ফস্ফেটসের সঙ্গে দানাযুক্ত শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে; মূত্র কালচে লালের আভাযুক্ত কটাবর্ণ; প্রতিক্রিয়াতে মূত্র টক এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়; মূত্র-ভ্যাণের আভ্যন্তরিক কালে মূত্রাধারে সঞ্চরমান বেদনা; প্রমেহরোগ, পাথরী অথবা ক্ষুদ্র সন্ধিবাত রোগের অবরোধ হেতু মূত্রনালী ইত্যাদির শৈথিল্যিক রোগ।

জননেন্দ্রিয় । গুপ্ত প্রমেহরোগ; অনেক কালের পুৰাতন আকারের প্রমেহ রোগ (Gleet) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত মূত্রতাগ।

কাশি । কাশিতে কাশিতে গলাদিয়া সবুজ শ্লেষ্মা নির্গমন।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশে, মূত্রকোষ প্রদেশের উপর, ঘৃশ্-ঘৃশ্ বেদনা এবং কোমরে বেদনার দরুণ কোমর শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনা।

নিম্নাঙ্গ । ডাইন হাঁটু ক্ষীত; পায়ের সমুদয় অংশেই ক্ষতের আঘাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকোষে বেদনা; চলিবার সময় হাঁটুতে গুরুবোধ এবং তদ্রূপ হাঁটুতে কেড়-কেড়, মট্-মট্ শব্দ হওয়া; উভয় হাঁটুতেই বেদনা; পায়ের পাতার অস্থি সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলা বা স্থগীর্বিধানের আঘাত বেদনা বা যাতনা, পায়ের বন্ধাস্থলীর ক্ষুদ্র হাড়ের সন্ধিতেই বাহ্য অধিক অন্তর্ভূত হয়; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত বা গাউট্ (Gout) জনিত হাঁটুর সন্ধিতে পাথরী বা পিরার আঘাত ক্ষীতি।

ব্যবহার । মুগংহ্বর এবং জিহ্বায় ঘা; টনসিল্ প্রদাহ (Tonsil-

itis); হাঁপানি কাশি; শিশুগণের উদরাময়; মূত্রকোষের প্রদাহ জনিত শূলবেদনা (Nephritic colic); বৃদ্ধ বয়সে মূত্র কুচ্ছ বা মূত্র-বরোধ; শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের অনিচ্ছাপূর্বক বা অসাড় মূত্রত্যাগ (বিছানায় প্রস্রাব করা); প্রমেহ রোগ অবরুদ্ধ হওয়া; পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ (Gleet); সন্ধিবাত(Articular Rheumatism); ক্ষুদ্র সন্ধিবাত বা গাউট (Gout); বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সন্ধিবাত জনিত সন্ধি প্রদাহ (Rheumatic and gouty arthritis); কোপেইবার অপব্যবহার জনিত অস্থি ইত্যাদি অস্থিতে বেজোয়িক আসিড্ ব্যবহার্য্য। উক্ত সমুদয় অস্থিতেই মূত্র উগ্র গন্ধবৃদ্ধ ও গাঢ় লালের আভাবুক্ত কটাবর্ণ হওয়া আবশ্যক। ডাক্তার গারেন্সি (Dr. Guerseny) বলেন যে, মূত্রের রঙ্গ অপেক্ষা গন্ধ (যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) এই ঔষধ ব্যবহারের বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শ্রান্তিবোধ এবং গা মাটি মাটি করা (চায়না); বেদনা যাতনাদি একস্থান হইতে অত্র স্থানে হঠাৎ সরিয়া পড়ে (ক্যালী-বাই, গেডাম্, পাল্‌স্); অস্থির লক্ষণাদি শরীরের বাম পার্শ্ব হইতে ডাইন পার্শ্বে এবং নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে (বিশেষতঃ বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সন্ধিবাতে) বিস্তৃত হয়। বাত বা গাউট, গরমীর ব্যারাম বা প্রমেহ রোগাক্রান্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। নাইট্রিক আসিড্, পাল্‌সেটিল।

ডাইলুশন বিচার। আদত বেজোয়িক আসিডের ৬৬ গ্রেইন হইতে ৩২০ মিলিমিক্রম পর্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ৬, ১২ এবং ৩০ ক্রমও ব্যবহৃত হয়।

ক্লিমেটিস্ ইরেক্টা,-ক্লিমেটিস্

(CLEMATIS ERECTA,-CLEMAT.)

এই গাছের পাতা এবং পাতার নিকটবর্তী কোমল ডাঁটা যথানিয়মে প্রফ্‌লিশিয়েটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । হানিমান বলিয়া গিয়াছেন যে, “পায়ার অপ-
ব্যবহার জনিত যে সকল অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সোরা (Psora) এবং মাথা ও
শরীরের অন্তর্ভুক্ত অংশে খারাপ রকমের যা থাকে, এবং মূত্রবস্ত্রের অস্থব্বজনিত
মূত্র নালীর সংকোচন ও অপ্রশস্ততা (Stricture of the Urethra) ও চক্ষুর
নানা রকমের কষ্টদায়ক প্রদাহ বর্তমান থাকে, তাহা এই ঔষধ প্রয়োগে
আরাম হয়।” তিনি আরো বলিয়া গিয়াছেন যে “প্রমেহ রোগে কুচিকিৎ-
সার পর একশিয়া (Orchitis) এবং অণ্ডকোষের প্রদাহ ও কঠিনতার
চিকিৎসায়, ষ্টাফ্ (Staff) এই ঔষধে বিশেষ উপকার পাইয়া গিয়াছেন।” চর্ম,
লিম্ফেটিক্ প্রকৃতি, জননেত্রির ও মূত্র বস্ত্রের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথার পশ্চাত্তাগে, ফুসুড়ী (লাইকোপ্, পিটোল্,
সিপিয়া) যাহা বড় পর্যাপ্ত বিস্তৃত হইয়া ক্ষত হয় এবং উহাতে হানি দেও-
য়ার ভায় হুড়্ হুড়্ করে, ও ছল্ ফুটানের ভায় চুলকার, বাহাতে অনেক
সময় শুকনা আঁইশের ভায় মামুড়ী (চুমটী) পড়ে, শয়ন করার পর বিছানার
উচ্চতাতে যাহার বৃদ্ধি হয় (মার্ক্), চুলকাইলে কতকক্ষণের জন্ত চুলকানির
কতক পরিমাণে উপশম হয়।

কর্ণ । কানের জালাযুক্ত যাতনা এবং উকাহুতব।

চক্ষু । চক্ষু প্রদাহ; চক্ষের মধ্যে ছাল উঠিয়া বাওয়ার ভায় জালা
এবং চিড়িক মারা।

মুখগহ্বর । দন্তশূল, বিছানায় সোজা হইয়া শুইয়া থাকিলে যাহার
বৃদ্ধি হয় এবং ঠাণ্ডা জল লাগিলে, ঠাণ্ডা বাতাস নিশ্বাস দ্বাৰা টানিলে, অঙ্গ-
সমস্তের জন্ত যাহার উপশম হয় (বিশ্রাম্, কফিয়া); বিছানার উচ্চতাতে দন্ত-
শূলের বৃদ্ধি (মার্ক্); কুটির ছিল্কা থাইলে দন্তশূলের বৃদ্ধি।

উদর । কুঁচকি প্রদেশে টাটানি; কুঁচকি প্রদেশের ক্ষতি এবং
কঠিনতা (বাগ্গি) (ক্যাল্-ক্-কার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্) এবং উহার সঙ্গে উক্ত
প্রদেশে কুট্ কুট্ করা বা কাটা বিধানের ভায় যাতনা।

মল । কোষ্ঠবদ্ধ (আলাম্, ব্রাই, ক্যাল্-ক্-কার্ক্, নাজ্-বম্, ওপিয়াম্।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র নির্গত হইতে হইতে মূত্র নির্গমন বারবার বন্ধ হয় (কোনায়াম) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র ত্যাগের সময়, প্রধানতঃ মূত্রভ্যাগ আয়ত্ত করার সময়, অথবা মূত্রত্যাগ শেষ হওয়ার সময়, মূত্রনাণীতে আলা ; মূত্রনাণীর অনেক কালের সঙ্কোচন বা অপ্রশস্ততা (Very chronic Stricture of the Urethra) ; একবারে সঞ্চিত সমুদয় মূত্রত্যাগে অশক্তি ।

পুরুষ জননেন্দ্রিয় । অণ্ডকোষাধারের ডাইন অংশ ক্ষীত (পাল্‌স্) ; অণ্ডকোষের শিথিলতা এবং তদ্রূপ কুলিয়া পড়া (ক্যান্ডার, সাল্‌ক্) ; অণ্ডকোষ প্রদাহযুক্ত, ক্ষীত এবং বেদনাযুক্ত (রডোড্, স্পঞ্জ) ; অণ্ডকোষ বেদনা বাহ্য শুক্র নিঃসারক সূত্র (Spermatic cord) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (স্পঞ্জ) ; ডাইন দিকের শুক্র নিঃসারক সূত্র অত্যন্ত টাটায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অণ্ডকোষ উপবের দিকে আকৃষ্ট হয় (রডোড্) ।

চর্ম্ম । গ্রন্থির কষ্টদায়ক ক্ষীতি এবং কঠিনতা (ক্যাল্‌ক-কার্‌ক্, আয়োড্) ; গায় চুলকানি এবং কল্‌তানি বিশিষ্ট বিকচের বা (পিট্টোন্, গ্রাক্, মার্ক্), ঠাণ্ডা জলে ধুইলে বা বিছানার উত্তাতে (আলান্, মার্ক্) এবং তিজা পুল্‌টিসে যাহার বৃদ্ধি হয় ।

ব্যবহার । গণ্ডমালা এবং পারার অপব্যবহার জনিত অম্বুথ ; বিকচ (Eczema) ; চক্ষুপোষা শিশুগণের মুখমণ্ডলাদিতে কুস্কুড়ী ; গ্রন্থির অম্বুথ ; প্রমেহ রোগ জনিত মূত্রনাণীর সঙ্কোচন বা অপ্রশস্ততা (Stricture of the Urethra) ; ক্ষত বা ঘা ; একশিরার ব্যারাম (Orchitis) ; অণ্ডকোষ প্রদাহ ; গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত দন্তশূল ইত্যাদিতে ক্লিমেটিন্ ইরেক্টা ব্যবহার্য্য । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন, গরমীর ব্যারাম বা বাত জনিত চক্ষু আইসের প্রদাহে (Syphilitic and Rheumatic Iritis) ইহা দ্বারা উপকার হওয়ার সম্ভাবনা । পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগের দরুন অল্প কালের মূত্রনাণীর সঙ্কোচন এবং অপ্রশস্ততার চিকিৎসায় এই ঔষধের ওয় ক্রম ব্যবহার করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন । মূত্র নির্গত হইতে হইতে মূত্র নির্গমন চর্চায় বন্ধ হওয়া এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অনেক রোগীর চিকিৎসায় ফল দেখিয়া লেখক একপত্রির করিয়াছেন ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আর্সিনিক, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া কার্বোনিকা, কোনায়াস্, গ্রাফাইটন্, মার্কিউরিয়াস্, পিটোলিয়ারা সাল্ টন্, সাইলিসিয়া, সাগ্ ফার ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাঙ্কার ।

ডাইলুশন বিচার । ঔষদশাস্ত্রিক ক্রমেন আরোঁকই লেখক সচ-
রাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন । কোন কোন চিকিৎসক ৬, ১২ এবং
৩০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

হেলোনিয়াস্ ডায়োইকা, -হেলোন্-ডায়ো

(HELONIAS DIOICA, -HELON. DIO.)

আমেরিকার ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সের জঙ্গল, বাগান, মাঠ ময়দান এবং
ভিজ্জা জমীতে এই গাছ জন্মে । ইহার শিকড় যথা নিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে
ভিজ্জাইয়া মূল আরোঁক প্রস্তুত হইয়া থাকে । হেলোনিন্ যথা নিয়মে সুগার
লব্ মিকে মিশাইয়া ইহার মিশ্র গুঁড়া প্রস্তুত হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । শরীরের পরিপোষণ কার্যের সহায়করী যন্ত্রের
মধ্যদিয়া ইহার রক্তের উপর কার্য্য করে, বাহার দক্ষণ দুর্বলতা, রক্তাক্ততা
এবং মৃত্তিকা পাণ্ডু রোগ উৎপন্ন হয় । মূত্র কোষ এবং জরায়ুর উপর ইহার
স্থানিক কার্য্য আছে, বাহার দক্ষণ উক্ত যন্ত্রগুলি প্রথমতঃ উত্তেজিত হইয়া
তৎপর জড়াবস্থা প্রাপ্ত হয় । ইহার কার্য্য অনেকটা লৌহের (Iron)
জ্ঞান এবং বাহাদের (স্ট্রীলৌকেট) লৌহ বা লৌহ ঘটত ঔষধ সহ না হয়,
তাহাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । কোন কাজ কর্মে নিযুক্ত থাকিলে ভাল থাকা ; একাকী
থাকিবার ইচ্ছা ; কথা বলিতে অনিচ্ছা ; মানসিক অবসন্নতা ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রকোষে বেদনা এবং মূত্রে আলবুমেন্ থাকা; মূত্র-
কোষে জালা; মূত্র ত্যাগের সময় মূত্রনালী ইত্যাদিতে জাল এবং চিড়িক্-
মারি; মূত্রত্যাগের পর মূত্রাধারে খালি বোধ হইলেও অসাড়ে বা অনিচ্ছা
পূর্বক মূত্র বহিয়া বা গড়াইয়া পড়া; মূত্র ফিকা এবং পরিমাণে প্রচুর।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীলোকের পুরুষ সহবাসের ক্ষমতার অভাব
বা হ্রাস এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বক্ষ্যাহ থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে ;
প্রবল শুষ্ক বায়ু এবং মনের অত্যন্ত অবসন্নতা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু
প্রদেশে ভারিবোধ এবং টাটানি, বাহার দরুণ জরায়ুর অস্থির যেন স্পষ্ট টের
পাওয়া যায়; শুষ্কতার ঠিক উপরি ভাগে কনকনানি এবং দুর্বলবোধ ও
উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়া (Prolapsus uteri); শেষরজঃ
রোধ হওয়ার সময় উক্ত প্রকারেব অশুথ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত
দুর্বলতা; জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়া এবং উহাতে ক্ষত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে
যোনিদ্বার দিয়া অনবরত কাল্চে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত মিশ্রিত ক্রেন নিঃসরণ;
পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যোনিদ্বারে টাটানি বা চড়্চড়ানি;
জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (একন্. হামামেনিস্, সাবাইনা); শ্বেত
প্রদর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রক্তাল্পতা ও সার্বাস্থিক দুর্বলতা; যোনির
অত্যন্ত চূড়ানি এবং উহা অত্যন্ত উষ্ণ, লালবর্ণ এবং ক্ষীত ও উহার চন্দ্রের
ছায়া উঠিয়া যাওয়া; যোনি এবং যোনিদ্বারের প্রদাহ ও উহাতে পচাবুক ঘা,
উহা হইতে দধির আয় ক্রেন নিঃসরণ; জরায়ুর দুর্বলতার দরুণ গর্ভস্রাবের
উপক্রম হওয়া; স্তনের বোঁটায় টাটানি বা বেদনা; স্তন ক্ষীত।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশে, দুইস্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে, জালা এবং উষ্ণা-
ভব; কোষের এবং গুহের ঠিক উপরিভাগে জালা এবং ক্রান্তি বোধ।

ব্যবহার । যন্ত্রাদির দুর্বলতা বা জড়তার দরুণ অশুথ; জরায়ু
স্থান ভ্রষ্ট হওয়া (Prolapsus uteri); রজঃরোধ; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব;
শ্বেত প্রদর; গর্ভস্রাব; রক্তাল্পতা; মুক্তিকা পাণ্ডুরোগ; বহুমূত্র; মূত্র
কোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ (Bright's disease); মূত্রে আলবুমেন্ থাকা;
সার্বাস্থিক দুর্বলতা, জরায়ুর জড়তার দরুণ বা জরায়ু হইতে রক্তস্রাবের
পর, শোথ ইত্যাদি অন্থে হেলোনিয়াস্ ডায়োইক্কা ব্যবহার্য। যে প্রকার

খানসিক অবসন্নতা ব্রোমাইড্ অব্ পটাশিয়ামের অতিরিক্ত ব্যবহারে উৎপন্ন হয়, তাহাতে ডাক্তার জোল্ এবং ডাক্তার কারল্ ডান্‌হামের (Drs. Jones and Carroll Dunham) মতে হেলোনিয়াস্ বিশেষ উপকারী । ডাক্তার জোল্ (Dr. Jones) বলেন যে, কোন কাজে মন নিযুক্ত থাকিলে অস্থত্বের উপশম এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরি-গণিত । তিনি বলেন “কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট হইলে মাথাধরা থাকে না । বেদনাদি থাকে যখন রোগী কোন কার্যে নিযুক্ত থাকে না । অত্যন্ত দুর্শ্ব-লতার ভাব দূরীভূত হয় যখন অঙ্গ চালনা করা যায় । পুস্তকাদি পাঠের সময় অস্থত্বাদি থাকে না এবং যাই পুস্তক হইতে মন অস্থাদিকে বাইরা নানা প্রকারের চিন্তার উদ্রেক হয়, অমনি মাথাধরার পুনরায় উদ্রেক হয় । যখন নিকর্ষ্য হইয়া রোগী বসিয়া থাকে, তখনই আলাবৃক্ত বেদনাদি আরম্ভ হয় । যখন মনে হয় যে রোগী এক পাও চলিতে পারিবে না এবং বিশ্রাম আবশ্যক, তখন শয়ন করিয়া না থাকিয়া চলিয়া বেড়াইলেই অস্থত্বের হ্রাস হয় ।” •

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । চায়না, ফেরাম্, ফরফিক্ আসিড্, লিগিয়া, ষ্টানাম্ ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম দশমিক ক্রমের আরোক বা হেলো-নিনের ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার্য্য ।

হাইড্রোকোটাইল্ আসিয়াটিকা, -হাইড্রোকোট্

(HYDROCOTYLE ASIATICA, -HYDROCOT.)

এই গাছের সমুদয় অংশ দিয়া যথা নিম্নে মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়াঃ চর্ম্মের উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল । এজন্তই কুষ্ঠরোগ (Loprosy), লুপাস্ (Lupus), বিকচ (Eczema) ইত্যাদি রোগে ইহা বিশেষ উপকারী ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন । উল্লাস ; বিপদ বিষয়ে চিন্তা ।

মস্তক । মাথা ঘোরা, মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, মাথায় ভারিবোধ ।

পাকস্থলী । আহারে অনিচ্ছা বা অকৃতি ।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় । যোনি দ্বারের পশ্চাত্তাণে উষ্ণানুভব ; যোনি দ্বারের মুখে কুট্‌কুটানি এবং চুলকানি ।

চৰ্ম্ম । চৰ্ম্ম বিসর্পের স্থায় লালবর্ণ ; গায় দাঁদের ন্যায় চক্রকারের উচু ধার ও আইশবিশিষ্ট ফুসুড়ী ; উভয় পায়ে হরিদ্রা দাগ পড়া ; মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের স্থায় ফুসুড়ী ; বুকে কোম্বার স্থায় ফুসুড়ী ; শরীরের না না স্থানে অসংখ্য চুলকানি


ব্যবহার । কুষ্ঠরোগ, গোম, গলিত কুষ্ঠবোগ, লুপাস একজিডেন্স (Lupus Erythematosus) এবং পুরাতন আকারের বিকচ ; মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ ইত্যাদি অস্থূবে এই ঔষধ উপকারী বলিয়া চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় । বিকচ ব্যতীত উক্ত অস্ত্র কোন রোগেই এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ ফল পান নাই ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সার্কাজিক অবসন্নতা, ভারিবোধ এবং চিনাবোধ ; সার্কাজিক প্রান্তিবোধ ; মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁচলিয়া গেলে ঘেঁরুপ হয়, পেশীতে সেরূপ অস্থূখ বোধ ।

সমুগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আর্সিনিক, সাইলিসিয়া, লাইকোপডিয়ায়াম, ডাক্‌মেয়া ।

ডাইলুশন বিচার । ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোহক ব্যবহার্য্য । এই ঔষধ দ্বারা লেখক যত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন উহার সমুদয় রোগীর চিকিৎসায়ই ডাক্তার হিউগের (Dr. Hughes) ব্যবস্থানুসারে প্রথমতঃ ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল না পাওয়াতে তিনি ১ম, ২য়, ৩য় এবং ১২ ক্রম ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন । বিকচ রোগের চিকিৎসায় যে কএকটি রোগীর চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে, উহার সমুদয় রোগীকেই

১ম দশমিক ক্রমের আরোক সেবন করাইয়াছিলেন । ১৮১৫ বৎসর বয়সে একটি ইউরাসিয়ান বালিকার মুখ মধ্যমগুলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের চিকিৎসায় ১২ ক্রম ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন ।



ম্যাঙ্গেনাম্ কার্বোনেট্ যথা নিয়মে স্রুগার অব্যমিকে মিশাইয়া মিশ্র গুড়া প্রস্তুত হয় । ম্যাঙ্গেনাম্ অ্যাসিটেট্ যথা নিয়মে চূরান জলে মিশাইয়া মিশ্র আরোক বা সলিউশন্ (Solution) প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণক্রিয়া । • ইহা গতি উৎপাদনের সহায়কারী স্নায়ু-মণ্ডলীকে (Motor nervous System) প্রবল রূপে আক্রমণ করে, বাহার দক্ষণ পক্ষাঘাত হয় । পক্ষাঘাত প্রথমতঃ অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাতের (Hemiplegia) আকারে আরম্ভ হয় । স্নায়ু-মণ্ডল দিয়া ইহা শরীরের নানা ঘরের উত্তেজনা উৎপাদন করে । এই উত্তেজনা অনেক সময় প্রদাহেও পরিণত হয় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । উদাস ভাব (পাল্‌স্); খিট্-খিট্ করা; সর্কদাই চটয়া থাকা ।

মস্তক । মাথায় ভারি বোধ, বাহার দক্ষণ মনে হয় যেন মাথা স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় হইয়াছে (রেনান্‌চুল্); মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্ত-বরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার দপ্‌দপানি (একন্, গ্লোনয়েন্, বেল্), বহির্কীয়ূতে বাহার উপশম হয়; বহির্কীয়ূতে মাথার টানিয়া ধরা, হলকুটান, বা কসিয়া ধরার জ্বায় বেদনা, বরের মধ্যে থাকিলে যাহাব উপশম হয়; মাথা সামান্য নাড়িলেও মস্তক যেন অত্যন্ত আলোড়িত হয় বলিয়া অনুভূত হয়; মাথার সমুখ ভাগে সঙ্কোচক, স্থলীবিধানের জ্বায় বাতনা, কপালের জ্বই পার্শ্বেই বাহা অধিক অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা;

ঘরের মধ্যে মাথা ধরা আরম্ভ হইলে বহির্কায়ুতে গেল মাথা ধরা সারিয়া যায় এবং বহির্কায়ুতে মাথা ধরা আরম্ভ হইলে ঘরের মধ্যে গেল মাথা ধরার উপশম হয় বা উহা সারিয়া যায় ।

চক্ষু । চক্ষে জ্বালাযুক্ত উষ্ণ এবং শুষ্কবোধ ; সঞ্চালনে চক্ষু বেদনাযুক্ত হয় এবং কোন উজ্জ্বল আলোকের পানে তাকাইলে চক্ষে শুষ্কবোধ হয় ; চক্ষুর তারা বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত ।

কর্ণ । কথা বলিবার সময় কানের মধ্যে ঝোঁচা বিধার জ্বালা ঘুসে বেদনা ; কোন বস্তু দিয়া কান বন্ধ করিয়া রাখিলে বেক্রম হয়, সেক্রম কানে না শুনা (কোকান্দ) ; গিলিবার সময় বা নাক ঝাড়িবার সময় কানের মধ্যে কেড়্ কেড়্ শব্দ হওয়া (গ্রাফ্) ; বাম কর্ণমূলস্থ গ্রন্থি ক্ষীত এবং লালচে হওয়া (মোহক জরে) ।

নাসিকা । শুষ্ক সর্দি এবং উছার সঙ্গে সঙ্গে নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হওয়া (নাজ্-বম্) ; কখন কখন তরল সর্দি এবং কখন কখন শুষ্ক সর্দি ।

মুখমণ্ডল । মুখাকৃতি অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্নযুক্ত ; মুখাকৃতি শিটা বা রুম্ব হয় এবং বসিয়া যায় ; ওষ্ঠের কোণে কুসুড়ী এবং ক্ষত (আন্টি-ক্রুড্, গ্রাফ্, লাইকোপ্) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতের গোড়ায় ভয়ানক বেদনা যাহা শীঘ্র শীঘ্র অন্ত স্থানে বিস্তৃত হয় । গলার মধ্য শুষ্ক ; একটী গাছের পাতা লাগিয়া থাকিলে যেক্রম হয়, বায়ুনের মধ্যে সেক্রম রুদ্ধ বোধ হইয়া স্ফু-স্ফু করা ; গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি, যাহার দক্ণ মনে হয় বেন গলার মধ্যের ছাল উঠিয়া গিয়াছে । কোন দ্রব্য গিলিবার সময় এইরূপ অসহ্য অনুভূত হয় না ।

পাকস্থলী এবং উদর । পিপাসা থাকে না (এপিস্, পাল্‌স্) ; পাকস্থলীতে উষ্ণ এবং জ্বালাবোধ যাহা বৃকো বিস্তৃত হয় (আর্দ) । দীর্ঘ নিশ্বাসে নাতি প্রদেশে কর্ভনবৎ বেদনা ।

মল এবং মলদ্বার । বসি অবস্থায় থাকিলে শুষ্ক দ্বারে সঙ্কোচক বেদনা ; কোষ্ঠবদ্ধ ; মল শুষ্ক, শুঁট্‌লে, যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় (প্রাথমিক, ম্যাগ্নেস্-নিউর) ।

মুক্ত্রযন্ত্র । বারবার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা (একন্ট, এপিষ্ট, আপোস)।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের পুরুষাঙ্গাদিতে জর্রল বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুক্র নিঃসারক সূত্রে (Spermatic Cord) কসিয়া ধরার জ্বায় আলায়ুক্ত যাতনা, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যাহা বিস্তৃত হয়। জীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে অগ্রচূব বা স্বল্প রজঃস্রাব।

শ্বাসযন্ত্র । উচ্চৈঃস্বরে পুত্ৰকাদি পড়িলে শুককাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুনলের উপরিভাগে অত্যন্ত কষ্টকর শুক, ধণ্ডাংশে বোধ এবং উহার সঙ্কোচন; গভীর কাশি, কিন্তু গলা দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, শয়ন করিয়া থাকিলে যাহা সারিয়া যায়; অনিবার্য্য স্বরভঙ্গ এবং গলার মধ্যে বশ্ শ্বশে বোধ, প্রাতঃকালে এবং বহির্কায়ুতে যাহা অধিক অল্পভূত হয় (কষ্ট, নাক্স-বন্) এবং উদরের মধ্য ভাগ হইতে বৃক পর্য্যন্ত উষ্ণ বোধ এবং সঙ্কোচন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদগে।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎপিণ্ড এবং বৃকের বাম পার্শ্বের উপর হইতে নিম্ন দিকে হঠাৎ ধাক্কা লাগার জ্বায় যাতনা; নাড়ী অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট, কখন দ্রুতগামী, কখন মৃদুগতি বিশিষ্ট, কিন্তু অনবরত জর্রল এবং কোমল।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । বাহু এবং হাতের সন্ধিতে ঘাটিয়া ধরার জ্বায় বেদনা; স্কন্ধ হইতে আঙ্গুল পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলা বা বাতের বেদনার জ্বায় বেদনা; উরুদেশে ঘাটিয়া ধরা এবং হুচী বিধানের জ্বায় যাতনা।

চক্ষু । সন্ধির চক্ষের ভাজে ভাজে ছাল উঠিয়া যাওয়া এবং উহাতে ক্ষত হইয়া ফাটিয়া যাওয়া (গ্রাফ, সিল); অসহ্য চুলকানি, চুলকাইলে বাহার অনেক উপশম হয় (সাল্‌ফ্); হাঁটুর পশ্চাৎভাগের গর্ভের জ্বায় স্থান এবং উরু ও পায়ের ডিমে হুচী বিধানের জ্বায় যাতনা।

নিদ্রা । ঘুমের বোরে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন উৎপাদক স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা যাহা জাগরিতাবস্থায়ও স্মরণ থাকে।

ব্যবহার । ক্ষুদ্র সন্ধিস্থিত জনিত অল্প; অস্থি প্রদাহ; অস্থির আবরক কঠিন পর্দার প্রদাহ (Periostitis); কর্ণ শূল; কর্ণ প্রদাহ; পুরাতন আকারের সন্ধি; কণ্ঠনালী প্রদাহ; কণ্ঠনালী সম্বন্ধীয় যক্ষ্মাকাশ; স্বরভঙ্গ, যাহা গলার মধ্যে শ্লেষ্মা দ্রবিত হইয়া উৎপন্ন হয় এবং উক্ত শ্লেষ্মা

নির্গত হইয়া গেলে স্বরভঙ্গ সারিয়া যায় ; বধিরতা বা কানে কঁম শুনা ; দুর্বল জীলোক দিগের আহ্বারের পর পেটে বেদনা ইত্যাদি অস্থখ্যে ম্যাসেনাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শরীরের স্থানে স্থানে কসিয়া ধরা বা ধিল ধরার ভ্রায় বাতনা ; সন্ধিতে ক্ষুদ্র সন্ধিবাতের ভ্রায় বেদনা, রাত্রিতেই বাহা অধিক হয় (মার্ক) ; অস্থি এবং অস্থির আবরক কষ্টিন পর্দায় অসহ্য খনন করার ভ্রায় বাতনা, রাত্রিতে বাহ্যর বৃদ্ধি হয় (মার্ক, কন্-আস) ; স্পর্শনে লম্বন হাড়ে (বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের) অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি ; রাত্রিতে, বায়ুর অবস্থার পরিবর্তনে (রেনান্‌কুল) অস্থখের বৃদ্ধি এবং বাতনা দি ঘরের মধ্যে আরম্ভ হইলে বহির্কায়ুতে উহার উপশম হয় ও বহির্কায়ুতে আরম্ভ হইলে ঘরের মধ্যে গেলে উহার উপশম হয় ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আমোনিয়াম্ কার্বোনিয়াম্, কফিয়া, কোনারাম্, লাইকোপডিয়াম্, প্লাটিনা, পাল্‌সেটিল, খুজা, বিরেট্রাম্ আল্‌বাম্ ।

প্রতিষেধক ঔষধ । কফিয়া ।

ডাইনুশন বিচার । ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই । ম্যাসেনাম্ কার্বোনেটের ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমের গুঁড়া এবং ম্যাসেনাম্ আনিটেটের ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক ব্যবহারে উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ।

আরালিয়া রেসিমোসা,-আরাল্

(ARALIA RACEMOSA, -ARAL. RACE.)

সাধারণ ক্রিয়া । নিউমোগাস্ট্রিক্‌ নায়ু (Pneumogastric nerve) দিয়া শ্বাসযন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, বাহার দক্ষণ হাঁপানি এবং বহু ব্যাপক আকারের হাঁপানির লক্ষণাক্রান্ত সর্দি ইত্যাদি অস্থখের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

নাসিকা । জালা উৎপাদক শ্লেষ্মার দরুণ নাকের পশ্চাৎভাগে জালা এবং চিড়িকমারা (আস্, এরাস্, আমন্-কার্ভ, সিপা) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া গেলে যেৰূপ হয়, দুই নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্তী উপাঙ্ঘিতে এক বিশেষ প্রকৃতির সেরূপ জালা এবং টাটানি ।

শ্বাসযন্ত্র । নিশ্বাস-প্রশ্বাস শুষ্ক এবং সাঁই সাঁই শব্দবিশিষ্ট; শীঘ্রই কাঁপড় হইবে রোগী এরূপ অনুভব করে; নিশ্বাস টানিবার সময়ই উক্ত সাঁই সাঁই শব্দ অধিক হয়; শ্বাস কষ্টের দরুণ রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া শোকা হইয়া বসিতে বাধ্য হয় (আস্, শ্বাস্ ক); শ্বাস রোধক জ্বর সম্বলিত সর্দি বা হাঁপানি (Hay Asthma); ঘুম ভাঙ্গিলেই কাশির উদ্রেক হয় এবং কাশির দরুণ রোগী পুনরায় ঘুমাইতে পারে না; হাঁপানি কাশির অভ্যন্ত বদ্ধিতাবস্থায় গলাদিয়া অতি সামান্ত পরিমাণে শ্লেষ্মাদি নির্গত হয় এবং উহার আক্রমণের হ্রাস হইলে গলাদিয়া উষ্ণ এবং লোম্বতা স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; বক্ষস্থির (Sternum) পশ্চাৎভাগে অঙ্গাগোড়া, ছাল উঠিয়া বাওয়ার স্থায় জালাযুক্ত টাটানি (ক্রমেজ্); প্রত্যেক কুক্ষুসেও উক্ত প্রকারের যাতনা ।

ব্যবহার । হাঁপানিকাশি; সর্দির লক্ষণাক্রান্ত হাঁপানি কাশি; শ্বাসরোধক কাশি বা সর্দি ইত্যাদি রোগে আরালিয়া রেসিমোসা ব্যবহার্য্য । গৃহচিকিৎসায় আমেরিকাতে সকল প্রকারের কাশি, কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাদকের বেদনা (Painful Menstruation), শ্বেত প্রদর এবং প্রসবের পর রক্তদাди (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া ইত্যাদি অন্তর্থে ইহা বিস্তৃতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

সমগুণ বিশিষ্ট-ঔষধ । একোনাইট্, আর্সিনিক, আণ্টিমো-নিয়াম্ টার্টারিকাম্, শ্বাস্ কাশ্, সাল্ফার ।

ডাইলুশন বিচার । ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।

বাডায়াগা,-বাডায়াগ্

(BADIAGA,-BADIAG.)

ইহার শুকনা পদার্থ যথানিয়মে অঙ্গার অব্ মিকে মিলাইয়া মিশ্র শুঁড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে । যথানিয়মে ইহার আরোকও প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । হানিমান্ এই ঔষধকে আন্টিসোর্বি (Anti-psoric) ঔষধের শ্রেণীভুক্ত করিয়া গিয়াছেন । রক্তের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দরুণ গণ্ডমালা (Scrofula) জনিত অঙ্গুখের লক্ষণের জায় লক্ষণাক্রান্ত অঙ্গুখ হয় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । অপরাহ্ন ২টা হইতে প্রাতঃকালে ৭টা পর্য্যন্ত মাথাধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষুর গোলকের পশ্চাৎভাগে এবং কপালের দুই পার্শ্বে সামান্য কন্কনানির জ্বাশ্বাসনা ; দিনের বেলা প্রায় সকল সময়েই মাথাধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর গোলকে বেদনা বা স্বাতনা (সিমিসিক্, স্পাইজেল), যাহা মাথার বাম দিকে এবং অপরাহ্ন ১টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত অধিক অনুভূত হয় ; পূর্বাহ্নে মাথার সম্মুখ ভাগে বেদনা, কপালের দুই পার্শ্বেই যাহা অধিক অনুভূত হয় এবং যাহা বাম চক্ষুর গোলকের পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ও চক্ষু সঞ্চালনে বাহার বৃদ্ধি হয় ; কপালের দুই পার্শ্বে এবং চক্ষুর গোলকে বেদনা যাহা চক্ষুর গোলক হইতে আরম্ভ হইয়া কপালের দুই পার্শ্বে বিস্তৃত হয় ; মাথার ঠিক উপরিভাগে অত্যন্ত বেদনা, যাহা সকল সময় একভাবে থাকে, রাত্রিতে ঘুমের পর, প্রাতঃকালে বাহার অনেকটা উপশম হয় এবং প্রাতঃকালে আহারের পর বাহার প্রবল পুনরাক্রমণ হয় ও অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকে ; মাথায় অধিক পরিমাণে মরা চাম এবং খুসকি পড়ে (ক্যাঙ্ক্, মেজিরিয়াম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় সামান্য চুলকানি ; মাথা স্পর্শ করিলেও স্বাতনার উদ্রেক হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে মরা চামের জ্বাশ্বাস শুক ফুস্কুড়ী ।

চক্ষু । চক্ষুর পাতার প্রান্ত নীলের আভাযুক্ত বেগুনী এবং চক্ষুর

নিম্ন ভাগ নীলবর্ণ; চক্ষুর গণ্ডমালা জনিত প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মিবেমিয়ান গ্রন্থির (Meibomian glands) কঠিনতা (গ্রাফ্, সাল্‌ফ্); বায় চক্ষু-গোলক এবং কপালের বাম পার্শ্বে প্রবল বেদনা; মাথাধরা, চক্ষুর গোলক পর্য্যন্ত যাহা বিস্তৃত হয় (সিম্বিসিক্, স্পাইজেল্); বাম চক্ষুর গোলক টাটায়, এমন কি স্ফোরে চক্ষু বুজিলেও চক্ষে বেদনার উজ্জেক হয় ।

কর্ণ । দূৰ্ব্বভী হান্ হইতে কামান বা বন্দুক ছুড়িলে বেক্রপ হয়, অপরাহ্নে কানের মধ্যে সেক্রপ হঠাৎ শব্দ হয় ।

নাসিকা । তরল সর্দি এবং তদ্রূপ নাক, বিশেষতঃ বাম নাসা-রক্ত, দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমন, যাহা অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার সময়ই অধিক হয় ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার হাঁচি ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলে খুসখি বা মড়া চামের জ্বায় কুসুড়ী; মুখ মণ্ডল ফিকা, ছাইয়া বা সীসার জ্বায় রক্ত বিশিষ্ট; মাড়ি সঞ্চালনে অশক্তি ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখগহ্বর এবং নিখাস জরের জ্বায় উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা ও তদ্রূপ অধিক পরি-মাণে জল খাওয়া (ব্রাই); প্রাতঃকালে গলাদিয়া আঁটাল রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; গলার মধ্যের প্রদাহ এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি যাহা কোন দ্রব্য বা চোক গিলিবার সময়ই অধিক অনুভূত হয় ।

উদর । কুঁচ্কির গ্রন্থির কঠিনতা; গরমীর ব্যারাম জনিত বাগী (Buboes); অর্শ রোগ ।

শ্বাসযন্ত্র । কখন কখন প্রবল আক্কেপিক কাশি এবং তদ্রূপ গলা এবং বায়ুনল হইতে স্ফোরে শ্লেষ্মা নির্গমন; বায়ুনলের উপরিভাগে স্বড়-স্বড়ীর দরুণ এই কাশির উজ্জেক হয়; বুকের ডাইন পার্শ্বের উপরিভাগে বেদনা; ফুফু সাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ জনিত বুকে বেদনা, নিখাসেই যাহা অনুভূত হয় (ব্রাই, ক্যালী-কার্ক, ফন্স); ডাইন কণ্ঠস্থির উপরিভাগে (Right supra claviclar region) ছুরিদিয়া কাটার জ্বায় প্রবল বেদনা; বুকের পার্শ্বে, বিশেষতঃ ডাইন পার্শ্বে, স্থতীবিধানের জ্বায় বেদনা (ক্যালী-কার্ক) ।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎপিণ্ডের ভয়ানক আন্দোলন; বসিয়া বা শয়ন করিয়া

পাকিলে হৃৎপিণ্ডের ভয়ানক কঁাপনি এবং হৃৎস্পন্দন, কোন প্রকারের মান-সিক উত্তেজনা বা ভয়ানক বিষয়ে চিন্তা করিলেই বাহার হঠাৎ উদ্বেক হয়।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় নোয়ান যায় না (রাস্টেক্স, চেলি-ডন) ; ঘাড়ের টাটানি এবং ঘাড় সঞ্চালনে অশক্তি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের স্থচীবিধানের জায় যাতনা, ঘাড় সমুখ এবং পশ্চাৎদিকে নোয়াইলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; মুখমণ্ডল, গলার মধ্য এবং গ্রীবার গ্রন্থির গণ্ডমালা জনিত ক্ষীতি, বাহার দক্ষণ উক্ত গ্রন্থিগুলি মূর্গির ডিমের জায় বড় হয় এবং উহার কোন কোন গ্রন্থি কঠিন হয় ও কোন কোন গ্রন্থি পাকিয়া উহাতে পুঁথও হইয়া থাকে ; ডাইন স্বক্কাহির নিম্ন ভাগের পশ্চাৎদেশে প্রবল বেদনা এবং স্থচীবিধানের জায় যাতনা, সমুখ পানে হেলিয়া বাকিয়া পড়িলে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । হাতের পাতার তাম্বু উচ্চ এবং শুষ্ক ; পায়ের ডিমের হাড়ের উপর দিয়া আঁগা গোড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন ক্ষীতি ; ডাইন পায়ের সমুখভাগস্থিত পেশীতে অত্যন্ত টাটানি ; রক্তিতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছুরী বিধানের জায় ভয়ানক বেদনা ।

ব্যবহার । মাথা এবং কপালে খুসুখি বা মরামাস বিশিষ্ট গুঁক ফুসুড়ী ; গণ্ডমালা জনিত অস্থখ, বিশেষতঃ গ্রন্থির ক্ষীতি ; চক্ষুর গণ্ডমালা জনিত প্রদাহ ; সর্দি ; গরমীর ব্যারাম জনিত বাগী ; ফুসুসাবরক বিল্লী প্রদাহ ; হৃৎস্পন্দন ; অর্শরোগ ইত্যাদি অস্থখে ব্যাভায়াগা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সমুদয় শরীরের পেশী এবং চামড়ায় টাটানি ; পেশীর টাটানি, কাপড়ের চাপ পড়িলেও বাহার বৃদ্ধি হয় ; মারিলে ঘৈরুপ হয়, গায় সেরূপ টাটানি (আর্গিকা, রুটা) ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ব্যারাইটা কার্ব, আয়োডিয়াম, ক্যালী আয়োডাইড, মার্কিউরিয়াস, ফাইটোলাকা, সাইলিসিয়া, স্পঞ্জিয়া, সাল্ফার ।

ডাইলুশন বিচার । এই ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।

গ্যাম্বোজিয়া,-গামি গাটি,-গ্যাম্বোজ্

(GAMBOGIA,-GUMMI GUTTI,-GAMBOG.)

ইহার পৌদের ভায় শুঁড়া পদার্থ বপানিয়মে প্রক্সিমিটে ডিজাইরা মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । • শৈথিল্য বিঘ্নীর (বিশেষতঃ অন্ত্রের) উপরই ইহার কার্য্য প্রবল, বাহার দ্রবণ অত্র নালী (Intestinal Canal) উত্তেজিত হইয়া উহার নিঃসরণ পরিমাণে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং কখন কখন উহা প্রদাহবৃত্তও হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । বিশ্রাম বা নড়া চড়াতে এবং প্রাতে:কালে ঘুম হইতে উঠিলে মাথা ঘোরা ।

চক্ষু । সন্ধ্যার সময় বা অপরাহ্নে চক্ষে অত্যন্ত জ্বালায়তব এবং উহাতে আলোক অসহ্য হওয়া (Photophobia), বহির্জায়তে বাহার উৎসর্গ হয় এবং প্রাতে:কালে বাহার পুনরাক্রমণ হয় ; সন্ধ্যার সময় চক্ষে অত্যন্ত চুলকানি ; রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা এবং প্রাতে:কালে উহাতে জ্বালায়তব ; চক্ষুর নাসিকার নিকটবর্তী কোণে চুলকানি ।

নাসিকা । পুরাতন আকারের প্রবল হাঁচি ; ডাইন নাসারন্ধ্রের শুষ্কতা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । সম্মুখের ইনসিজার্স (Incisors) নামক দাঁতের প্রান্তে ঠাণ্ডা বোধ । গলার মধ্যের ডাইন পার্শ্বে হল ফুটানের ভায় প্রবল বেদনা ; গলায় উপর চাপ দিলে গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি ; গলার মধ্যে থশ্শে এবং উহাতে জ্বালায়তব, বাহার দ্রবণ রোগী অনবরত পানীয় খেজুর দিতে বাধ্য হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহারে অনিচ্ছা বা অস্বচ্ছিত ; সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত পিপাসা ; বমনোদ্বেষণ যেন পাকস্থলী হইতে আরম্ভ হয় ; পাকস্থলীতে ভয়ানক চর্চনবৎ যাতনা (ইগ্নেস্, লিথিয়াম্) ; পাকস্থলীতে

ছুরীদিয়া হানা বা সূচীবিধানের স্থায় বেদনা (ত্রাই); পাকস্থলীতে ক্ষতের স্থায় যাতনা, আহাবের পর বাহা থাকে না। উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে নাভি প্রদেশে চিম্টিকাটার স্থায় বা চিন্চিনে বেদনা; অস্ত্রের মধ্যে গড়্-গড়্, কল কল শব্দ হওয়া (আলোজ্, লাইকোপ্); উদর এবং কুঁচকি প্রদেশে চিন্চিনে বেদনা।

মল। গুল্মদ্বার দিয়া বারম্বার দূষিত হৃদয়যুক্ত বায়ু নিঃসরণ, সন্ধার সময় এবং রাত্রিতেই যাহা অধিক হয়; উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুল্মদ্বারে জালাযুক্ত বেদনা এবং কষ্টদায়ক কৌণপাড়া, গুল্ম বাহির হইয়া পড়া, নাভির চতুর্দিকে অনবরত চিন্চিনে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন গুল্মদ্বার দিয়া স্লেয়া নির্গমন; প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক কৌণ পাড়া এবং উদরে গুল্ম বেদনার স্থায় বেদনা; স্বাভাবিক মল সম্বলিত উদরাময়, বাহাতে মল গুল্ম দ্বার দিয়া অতি প্রবল বেগে নির্গত হয়; হরিদ্রা বা সবুজ বর্ণের স্লেয়া মিশ্রিত তরল ভেদ এবং দাণ্ডের পূর্বে নাভির চতুর্দিকস্থ স্থানে কঠিনবৎ প্রবল বেদনা; কঠিন অপ্রচুর মল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন বাহের বেগ ও গুল্মদ্বারে চাপাবোধ এবং গুল্ম বাহির হইয়া পড়া (নাক্স-বম্)।

মূত্রযন্ত্র। অনেককণ অস্তর মূত্রত্যাগ।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়। খেত প্রদর।

শ্বাসযন্ত্র। বুকের মধ্য ভাগে চাপাবোধ; ছাল উঠিয়া গেলে বেরূপ হয়, বুকের সমুদয় অংশেই সেরূপ বেদনা বা যাতনা (কমেজ্); বক্ষাহি প্রদেশে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বারম্বার সূচীবিধানের স্থায় যাতনা।

নিদ্রা। নিদ্রাবেশ এবং সর্ককা ঘুমের ইচ্ছা; ঘুমেরঘোরে বিরক্তি এবং চিন্তা উৎপাদক স্বপ্ন দেখা।

ব্যবহার। স্লেয়া জনিত অশুণ; চক্ষুর যোজক কিল্লী প্রদাহ (Canjunctivitis); অজীর্ণ রোগ; উদরাময়; আমাশয়; শিশুগণের ওলা-উঠা ইত্যাদি অন্তর্থে গ্যাষোজিয়া ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। স্বক্কে ছিঁড়িয়া কেলার স্থায় যাতনা; শরীরের স্থানে স্থানে জালাযুক্ত যাতনা (আদ্); শরীরে অত্যন্ত গরম বোধ

এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের অত্যন্ত উদ্বেগ (একন্); সন্ধ্যার সময় বা রাত্রিতে অস্থখের বৃদ্ধি; বসিয়া থাকিলে সমুদয় উপদ্রবের আক্রমণ এবং বহির্জীব্যতে নড়া চড়াতে অস্থখের উপশম ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আর্সিনিক, ব্রাইওনিয়া, কলোসিস্, মার্কিউরিয়াম্, পডোফিলাম্ ।

ডাইলুশন বিচার্য। ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন রোগীর উদরাময়ের চিকিৎসায় ১ম দশমিক ক্রম ব্যবহার করিয়া ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রম অপেক্ষা লেখক অধিক ফল পাইয়াছেন। ৬ষ্ঠ অপেক্ষা উচ্চ ক্রম ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়া তাঁহার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

আরানিয়া ডায়েডিয়া,-আরানিয়া

(ARANEÆ DIADEMA,-ARAN. DIAD.)

ইহা এক প্রকারের মাকড়সা বিশেষ। একটী মাকড়সা ১০০ ফোঁটা ক্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা নিয়মে স্নগার অব্ মিক্ মিশাইয়া ইহার নিশ্র গুঁড়াত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মেলেরিয়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে ঘেরূপ হয়, ইহাতেও সেরূপ লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। ম্যালেরিয়া জনিত যেপ্রকার সবিরাম জরে শীতলাবস্থা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় এবং যাহাতে লক্ষণাদি প্রতিদিন এক সময়ে প্রকাশ পায়, যে সকল রোগীর শরীরে অতিরিক্ত পরিমাণে জলীয় পদার্থ থাকে এবং যাহাদিগের শরীরের স্বাভাবিক সন্তাপ কম থাকে ও ভিজা শেত্শেতিয়া স্থানে সামান্য কারণেই অস্থখ হয় (Hydrogenoid Constitution), তাহাদিগের অস্থখেই ডাক্তার বন্ গ্রবগলের (Dr. Von Grauvogl) মতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথাধরা এবং মাথায় গোলমেলে বোদ, তামাক খাইলে

যাহার উপশম হয় ; মাথা ধরা সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে ; মাথা ধরা কএক ঘণ্টা অবস্থিতি করিয়া ক্রমে ক্রমে কমিয়া বহির্কায়ুতে এক-বারে সারিয়া যায় ; মাথা ধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু আলায়ুভব ও মুখ মণ্ডলে উষ্ণায়ুভব ।

মুখগহ্বর । রাত্রিতে শয়ন করিবার পরই সমুদয় দাঁতে হঠাৎ প্রবল বেদনা ।

উদর । তলপেটে ভারি এবং পূর্ণ বোধ, যাহার দরুণ মনে হয় যেন উদরে একখানি পাথর চাপান রহিয়াছে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট কাম-ডানী ; উরুদেশে ভারিবোধ, যাহার দরুণ পা যেন চলে না একরূপ অস্থিত হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় গোলমলে বোধ ; প্রতি দিনই এক সময়ে এই প্রকারের অস্থির উদ্রেক হয় এবং অপরাহ্ন ৫টার সময় অর্ধ ঘণ্টা অবস্থিতি করে ; প্ৰীহার বিরুদ্ধি ।

মল । জলবৎ তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে বেদনা ।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় । নিয়মিত সময়ের ৮ দিবস পূর্বে প্রচুর রক্তস্রাব ।

বক্ষ । ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাব ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । হাড়ের মধ্যে খনন করা বা ছিন্ন করার ভায়ে বেদনা (ইউপেট, মার্ক), পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক হাড়, পায়ের গোড়াড়ীর হাড় (Os calcis), ডাইন বাহ এবং হাতের হাড়েই বাহা অধিক অস্থিত হয় ; বাহ এবং হাত যেন ভগ্নানক কুলিয়াছে একরূপ অস্থিত হয় ।

ব্যবহার । ম্যালেরিয়া জনিত অর ; ম্যালেরিয়া জনিত অস্থি ; কোইনাইনে আটকান সবিরাম অর ; রক্তস্রাব ; প্ৰীহার বিরুদ্ধি ; দস্তশূল ইত্যাদি অস্থি প্রারানিয়া ডায়েডিমা ব্যবহার্য্য । ম্যালেরিয়া জনিত এবং কোইনাইনে আটকান সবিরাম অর ও প্ৰীহার বিরুদ্ধিতে লেখক অনেক রোগীর চিকিৎসায় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন । উহাতে ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পান নাই । তবে একটী স্ত্রীলোকের দস্তশূলে ইহার ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন । যদিচ লেখক এই ঔষধ

দ্বারা আশঙ্করূপ ফল পান নাই, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের এই ঔষধ বিতৃষ্ণরূপে ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা করা উচিত, কারণ, আমেরিকার হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থে ইহার অনেক প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায় ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত ক্লান্তি এবং শ্রান্তিবোধ ; অস্থির নিদ্রা বা ভালঘুম না হওয়া ও বারম্বার জাগিয়া উঠা ; ভিজা, আর্দ্র বা শেত শেতিয়া স্থান বা বায়ুতে অস্থখ হওয়া বা অস্থখের বৃদ্ধি (সাস্-টল) ; ভিজা বা আর্দ্র দিনেই শীতবোধের বৃদ্ধি, বাহার দরুণ মনে হয় শীত যেন অস্থিতে পর্য্যাপ্ত অস্থত হয় ; সমুদয় অস্থখ অপেক্ষা শীত অধিক অস্থত হয় ; জর না থাকা ; প্রতিদিন ঠিক এক নির্দিষ্ট সময়ে অস্থখের লক্ষণাদির আক্রমণ (সিড্‌ন) ; মনে হয় যেন বাহু এবং হাত অত্যন্ত ফুলিয়াছে ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আর্সিনিক, চায়না, সিড্‌ন, ইউকেলি-প্টাস্, ইউপেটোরিয়াম্ ।

ডাইলুশন বিচার । লেখক এই ঔষধের ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ১২ ক্রমের আরোক ও গুঁড়া উভয়ই ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন । ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক দ্বারাই অধিক ফল পাওয়া যায় । ১ম এবং ৩য় ক্রমে লক্ষণাদির বৃদ্ধি হয় । কেবল ২০টা রোগীর চিকিৎসায় ১২ ক্রম ব্যবহার করা গিয়াছে । উহাতেও ভাল ফল পাওয়া যায় নাই ।

আণ্ডীলেগো মেইডিস্,-আণ্ডীল্

(USTILAGO MAYDIS,-USTIL.)

এই গাছের বাকল দিয়া মূল আরোক প্রস্তুত হয় ।

সারারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেত্রকা মণ্ডলী দিয়া ইহা প্রধা-নতঃ রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়কারী যন্ত্রাদি আক্রমণ করে, বাহার দরুণ কৈশিক ধমনি (Artérial Capillaries) অনেক কাল ব্যাপিয়া সঙ্কুচিত এবং কৈশিক শিরা বিস্তৃত হয় ও তদরূপ ধমনি সম্বন্ধীয় রক্ত সঞ্চালন

ক্রিমার (Arterial Circulation) ব্যাঘাত জন্মিয়া শিরাসম্বন্ধীয় রক্তাব-
রোধ (Passive Congestion) হইয়া থাকে । জীলোকের জননোন্ত্রের
উপর ইহার বিশেষ স্থানিক কার্য্য থাকার দৃশ্য জরায়ুর সঙ্কোচন, গর্ভস্রাব,
জরায়ু হইতে রক্তস্রাব এবং সার্বজনিক দুর্বলতা ইত্যাদি অসুখ প্রকাশ পায় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । খিট্ খিট্ করা এবং মানসিক অবসন্নতা (ব্রাই, নাক্স-বন্স) ।

মস্তক । মাথায় পূর্ণবোধ ; মাথার সমুখ ভাগে চাপিয়া ধরার জ্বায়
সুস্থস্থে বেদনা ; স্নায়বিক শিরঃপীড়া ; মাথার ছাল উঠিয়া বা হওয়া বা
মাথা পুড়িয়া যাওয়া ; মাথায় পচা এবং ময়লাযুক্ত ঘা ; মাথার চুল পড়িয়া
যাওয়া ; মাথা হইতে সিরাম (Serum) নামক ফেণবৎ তরল কলতানি
নির্গত হওয়া (মেজিরিয়াস) ।

চক্ষু । চক্ষুর গোলকে কন্কনানির জ্বায় যাতনা (সিমিসিফ্,
স্পাইজেল, রুটা) ।

নাসিকা । ঠাণ্ডা লাগিলে বেক্রপ হয়, নাভারস্কে সেক্রপ শুষ্কবোধ ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দন্তশূল ; মুখে প্রচুর পরিমাণে
তিক্তবাদ বিশিষ্ট চট্ চট্টিয়া আঠা লাল উঠা ; মুখে ভায়ার জ্বায় চট্ চট্টিয়া
জ্বাদ (মার্ক) । টন্সিল্ (Tonsils) শুষ্ক, বেদনা বা টাটানিযুক্ত ; ডেলার
জ্বায় কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে বেক্রপ হয়, গলার মধ্যে সেক্রপ অমুখ
বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আহার বহা গলনালী দিয়া পাকস্থলী পর্য্যন্ত
জ্বালা এবং শুষ্কবোধ (ক্যাপ্স) ।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত ক্ষুধা এবং পিপাসা ; পাক-
স্থলীতে অনবরত অত্যন্ত বৃষ্ট সম্বলিত অমুখবোধ ; টক উদগার উঠা ;
পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা (আস্, বেল্, কল্চ্, কন্স) ।
উদরে কৰ্ভনবৎ এবং শূলবেদনার জ্বায় তীক্ষ্ণ বেদনা ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের জননেন্দ্রিয়ার অতিরিক্ত অবসন্নতা বা
দুর্বলতা (আগারিকান্, আগ্নাশ্, কোনাগাস্) ; একটা বা উভয় অণু-
কোষেই স্নায়ুশূলের জ্বায় প্রবল বেদনা (ষ্টাকিন্) ; হস্তমৈথুনের অনিবার্ণ
ইচ্ছা ; খাত্ত তরল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জীসহবাসের শক্তির দুর্বলতা,

স্তব্ধবায়ু (Melancholia) (চায়না, কন্-আস্) । জীলোকের জরায়ুতে অনবরত কনকনানির ভায় বেদনা বা যাতনা; গৰ্ভশ্রাব হওয়া বা ধাতু (দিসিয়া) ; জরায়ুর মুখ বিস্তৃত বা খোলা এবং পশ্চাৎদিকে আঁকুটে ও নেতার ভায় শিথিল ; জরায়ুর দুর্বলতার দরুণ প্রচুর বা অতিরিক্ত রক্তশ্রাব (কলোফ্, চায়না), রক্ত কালচে এবং চাপ্ চাপ্ থানা থানা (ক্রোকাশ্, সাইক্রেমেন্, ইগ্-নেস্, সাবাইনা) ; সম্ভাবন প্রসবের পর জরায়ুর দুর্বলতা, কোমলতা এবং শিথিলতার দরুণ অতিরিক্ত রক্তশ্রাব (Post-partum haemorrhage) (কলোফ্) ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । নড়াচড়াতে অস্বথের বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে ও স্থির বা নিস্তব্ধভাবে থাকিলে অস্বথের উপশম ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । কলোফিলান্, সাইক্রেমেন্, চায়না, ক্রোকাশ্, হায়ামেলিস্, ইগ্-নেসিয়া, সাবাইনা ।

ডাইলুশন বিচার । এই ঔষধ দ্বারা যে কএকটি রোগীর চিকিৎসা করা গিয়াছে, তাহাতে লেখক ১ম দশমিক ক্রমের আরোক এবং মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহৃত করিয়াছিলেন । এতদ্বিত্ত ইহার মাত্রা সম্বন্ধে তিনি আর অধিক কিছু বলিতে পারেন না ।

পিটোসেলিনাম্, -লিটোস্

(PETROSELINUM, -PERTOS.)

এই গাছের সমুদয় অংশ কাটা অবস্থায় যথানিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত করিতে হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা মূত্রনালীর শৈল্পিক ঝিল্লী অতি প্রবলরূপে আক্রমণ করে, বাহার দুরূপ উক্ত ঝিল্লী অত্যন্ত উত্তেজিত এবং প্রদাহযুক্ত হইয়া থাকে । অতএব অল্পদিনের পুরাতন এবং অনেক দিনের পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগের (Subacute Gonorrhœa and Gleet) চিকিৎসায় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মূত্রযন্ত্র এবং জননেদ্রিয় । মূত্রনালী দিয়া হৃথের ভায় ক্লেদ

নিসরণ ; মূত্রনালীর মুখ স্লেষ্মা দ্বারা রুদ্ধ হইয়া থাকে ; মূত্রনালী দিয়া হরি-
ত্ৰাবর্ণের ক্লেম নিসরণ (হাইড্রাট্, পাল্‌স্) ; প্রস্রাব করা কালীন^৮ মূত্র
নালীর গোড়ায় জ্বালা ; মূত্র নালীর গোড়ায় কসিয়া বা বাটেরা ধরার জ্বা
কাতনা, মূত্রত্যাগের পর যাহা কর্তনব্যং বা চিড়িক মারার জ্বা যাতনায়
পরিণত হয় (ক্যানাবিস্-জ্বাট্) ; মূত্রনালীর মধ্যে আগা গোড়া হামা দেওয়া
বা হুড়্-হুড়ীর জ্বা যাতনা অমুভূত হয় ; মূত্রনালীর গোড়ার পশ্চাৎভাগে
চাপাবোধ ; মূত্রনালীর গোড়ায় বারবার হুড়্-হুড়ী ; বারবার প্রস্রাব করার
ইচ্ছা, মূত্রনালীর গোড়ায় হুড়্-হুড়ীর দরুণ যাহার উল্লেখ হয় ; পুরুষাঙ্গ
অস্বাভাবিকরূপে খাড়া হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গ বাঁকিয়া পড়ে ;
শেষ রাজি বা ভোর হওয়ার সময় ঘুমের ঘোরে অনিচ্ছাপূর্বক বা অসাড়
থাকু নির্গমন (স্বপ্নদোষ) ।

ব্যবহার । অল্প এবং অধিক দিনের পুরাতন আকারের প্রমেহ
রোগে (Subacute Gonorrhœa and Gleet) পিট্রোসেলিনাম্ ব্যবহার্য্য ।
ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, ইহা যত্নসূত্রে কোইনাইনেব
জ্বা আক্রামণ করে এবং সেই হিসাবে সবিরাম জ্বর এবং স্নায়ুশূলে কোই-
নাইনের পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করিয়া তিনি অনেক রোগীর চিকিৎসায়
উপকার পাইয়াছেন ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ক্যানাবিস্, ক্যানাবিস্ জ্বাটাইবা
ক্যোপেইবা, সাল্‌ফেট্ অব্ কোইনাইন্ ।

ডাইলুশন বিচার । এই ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে লেখক বিশেষ
কিছু বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন
নাই । প্রমেহরোগে যে কএকটি রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া
গিয়াছে, উহার সমুদয় রোগীকেই ১ম দশমিক ক্রমের আরোক এক ফোঁটা
মাত্রায় ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । পুরাতন আকারের মেলেরিয়া জনিত
সবিরাম জ্বরাক্রান্ত ২৩টি রোগীর চিকিৎসায় ইহার মূল আরোক ২৩ ফোঁটা
মাত্রায় ব্যবহার করিতে হইয়াছিল । ইহার মিশ্র আরোক ব্যবহার করিয়া
কোনও ফল পাওয়া যায় নাই ।

এরাম্ ট্রিফিলাম্,-এরাম্-ট্রিফ

(ARUM TRIPRYLLUM.-ARUM TRIPH.)

এই গাছের কাঁচা শিকড়ের রস যথা মিশ্রমে স্ফাগ্ন অব্ মিক্সে মিশাইয়া মিশ্র গুঁড়া প্রস্তুত হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া ।• যুগ্মহস্ত এবং উহার পশ্চাৎ ভাগের নৈস্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল এবং বারুনল ও উহার উপরিভাগের নৈস্মিক ঝিল্লীর উপরও ইহার কতক পরিমাণে কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দক্ষণ আক্রান্ত অংশ প্রবল রূপে প্রদাহযুক্ত, আবেগে স্তম্ভীত এবং উহাতে ক্ষতও হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । রোগী কি করিতেছে অথবা তাহাকে অন্ত্রে কি বলিতেছে তাহা সে কিছুই বুঝিতে বা জানিতে পারে না ; প্রলাপের অবস্থায় নাকের মধ্যে আঙ্গুল খুঁসিয়া দেওয়া এবং নাক চুল্‌কানি (সিনা); ঠোঁট খোঁচা ।

• মস্তক । প্রবল শিরঃপীড়া ।

চক্ষু । চক্ষে আলোক সহ না হওয়া ; চক্ষুর উপরের পাতার কাপনি বা ধড়্‌কড়ানি (আস্) ।

নাসিকা । নাকদিয়া ছানার জলের স্তায় ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া জালা উৎপাদক জলবৎ তরল ক্রেন নিঃসরণ, যাহার দক্ষণ নাসারন্ধ্র এবং উপরের ওষ্ঠের ছাল উঠিয়া যায় (এইলাস্, অগ্নি-কার্ক, আস্, সিপা, মার্ক); নিঃশ্বাস বা স্ফিয়ান এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার হাঁচি, রাগ্নিতেই যাহার বৃদ্ধি হয় ; নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হওয়া এবং তদ্রূপ মুখ দিয়া নিঃশ্বাস কেলিতে বাধ্য হওয়া (এরাম্) ; জলাদি পান করার সময় জলাদি নাকের মধ্যে প্রবেশিত হয় ; ক্ষত হইয়া নাসারন্ধ্র ফাটিয়া যায় (আণ্টি-ফুড্, গ্রাক্, নাইট্রিক্-আস্) ; বারম্বার নাক খোঁচা বা নাক চুল্‌কানি (সিনা, সেলিন্) ।

মুখমণ্ডল । অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে ঘেরূপ হয়, নাক, ঠোঁট এবং মুখমণ্ডল সেরূপ ফাটিয়া যায় (আণ্টি-ফুড্, গ্রাক্) ;

অপরাজে মুখমণ্ডল এবং মাথায় অত্যন্ত উষ্ণাভাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি ও নাকদিয়া স্লেয়া নির্গমন; যতক্ষণ রক্ত না পড়ে, ততক্ষণ খট্টাট চুল্কার; ঠোঁটের কোণ ক্ষত এবং ফাটায়ুক্ত ও উহা দিয়া রক্ত পড়া (আণ্টি-কুড, গ্রাক, লাইকোপ, নাইট্রিক-অ্যাস) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা ফাটায়ুক্ত এবং উহাতে বেদনা ও জ্বালা; চামড়া উষ্ণিগে গলে বেরুপ হয়, জিহ্বার গোড়া এবং তালুকার সেরূপ অন্তর্ভূত হওয়া; গালগহ্বরে ছাল উষ্ণিগে ক্ষত হওয়া এবং উহা হইতে রক্তপড়া; মুখের মধ্যে (শিশুগণের) এত জ্বালা এবং টাটানির উগ্রেক হয় যে, উহার দরুণ রোগী জলাদি কিছুই মুখে লইতে চাহে না এবং মুখে কিছু দিতে গেলে সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; মুখে প্রচুর পরিমাণে উগ্র জ্বালা উৎপাদক লাল উঠা । হ্রাস্তির নিম্নস্থিত গ্রন্থির ক্ষীতি (অরাম্, ব্যারাইটা-কার্ক); গলাব মধ্যে আঁটাবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি; কোন প্রব্য গিলিবার সময় কোমল তালুকা (Soft-palate) ক্ষীত হওয়ার ভায় অন্তর্ভূত হয়; তালুকা এবং গলার মধ্যে টাটানি, শুষ্কবোধ, জ্বালায়ুক্ত বেদনা ও ক্ষত; গলার মধ্যে টাটানির দরুণ রোগী আহাৰ বা পান করিতে চাহে না ।

মূত্র । কটাবর্ণের জলবৎ শুষ্ক উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরস্থ আহাৰ প্রব্যাদির গন্ধযুক্ত উপগার উঠা ।

মূত্রযন্ত্র । প্রচুর পরিমাণে কিকা মূত্রতাগ; মূত্র পরিমাণে অল্প বা একবারে মূত্রাবরোধ (আরক্ত জরে) ।

শ্বাসযন্ত্র । অনেকক্ষণ গান করা বা বক্তৃতা দি করার দরুণ শ্বর-ভঙ্গ (আর্জেন্ট-মেট, আর্জেন্ট-নাইট্রিক, ফস্); বায়ুনলে শ্বাসের সঞ্চার; শ্বর সকল সময় এক রকম থাকে না; ফুস্কে টাটানি ।

চর্ম্ম । গায় আরক্ত জরের ফুস্ফুড়ীর ভায় ফুস্ফুড়ী এবং উহাতে চুল্কানি ও উহা মিলাইয়া গেলে মরা চামের ভায় খোসা উষ্ণিগে যায় (এপিস্, বেল, রাস্ টঞ্জ, ট্র্যাম্) ।

ব্যবহার । সাংখ্যাতিক আকারের আরক্ত জর (Malignant Scarlatina); বক্তা বা গায়ক দিগের গলার মধ্যে বেদনা বা ক্ষত;

লক্ষণ বিশেষে মুখগহ্বর, জিহ্বা, গাল গহ্বরের প্রদাহজনিত অশুধ; অর বিকীর ইত্যাদি অশুধে এরাম্ টিকিলাম ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সাধারণতঃ প্রাতঃকালে, শরন করিয়া থাকিলে, উত্তর পশ্চিমে বাতাসে অশুধের বৃদ্ধি; শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে অশুধের উপশম।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। এইলাক্সাম্, আমোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকাম্, আর্জেন্টাম্ নাইট্রিক্, আর্সেনিক্, ব্যাপ্টিসিয়া, কষ্টিকাম্, সিপা, নাইট্রিক্ অসিড্, ক্যালী-আয়োডাইড্, হাইড্রাষ্টিস্, ফস্ফরাস্, ফাইটোলাকা, রাস্টেক্স, ট্রিমোনিয়াম্, সাইলিনিয়া, সাল্ফার।

প্রতিষেধক ঔষধ। মাখন বা মাখন সমেত দুগ্ধ।

ডাইলুশন বিচার। ডাক্তার লিপির (Dr. Lippe) মতে এই ঔষধের ঙ্ঠ ও তদপেক্ষা উচ্চ ক্রম ব্যবহার্য্য। এই ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই।

অস্মিয়াম টেট্রক্সাইড, -অস্মিয়াম্.

(OSMIUM TETROXIDE, -OSM.)

ইহা এক প্রকারের ধাতু বিশেষ। যথা নিয়মে স্ফাগাব অব্ মিক্ মিশাইয়া ইহার মিশ্র ঙ্ঠা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কদেব্রিকা দিয়া ইহা প্রধানতঃ শ্বাসযন্ত্র এবং মূত্রকোষ আক্রমণ করিয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্বদা বিমর্ষ ভাব, খিটখিট করা এবং অধৈর্য্য হওয়া; আপনার মানসিক দুর্বলতার বিষয়ে জ্ঞান; কথা বলিবার সময়ে যথাযোগ্য শব্দ ব্যবহার করাতে অশক্তি (ডাল্‌ক্, প্রাধাম্); কাজ কর্তব্য করিতে অনিচ্ছা।

মস্তক। মাথায় ভারি বোধ এবং যুস্মুসে বেদনা।

চক্ষু । চক্ষুর কোটরে প্রথমে বেদনা ; চক্ষুর পাতা আক্কেপিকরূপে বন্ধ হয় ; চক্ষে কম বা আঁধার দেখা ; কৃয়াশার মধ্যদিয়া দেখিলে ঐক্লপ হয়, পুস্তকের অক্ষরগুলি সেরূপ বাপ্পা দেখায় (সাইক্লোমেন, ফস্, জেলন্স) ; চক্ষে জালাযুক্ত বাতনা এবং চক্ষুদিয়া প্রচুরজল পড়া ; মোমবাতির আলোক যেন নীলের আভাযুক্ত চক্রাকারে পরিবেষ্টিত বলিয়া অনুভূত হয় (ফস্) ; বা আলোক যেন রামধনুক দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার ভাৱ দেখায় ।

কর্ণ । ডাইন্ কানে টন্ টন্ শব্দ হওয়া ; সঙ্ক্যার সময় কর্ণশূল, বাহা প্রথমতঃ ডাইন্ কানে আরম্ভ হয় এবং তৎপর বাম কানে বিস্তৃত হয় ।

নাসিকা । সন্দি এবং তদ্রূপ বারম্বার ইঁচি (একন্, অ্যাজেন্ট্, ইউফর্ক্) ; নাকের মধ্যে জালাযুক্ত উত্তেজনা বা চড়চড়ানি ; নাসারন্ধ্রে ঠাণ্ডা বাতাস সহ হয় না (হাইড্রাট্, সোরিনাম্) ; নাকের আত্মাণ শক্তির হ্রাস ।

মুখগহ্বর । মাড়িতে কন্‌কনানি ; চৰ্কনের সহায়কারী পেশিতে বেদনা ; জিহ্বা লেপযুক্ত, উহার ধাব ধশ্‌খশে এবং উহার মধ্যভাগ লাল রেখা দ্বারা আবৃত ; মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা ; মুখে রক্তের স্বাদ ; মুখে ধাতুর স্বাদ (ইস্‌কুল, ককিউল, মার্ক্, নেজা) ।

পাকস্থলী এবং উদর । উদগার উঠা ; বমনোন্মেষণ ; বমন ; পেট যেন ঠোণ মারিয়া থাকে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা বমী বমী করা ও তদ্রূপ অত্যন্ত কষ্টবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর মধ্যে বেদনা ও ভারিবোধ । উদর অত্যন্ত স্ফীত এবং বিস্তৃত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে অত্যন্ত টাটানি এবং গড়্‌গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া ।

মল এবং মলদ্বার । মলত্যাগের সময় এবং উহার পর গুহ দ্বারে জালা (আস্, ক্যাস্, আইরিস্, মার্ক্) ; উদরাময় ; কোষ্ঠবন্ধ ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র আয়ুর্‌মেন্যুক্ত(মার্ক্-কর, ফস্, কাইটোল্, প্রাষাম্), অত্যন্ত উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট, কাল্‌চে কটাবর্ণ এবং পরিমাণে অল্প (প্রাষাম্) এবং উহাতে উজ্জল লাল ভলানি পড়ে ; মূত্রকোষের ট্রাইট্‌ন্‌ ডিজিজ্ (Bright's Disease) ।

পুরুষ জননেন্দ্রিয় । অণুকোষ এবং শুক্র নিঃসারক স্ত্রে বেদনা (ক্রিমিটিন্, স্পঞ্জিয়া) ; পুরুষাঙ্গ অত্যন্ত প্রবল বেগে খাড়া হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । বায়ুনলের উপরিভাগে কুট্‌কুটানি বা হুত্‌হুত্‌র নরুণ থক্‌ থক্‌ করিয়া কাশি; বায়ুনলের উপরিভাগে বেদনা বা টাটানি, জালা এবং ছাল উঠিয়া গেলে বা চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, সেদ্রুপ স্বাতনা (রাস্‌-টল্ল্‌, কমেজ্‌); বায়ুনলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মার সঞ্চার (আস্টি-টার্‌ট্‌, ইপিকাক্‌, কন্‌, ষ্টানাম্‌); স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুনলের উপরিভাগে বেদনা; আক্ষেপিক্‌ কাশির বারম্বার আক্রমণ (কোরেল্‌, কব্‌, ডুসিয়া); থক্‌ থক্‌ করিয়া শুক্‌ কাশি; শ্বাসকষ্ট; বৃকে অঁটা এবং কষ্টাত্‌-ভব (মার্ক্‌-কর, কন্‌); কাশিবার সময় বক্ষস্থির নীচে বেদনা, যাহা বৃকের দুই পার্শ্বেই বিস্তৃত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জালাযুক্ত টাটানি, যাহার দরুণ মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থানে ছাল উঠিয়া কাঁচা বা হইয়াছে; অনেক ক্ষণ কাশির পর গলা দিয়া ডেলা ডেলা, চট্‌চট্‌য়া আঁঠা শ্লেষ্মা নির্গমন ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরে চাপিয়া ধরার স্থায় বেদনা ।

চর্ম্ম । হাতের পাতার পশ্চাৎভাগে লাল দাগ পড়া; হাতে এবং গালে অনেক ফুসুড়ী; বাহুতে লাল্‌চে কটা রঙ্গের ফুসুড়ী এবং উহা শুকাইয়া মরা চামের স্থায় খোসা উঠিয়া যাওয়া; পায় তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বিশিষ্ট ফোঁস্কার স্থায় ফুসুড়ী এবং উহার গোড়া লাল রঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত; কোন কীট হামাদিয়া গেলে যেরূপ হয়, গায় সেদ্রুপ চুলকানি বা হুত্‌হুত্‌ ।

ব্যবহার । রোগ চিকিৎসায় অস্মিয়াম্‌ কমই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় । বায়ুনল প্রদাহ (Bronchitis), ফুফুস প্রদাহ (Pneumonia), হপিং কক্‌, ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ্‌ (Bright's Disease) ইত্যাদি অস্থখে ইহা ব্যবহার্য্য বলিয়া চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলক্ষয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কর্তনবৎ বা চিনুচিনে বেদনা ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ম্যাগনেস্‌, সেলিনিয়াম্‌, আর্সিনিকাম্‌ ।

ডাইলুশন বিচার । এই ঔষধের মাত্রা সযত্নে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই । ইহার ৩য় ক্রমের গুঁড়া এবং ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক দ্বারা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ।

সেলিনিয়াম,-সেলিন্

(SELENIUM,-SELEN.)

ইহা গন্ধকের জায় এক পদার্থ বিশেষ। কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত সেলেনিয়াম্ ক্রয় করিয়া যথানিয়মে স্নেহার অবস্থিকে মিশাইয়া মিশ্র গুড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। বায়ুনের উপরিভাগের উপরই ইহার প্রধান কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ উক্ত বস্তু প্রদাহযুক্ত হয়। জন-নেস্ত্রিয়ের উপরও ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ উহার দুর্বলতা এবং তদ্রূপ সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের অত্যন্ত জড়তা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হওয়া ও সকল বিষয়ে বৈরাগ্য বা অমনোযোগ (কার্লো-বেজ্, চায়না, ফস্); সকল বিষয়ই ভুলিয়া যাওয়া, বিশেষতঃ আপন কার্য্য কর্ত্ত্বের বিষয়, কিন্তু যখন অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় শয়ন করিয়া থাকা যায়, তখন উক্ত বিষয় গুলি সুদৃশ্যই স্বরূপ হয়; কোন বিষয় সহজে বুদ্ধিবारे অশক্তি; মানসিক পরিশ্রমে শ্রান্তিবোধ; কোন কাজ করাতে অশক্তি।

মস্তক। নেসা করিলে ঘেঁষা হয়, সেরূপ মাথাঘোরা (আগারিকাশ্, নাক্স-বম্, ট্রামন্); আচড়াইবার সময় মাথার চুল পড়িয়া যায়; চক্ষুর ক্র, গোপ এবং পুরুষাঙ্গ ও বোনিদেশস্থিত লোম পড়িয়া যায়।

নাসিকা। নাকের মধ্য এবং উহার পাতায় চুলকানি; নাকের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দেওয়ার ইচ্ছা বা নাক খোঁটা (সিনা); নাকদ্বিধা হরিদ্রাবর্ণের, গাঢ় ভিজা গোঁদের জায় প্লেগ্মা নির্গমন।

মুখমণ্ডল। তৈল বা মাখনাদি মাখাইয়া রাখিলে ঘেঁষা হয়, মুখ-মণ্ডলের চর্ম্ম সেরূপ চক্চকে; মুখমণ্ডলে যেন খুস্কীর জায় মরা চাম উঠে (পাল্ফ); মুখমণ্ডল এবং হাত যেন জীর্ণ জীর্ণ হয় (নেট্রাম্-মিউর)।

মুখগহ্বর। দাঁত গুলি প্লেগ্মা দ্বারা জড়িত; তোত্‌লার জায় কথা

বলা; অতি কষ্টে মুখ সঞ্চালন করিতে পারা যায় (কষ্ট, ক্যানাবিস-ইন্ড, ট্রামক) ।

উদর । উদরের ডাইন পাখে, শেষ পীড়ার হাড়ের চতুর্দিকে, বেদনা, নিশ্বাস টানিবার সময়ই যাহা অধিক অম্লভূত হয় এবং যাহা মূত্র কোষ প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ও উক্ত প্রদেশে চাপ দিলে অত্যন্ত বেদনা বা টাটানির উদ্রেক হয় ।

মল । মলের মধ্যে যেন চুলের জায় স্থতা থাকে ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র কাল্টে এবং পরিমাণে অল্প; সন্ধ্যার সময় মূত্র লালবর্ণ; চলিবার সময় অসাড়ে মূত্র নিঃসরণ; মল মূত্র ত্যাগের পর মূত্র আপনা আপনিই গড়াইয়া পড়ে ।

পুরুষ জননেন্দ্রিয় । জীসহবাসের সময় পুরুষাঙ্গ যথোচিত পরিমাণে খাড়া হয় না এবং সামান্য জী আলিঙ্গনেই ধাতু নির্গত হয় ও অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রমাগত পুরুষাঙ্গ বিন্ বিন্ করে; জীসহবাসের পর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়া এবং থিট্ থিট্ করা ও কোমরে দুর্বলবোধ; ধাতু অত্যন্ত তরল এবং উহাতে স্বাভাবিক গন্ধ থাকে না; মনে অনবরত জীসহবাস বিষয়ে ভাবের উদয় হয়, কিন্তু জীসহবাসের শক্তি একবারেই থাকে না; বসিয়া থাকা কালীন, নিদ্রাবস্থায়, চলিয়া বেড়ানোর সময় এবং মলত্যাগের সময় ধাতু নির্গমন (আগ্নাশ্, সাইলিসি) ।

শ্বাসযন্ত্র । গাণ করিতে আরম্ভ করিলে বা অনেকক্ষণ কথা বলিলে স্বরভঙ্গ (আর্জেট্-মেট্, এরাম্, ফস্); প্রত্যেক দিন প্রাতে গলা দিয়া থক্ থক্ করিয়া স্বচ্ছ ডেলার জায় শ্লেষ্মা নির্গমন এবং কখন কখন শ্লেষ্মায় রক্তও মিশ্রিত থাকে; প্রাতঃকালে কাশি এবং বারম্বার কাশির পর বুকে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করাত্ত পর গলা দিয়া শ্লেষ্মা এবং রক্ত নির্গমন ।

জীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । মাথা ঘুরাইবার সময় ঘাড় শক্ত হয় বা উহা মোয়ান যায় না; প্রাতঃকালে কোমরের পশ্চাত্তাগে অবশবোধ বা উহা সঞ্চালনে অশক্তি ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । রাত্রিতে হাতে ছিঁড়িয়া ফেলার জায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মণিবন্ধ সঞ্চালনে কেড়্ কেড়্,

শব্দ হওয়া ; হাত পা শীর্ণ হওয়া ; সন্ধ্যার সময় হাতের পাতা এবং পায়ের পাতার সন্ধিতে চুলকানি ; পায় ক্ষত এবং পায়ের আঙ্গুলে ফোঁস পড়া ; পায়ের ডিম্ব এবং পায়ের পাতার ভগ্নায় খিলখিল (কাঙ্ক-কাঙ্ক, সাল্‌ফ্‌) ; মোহক জ্বরের পর পায় দুর্বলবোধ এবং পক্ষাঘাতের আশঙ্কা ।

জ্বর । পর্যায়ক্রমে শীত এবং উষ্ণামুতব ; শরীরের কেবল কোন এক অংশে বাহ্যিক উষ্ণ এবং জ্বলামুতব ; সামান্য পরিশ্রমেই বুক, বোগল এবং জননেন্দ্রিয়ে ঘর্ষ হওয়া ; ঘুমাইলেই ঘর্ষ হওয়া ; ঘর্ষ লাগিয়া বিছানার কাপড় হরিদ্রাবর্ণ এবং কড়কড়ে হয় ।

ব্যবহার । কণ্ঠনালীর প্রদাহ ; স্ফোটক কণ্ঠনালী সঞ্চয়ী প্রদাহের আরম্ভ হওয়ার অবস্থা (Incipient stage of Tubercular Laryngitis) ; ধ্বজভঙ্গ ; স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসে অত্যাচার বা হস্ত মৈথুন জনিত অমুখ ইত্যাদিতে সেলিনিয়াম ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । ঘুমাইয়া বা শয়ন করিয়া থাকার অনিবার্য্য ইচ্ছা ; হঠাৎ দুর্বল হইয়া পড়া ; সন্ধ্যার ধমনি ইত্যাদি রক্তবহা নালীতে দপ্পপানি (গ্লোয়েন, সিপিয়া), উদরেই বাহ্যে অধিক অমুত হয় ; হঠাৎ প্রবল বাতাসে (বাতাস উষ্ণ হইলেও) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মাথা ইত্যাদিতে বেদনা ; মুখমণ্ডল, ঊরু এবং হাত শীর্ণ হওয়া ; নিদ্রার পর এবং গায় হঠাৎ বাতাস লাগিলে বেদনা এবং অনেকানেক লক্ষণের বৃদ্ধি ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আর্জেন্টাম্ মেটেলিকাম্, কটিকাম্, কঙ্করাস্, ষ্ট্যানাম্ ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ইগ্নেসিয়া, পাল্‌স্‌টিল।

ডাইলুশন বিচার । ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই । ইহার ৬ ও তদপেক্ষা উচ্চ ক্রমই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া পাকে, একপ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় ।

গ্রাটিয়োলা অফিসিনেলিস্,-গ্রাটিয়োল্

(GRATIOLA OFFICINALIS,-GRATIOL.)

এই গাছের সমুদয় অংশ দিয়া যথা নিয়মে মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । আহারবহানালীর (Alimentary Canal) শৈল্পিক বিস্তীর্ণ ইহা প্রধানতঃ আক্রমণ করিয়া থাকে, যাহার দক্ষণ উদরাময় হয় । ইহা কতকপরিমাণে মূত্র যন্ত্রও আক্রমণ করিয়া থাকে । ডাক্তার প্যারেরার (Dr. Pereira) মতে সুস্থ শরীরে ইহা রেচক, বমনোৎপাদক এবং মূত্রের সঞ্চারের বৃদ্ধি কারক ঔষধের ভ্রায় কার্য করে এবং অধিক মাত্রায় খাইলে ইহা এক উগ্র বিবেক ভ্রায় কার্য করে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথায় রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণাহতব ও নিদ্রাবেশ বা নিদ্রালুতা (শুপিয়াম্) ; মাথায় ঠিক উপরিভাগে ঠাণ্ডাবোধ যাহা উষ্ণাহতবে পরিবর্তিত হয় ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে মাথায় পশ্চাৎ ভাগে বেদনা, মাথা হেট বা নিচু করিয়া উপড় হইয়া থাকিলে যাহার উপশম হয় ।

মুখমণ্ডল । ফুলিলে ঘেরূপ হয়, মুখমণ্ডলে সেরূপ কসিয়া বা বাটিয়া ধরা ; অনেক দিন ধরিয়া প্রাতঃকালে উপরের ওষ্ঠের স্ফীতি (বেল, ক্যাক্-কার্ক্) যাহা কএক ঘণ্টার মধ্যেই সারিয়া যায় ।

মুখগহ্বর । কোন প্রকারের ঠাণ্ডা দ্রব্য লাগিলে বা ঠাণ্ডাবাতাসে দাঁত কন্ কন্ করে (কোকাস্, ষ্টাকিস্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহারে অনিচ্ছা বা অকুচি ; উদগার উৰ্দ্ধা ; বমনোদ্বগ এবং বমন ; পিত্তযুক্ত পদার্থ বমন (আইরিস্, নাক্স-বম্, পডোফ্) ; বিনা চেষ্টায় হরিদ্রাবর্ণের টক, তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট জল বমন ; পাকস্থলীতে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বগ ও সার্বাসিক অস্থখ বোধ ; আহারের পর পাকস্থলীর অত্যন্ত স্ফীতি এবং বিস্তৃতি (চায়না, লাইকোপ্) ; একখানি পাথর চাপাইয়া রাখিলে ঘেরূপ হয়, পাকস্থলীতে

সেরূপ চাপাবোধ, আহারের পর বাহার বৃদ্ধি হয় (আন্, ব্রাই, নাক্স-বন্স, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্)। উদরে গড়্-গড়্, কল কল শব্দ হওয়া (আলোগ্, লাই-কোপ্); উদরে অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং পেট কামড়ানী ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্ক দ্বারের সংকোচন এবং উহাতে চুলকানি; সবুজের আভাযুক্ত হরিদ্রা বর্ণের তরল ভেদ এবং দাস্তের পর শুষ্কদ্বারে জ্বালা; সবুজবর্ণের ফেণাযুক্ত জলবৎ তরল ভেদ যাহা সজোরে শুষ্কদ্বার দিয়া নির্গত হয় (ক্রোটন্, নেট্রান্-কার্ক্, থুজা); বেদনাহীন উদরাময়; হরিদ্রা বর্ণের স্বাভাবিক মলের ভ্রায় তরল মলত্যাগ; উজ্জল হরিদ্রাবর্ণের তরল মলত্যাগ এবং মল ত্যাগের পর শীতবোধ; জলবৎ তরল মলত্যাগ এবং মলত্যাগের পর শুষ্ক দ্বারে জ্বালা এবং চড়্-চড়ানি ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রত্যাগের সময় এবং উহার পর মূত্রনালীতে জ্বালা (ক্যানাবিন্-স্যাট্, ক্যাঙ্ক্, মার্ক্-কর); মূত্র পরিমাণে অল্প এবং লাল্‌চ ও মূত্র ত্যাগের পর মূত্র কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে ঘোলাটিয়া হয় ।

ব্যবহার । হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসায় ইহা অতি কমই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় । তবে উদরাময়েই ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা । টেষ্ট (Teste) বলেন যে, যে প্রকার তরুণ রোগে ক্যামোমিলা ব্যবহার্য্য, পুৰাতন আকারের সে প্রকার রোগে গ্রাটিয়োলা উপকারী । তাঁহার মতে উন্মত্ততা (Mania), পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা বা ক্যামোমত্ততা (Nymphomania), মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens) এবং যে প্রকার শায়শূল কাকির অপব্যবহার জনিত হয় তাহাতে গ্রাটিয়োলা দ্বারা অনেক সময় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । তিনি অনেক সময় কটিকামের পর ইহা ব্যবহার করিয়াছেন ।

সমগ্রণ বিশিষ্ট ঔষধ । ক্রোটন্, নেট্রান্ কার্ক্, থুজা, বিরেট্রাম্ আল্‌বাম্ ।

ডাইনুশন বিচার । ডাক্তার হিউজ্ (Hughes) বলেন যে, ইহার মূল আরোক ২০ কোঁটা মাত্রা খাইলেও স্তম্ভ শরীরে কোন অস্বাভাবিক হইতে দেখা যায় না । এতদ্ভিন্ন ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।

থেরিডিয়ান্ কিউরেস্‌য়াবিকাম্,-থেরিড্

(THERIDION CURASSAVICUM,-THERID.)

ইহা এক প্রকারের মাকড়সা বিশেষ। একটা মাকড়সা ৫০ ফোঁটা (মিনিম্.-Minim) প্রফুন্সিটিটে ১০। ১২ দিবস ভিজাইয়া রাখিয়া মূল আরোক প্রস্তুত করিতে হয়। যথা নিয়মে স্নেহ অর্থাৎ মিকে মিশাইয়া ইহার মিশ্র গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণক্রিয়া। ইহা মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা আক্রমণ করে, যাহার দক্ষণ মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, স্নায়ুশূল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর অন্ত্রও হইতে পারে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনে হয় যেন সময় অতি নীঘ্র নীঘ্র কাটিয়া বাইতেছে; সামান্য কারণেই চমকিয়া উঠা (ককিউল, সিপিয়া, সাইলিনি); কোন কাজ কর্ত্ত্ব করিবারে অনিচ্ছা।

মস্তক। মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষ্ট এবং কখন কখন বমনও হয়, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, সামান্য নড়া চড়াতে, চক্ষু বুজিলে, নোকা জাহাজাদিতে চাপিয়া বাতায়াতে যাঁহার বৃদ্ধি হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম; মাথা যেন পুরু হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; রোগী (জীলোক) মনে করে যেন তাহার মাথা অস্ত্র লোকে, তাহার আপন মাথা নহে এবং সে মাথা খাড়া করিতে পারে না; চলিতে আরম্ভ করার সময় মাথা ধরা; মাথার সম্মুখ ভাগে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দপ-দপানি যাহাঁ মাথার পশ্চাৎভাগেও বিস্তৃত হয়; ক্রুর মাথা ধরা তাহা রোগী বুঝিতে পারে না এবং অস্ত্রকেও সে বুঝাইয়া দিতে পারে না; বাম চক্ষুর উপর এবং কপালে আড়া আড়ি দপ-দপানি, শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে, অস্ত্র লোকে ঘরের মেঝেতে চলিয়া বেড়াইলে, সামান্য গোলমাল বা শব্দ শুনিলেই যাহার বৃদ্ধি হয়; মাথায়, চক্ষুর পশ্চাৎভাগে বেদনা এবং উহাতে ভারি এবং ঘুস্ ঘুসে রক্তের চাপা বোধ।

চক্ষু। চক্ষুর সম্মুখে একখানি সরু কাপড় রাখিলে যেক্রপ হয়,

চক্ষুর সম্মুখে সেরূপ ধড়ফড়ানীর দরুণ চক্রে বাগ্পনা দেখা, চক্ষু বুজিয়া থাকিলেও যাহা অহুত হয়, থাকিয়া থাকিয়া যাহার উদ্ভেক হয় এবং যাহার দরুণ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; হিষ্টিরিয়া রোগেও এইরূপ হইয়া থাকে ।

কর্ণ । ঝরণা বা প্রস্রবণ দিয়া জল পড়িলে বেরূপ হয়, কানের মধ্যে সেরূপ নৌ নৌ শব্দ হওয়া ।

নাসিকা । পুরাতন আকারের সর্দি এবং তদ্রূপ নাক দিয়া দুর্গন্ধ যুক্ত গাড়, হরিদ্রাবর্ণ অথবা হরিদ্রার আভাযুক্ত স্লেথ্যা নির্গমন ।

মুখমণ্ডল । প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে রোগীর মুখমণ্ডল যেন স্পন্দহীন বলিয়া অহুত হয় ।

মুখগহ্বর । ঠাণ্ডা জল লাগিলে দাঁত কনু কনু করে (আন্টি-ক্রুড্, ক্যাক্-কার্ব্, টাকিন্) ; প্রত্যেক শব্দ যেন দাঁতের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ; মুখে লোন্তা স্বাদ ; মুখ গহ্বর যেন অবশ বা চট্‌চটিয়া আঠা হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত পিপাসা ; টক দ্রব্য পানের স্পৃহা ; মদ্যপানের স্পৃহা ; ত্রাণ্ডি নামক মদ্য পানের স্পৃহা ; তামাকু খাওয়ার ইচ্ছা ; খাওয়ার ইচ্ছা থাকে বটে, কিন্তু কি খাইবে সেবিষয়ে রোগী কিছুই স্থির করিতে পারে না ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই বমনোদ্বেগ ; কোন শব্দ শুনিলে বমনোদ্বেগ এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা ; চক্ষু বুজিলে বমনোদ্বেগ ; নৌকা জাহাজাদিতে যাতায়াতে বেরূপ হয়, সেরূপ বমনোদ্বেগ (ককিউল, পিটৌল) ; চক্ষুর সম্মুখে কোন প্রকারের চক্‌চকে বস্তু দেখিলে বমনোদ্বেগ ; নড়া চড়াতে বমনোদ্বেগ ; কথা বলিলে বমনোদ্বেগ ; গাড়িতে চাপিয়া দ্রুতবেগে চলিলে বমনোদ্বেগ । যকৃত প্রদেশে জ্বালাযুক্ত প্রবল বেদনা, স্পর্শনে যাহার বৃদ্ধি হয় ; কাঠবনী বা উকি উঠা ; পিত্ত বমন ; যকৃতে কোড়া, যাহার দরুণ মাথা ঘোরা এবং বমনোদ্বেগের উপশম হয় ; স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের পর কুঁচকিতে বেদনা ; নড়া চড়াতে কুঁচকিতে বেদনা ।

মল । প্রতিদিন অল্প পরিমাণে কোমল মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁপপাড়া ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের জীসহবাসের ইচ্ছার হ্রাস ; আহ্বারের পর

অন্নক্ষণ ঘুমাইলেও স্বপ্নে ধাতুনিঃসরণ (স্বপ্নদোষ)। জ্বীলোকের কোবনবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বা শেষ রক্তঃরোধ হওয়ার সময় হিষ্টিরিয়া ।

শ্বাসযন্ত্র । দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবার ইচ্ছা ; সজ্ঞারে দার্ব নিশ্বাস ; বুকের উর্দ্ধাংশ এবং বাম স্বকের নীচে স্ফূটীবিদ্যানের স্থায় প্রবল বেদনা বসন্তযাতনা যাহা গলার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

জ্বর । শীত কম্প এবং মুখে ফেণা উঠা ; মাথা ধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন ; হাড় বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন হাড় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে ; অত্যন্ত শীত বোধ, যাহার দরুণ মনে হয় যেন শরীর আর গরম হইবে না ; সামান্য চলিলেই ঘর্ম্ম হওয়া ।

ব্যবহাব । শিরঃপীড়া ; বমন সম্বলিত শিরঃপীড়া (Sick-headache); নৌকা জাহাজাদিতে চাপিয়া যাতায়াতের দরুণ বমন বা বমনোদ্বেগ (Sea-sickness) ; সূর্য্যঘাত (Sunstroke) ; নারীশূল ; হিষ্টিরিয়া ; যকৃতে ফোড়া ; যকৃৎকাশের প্রথমাবস্থা ; জ্বীলোকের শেষ রক্তঃরোধ হওয়ার সময় অমুখ ; গণ্ডমালা (যখন অল্প কোন ঔষধে উপকার না হয়) ; অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ হেতু অমুখ (Rachitis) ; অস্থি পোকায় ধরা (Caries) ; অস্থিকর বা অস্থি পচিয়া যাওয়া (Necrosis) ইত্যাদি অমুখে থেরিডিয়ান্ ব্যবহার্য্য । ডাক্তার বার্লোর (Dr. Barlow) মতে স্তনের নিম্নভাগে বেদনার পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্বল এবং উহার কাঁপনি ও উহাতে ঘর্ম্ম ; বিরক্ত হইলেই মুচ্ছা যাওয়া ; শব্দ এবং উহার প্রতিধ্বনি সমুদয় শরীর, বিশেষতঃ দাঁতের যথা দিয়া প্রবেশ করিয়া মাথা ঘোরা বৃদ্ধি করে, যাহার দরুণ বমনোদ্বেগ হয় ; ঘুমের ঘোরে জিহবার অগ্রভাগ কামড়ান ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । একোনাইট, বেলাডোনা, ক্যালকেরিয়া কার্ব, গ্রাফাইটিস্, ইগনেসিয়া, লাটিকোপডিয়াম্, স্পাইজেলিয়া, সিলিয়া ।

প্রতিষেধক ঔষধ । একোনাইট, মফাণ, গ্রাফাইটিস্ ।

ডাইলুশন বিচার । ইহার ডাইলুশন্ সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।

চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে ইহার ৩, ৬ এবং ১২ ক্রম ব্যবহারের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বাইবার্ণাম অপিউলাস্,-বাইবার্ণাম্

(VIBURNUM OPULUS,-VIBURN.)

এই গাছের ঝড়ল দিয়া যথানিয়মে মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা মজ্জা লক্ষ্যীয় স্নায়ুশুলী দিয়া ইহা জীজননেন্দ্রিয় বিশেষকণে আক্রমণ করিয়া থাকে। অতএব অস্বাভাব রক্তাবরোধ এবং উহাতে স্নায়ুশুলের ভায়া বেদনা সম্বলিত কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাদকেব বেদনার (Neuralgic Dysmenorrhœa) ইহা ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মানসিক অবসন্নতা; মৰ্মদাই খিট্‌খিট্‌ করা; কোন প্রকারের মানসিক পরিশ্রমে অশক্তি।

মস্তক। মাথার সম্মুখভাগে ঘূর্ণঘূর্ণ বেদনা; মাথার দপ্পদপানি, বাহা চক্ষুর গোলক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, মানসিক পরিশ্রমে বাহা বৃদ্ধি হয় এবং নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে বাহা উপশম হয়; মাথায় ভারিবোধ এবং চিমাবোধের সহিত ঘূর্ণঘূর্ণ বেদনা, চক্ষুর উপবিভাগেই বাহা অধিক অল্পভূত হয় এবং বাম পার্শ্বের চক্ষুর উপরিভাগই বাহা অধিক আক্রমণ করে ও বাহা মাথার ঠিক উপরিভাগ এবং পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ও বাহা গোণে রক্তস্রাব আরম্ভ হওয়ার সময়ই হইয়া থাকে (সিমিসিক্), হঠাৎ ধাক্কা বা ঝাকি লাগিলে, বাঁকিয়া পড়িলে, পা পিছলাইয়া গেলে বা নড়া চড়াতে বাহা বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু। চক্ষুর উপর এবং চক্ষুর গোলকের মধ্যে ভারি বোধ, বাহা ব লক্ষণ ২৩ বার চেঁচা না করিলে একটী বস্ত্র উহার স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা

হইরাছে বলিয়া নিশ্চিত হওয়া যায় না ; চক্ষুর গোলকে টাটানি (বাই, স্পাইন্ডেল, কাইসট্) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং টল্‌টলে ও উষ্ণ ।

মুখগহ্বর । জিহ্বা শুষ্ক, প্রশস্ত এবং সাদা, উহার মধ্যভাগ কটাকর্ণ এবং দাঁতের চাপা লাগিলে উহাতে দাঁতের দাগ থাকিয়া যায় (মার্ক্) ; মুখে ভাবির স্বাদ ; মুখে বিরক্তিজনক স্বাদ ; ওষ্ঠ এবং মুখগহ্বর শুষ্ক (আম্, ব্রাই, নাক্স, মক্, পাল্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । অনবরত বমনোদ্বেষ, খাইলে বাহার উপশম হয় ; বমনোদ্বেষের পরই বমন ; প্রত্যেক দিন রাত্রিতে ভয়ানক বমনোদ্বেষ ; পাকস্থলীতে অত্যন্ত দুর্বল বোধ এবং বমনের ভাব ; রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; রজঃস্রাবের পর রক্তস্রাব বদ্ধ হইয়া গেলেই উক্ত লক্ষণাদি প্রকাশ পায় ; পাকস্থলীতে খালি খালি বোধ (সিমিসিক্, ইয়েস্, সিপিয়া) ; পাকস্থলীতে আহার দ্রব্য যেন ভারি বস্তুর স্থায় চাপিয়া থাকে । প্লীহা প্রদেশের অতি গভীর অংশে ছুরী দিয়া হানার স্থায় বেদনা ; প্লীহার রক্তবহা নালীগুলির মধ্য দিয়া যেন গরম জল বাহিয়া যাইতেছে এক্রপ গুরুভূত হয় ; প্লীহা প্রদেশে প্রবল বেদনা এবং তদ্রূপ মুচ্ছার ভাব, ঘর্ষ হইলে যে মুচ্ছার ভাবের অনেক উপশম হয় ; বাম পার্শ্বের সঞ্চরমান পাঁজরার হাড়ের (Left floating ribs) নীচে প্রবল দগ্ধদিয়া বেদনা, প্রবল প্রচাপনে এবং চলিয়া বেড়াহলে বাহার অনেক উপশম হয় ; বাম পার্শ্ব শয়ন করিবারে অশক্তি ; উদরে অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানি, নাভির চতুর্দিকেই বাহা অধিক অল্পভূত হয় ; তলপেটে শূল বেদনার স্থায় প্রবল আক্কেপিক অসহ্য বেদনা বাহা ভয়ানক আকারে রোগীকে হঠাৎ আক্রমণ করে ।

মল । গুহের জড়তা (আলাম্) ; মল বড়, কঠিন, শুষ্ক গোলায় স্থায়, বাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় বা আঙ্গুলাদি দিয়া টানিয়া বাহির না করিলে সহজে নির্গত হয় না ; মলত্যাগের পর গুহদ্বার দিয়া কাল্টে রক্ত পড়া ; প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীত বোধ এবং ঠাণ্ডা বর্ষ বাহা কপাল দিয়া বহিয়া বা গড়াইয়া পড়ে ।

মূত্র । বারবার প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার মূত্রত্যাগ ।

প্রী জননেন্দ্রিয় । রজঃস্রাব আরম্ভ হওয়ার পূর্বে তলপেটে নিম্ন-
 দিক পানে টন্‌টন্‌ করিয়া নামার ভায় বেদনা ; উকর সমুখ ভাগের প্লেবীতে
 কসিয়া বা টালিয়া ধরার ভায় বেদনা ; শুষ্ক এবং ঘোনিষারের ঠিক উপরি-
 ভাগের উপর ভায়ি বোধ এবং কনকনানি ; ডিম্বকোষ প্রদেশে কখন কখন
 খোঁচা বিধার ভায় যাতনা ; বেদনাদি এত অসহ্য হয় যে, উহার দক্ষণ রোগী
 স্থির ও নিস্তরুভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না ; জরায়ুর মধ্য দিয়া তলপেটে
 শূল বেদনার ভায় অসহ্য আফেপিক বেদনা ; বেদনা পৃষ্ঠদেশে আরম্ভ হইয়া
 এবং চতুর্দিকে ঘুরিয়া অবশেষে জরায়ুতে খিল ধরিয়া শেষ হয় ; রজঃস্রাবের
 লক্ষ্য বমনোদ্বগ, জরায়ুতে খিল ধরার ভায় যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে
 অত্যন্ত স্রাববিকলতা ও অস্থিরতা ; রজঃস্রাব ৫। ৭ ঘণ্টা বন্ধ হইয়া থাকিয়া
 পুনরায় আরম্ভ হয় এবং থানা থানা, চাপ চাপ রক্তস্রাব হয় ; অতি অল্প
 পরিমাণ, তরল, কিকা রক্তের রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় পাতলা
 বোধ ; বসিবার চেঁচী করিলে মুছার ভাব বা মুছা হয় ; বস্তি প্রদেশে
 রক্তাবরোধের ভাব, যাহার দক্ষণ মনে হয় যেন রজঃস্রাব আরম্ভ হইবে ;
 লকল সময়েই তরল, হরিদ্রার আভাবুক্ত অথবা রক্তহীন শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ;
 কেবল মলত্যাগের সময়ই গাঢ়, সাদা, রক্তের ছিটযুক্ত শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ,
 গর্ভস্রাবের পূর্বলক্ষণ ; জরায়ুতে খিলধরার ভায় ভয়ানক যাতনা এবং
 জরায়ু যেন সজোরে নিম্নদিকে টন্‌ টন্‌ করিয়া ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ
 অনুভূত হওয়া ; অথবা বেদনাদি পৃষ্ঠদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া চতুর্দিকে
 ঘুরিয়া তলপেটে খিল ধরার ভায় অসহ্য যাতনার উল্লেখ হইয়া শেষ হয় ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না
 এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার পশ্চাৎভাগে বেদনা ; পৃষ্ঠদেশের পেশীতে
 খেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ভায় বেদনা এবং ক্লান্তিবোধ ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । হাতে বজ্‌ বজ্‌ করা, যাহার দক্ষণ মনে হয় যেন
 হাত কাটিয়া যাইবে ।

নিদ্রা । অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল না হওয়া এবং ঘুম হইলেও উহা
 দ্বারা তৃপ্তিবোধ না হওয়া ।

ব্যবহার । রক্তাবরোধ বিশিষ্ট, স্রাবশূন্যের ভায় বেদনা লঘলিভ

অথবা সপর্দা কষ্টকর রক্তঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Congestive, Neuragic and Membranous Dysmenorrhœa); স্নায়ুশূল; শ্বেতপ্রদর; গর্ভস্রাবের পূর্বলক্ষণ ইত্যাদি অসুখে, বাইবার্ণাম্ অপিউলাস্ ব্যবহার্য। এই ঔষধ দ্বারা রক্তঃস্রাবের বৈলক্ষণ্য হেতু উক্ত প্রকারের রোগাক্রান্ত প্রায় ২৫১০০ টী স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করা গিয়াছে। তন্মধ্যে ৭৮ টী রোগীর চিকিৎসায় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট কএকটি রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই। তবে লেখক এরূপ বিশ্বাস করেন যে, এই ঔষধ দ্বারা স্ত্রীলোকের উক্ত প্রকারের অসুখে বিশেষ উপকার হইলেও হইতে পারে। অতএব স্রবিধা হইলে এতদেশীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া নিষ্ফল না হইলেও না হইতে পারেন।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। রাত্রিতে, সন্ধ্যাকালে এবং উষ্ণ ঘরে অসুখের বৃদ্ধি; বাম পার্শ্ব আক্রান্ত হওয়া, বহির্বাযু, এদিক ওদিক চলিয়া বেড়াইলে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি বাইবার্ণামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

• **সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ।** সিনিসিফিউগা, কলোফিলাম্, জেল্-সিমিয়াম্, সিকেল্-কণ্টাম্, জ্যাস্জিলাম্।

ডাইলুশন বিচার। প্রথমতঃ ৫।৭ টী রোগীর চিকিৎসায় ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল না পাইয়া ইহার মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রাধ, ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা বলা উচিত যে, যে সকল রোগীর চিকিৎসায় এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি ব্যতীত, সমুদয় রোগীকেই মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রাধ, সেবন করাইতে হইয়াছিল।

জিঞ্জিবার,-আদা,-জিঞ্জিব্

(ZINGIBER,-GINGER,-ZINGIB.)

শুকনা আদা (শুষ্টি) যথানিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে তিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তক এবং কসেরকা মজ্জা সম্বন্ধীয় প্রায়শ্চল দিয়া ইহা শৈল্পিক ঝিল্লী আক্রমণ করে । অস্ত্রাণ্ড ঝিল্লী অপেক্ষা পরিপাক এবং শ্বাস সম্বন্ধীয় যন্ত্রের শৈল্পিক ঝিল্লীই ইহা অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে, বাহার দরুণ উক্ত ঝিল্লীগুলি উত্তেজিত হইয়া অজীর্ণ রোগ এবং বায়ুনের উপরিভাগের উত্তেজনা, শ্বরভঙ্গ এবং কাশি ইত্যাদি অসুখ হইয়া থাকে । এতদেশে শ্বাস যন্ত্রের অসুখে কবিরাজগণ ঔষধের অনুপান স্বরূপ ইহা বিস্তৃতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন । শিশু ও ছোট বালক বালিকাগণেব শ্বাস যন্ত্রের অসুখেও বৃদ্ধা দ্বীলোকেরা আদার রস বিস্তৃতরূপে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথা স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া অনুভূত হয় (আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, সিমিসিফ্, গ্লোনয়েন্) ; মাথার সম্মুখভাগে বেদনা, যাহা চক্ষুর উপরিভাগ এবং নাকের গোড়ার অনুভূত হয় (হাইড্রাষ্ট্, ক্যালী-বাই) ; শারীরিক পরিশ্রমে মাথার উক্ত প্রকারের বেদনা ; বাম চক্ষুর উপরে বেদনা অধিক অনুভূত হয় ; চক্ষুর ক্রুর উপর বেদনা বা কন্-কনানি এবং তৎপর বমনোৎসেগ, তৎপর ডাইন চক্ষুর ক্রতে উক্ত প্রকা-
র বেদনা ও মাথার পশ্চাৎভাগে চাপা বোধ, যাহা উক্ত ঘরে বৃদ্ধি পায়, ঠাণ্ডা, তিজা বা শেঁৎশেতিয়া বাতাসে, চলিয়া বেড়াইলে বা বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি না হইয়া এক ভাবেই থাকে ।

চক্ষু । চক্ষে জ্বালা এবং চিড়িকমারা ; চক্ষে আলোক লাগে বা লহ হয় না ; বালি প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ অসুখ বোধ (অ্যাস্, কষ্ট্, সাল্ফ্) ।

নাসিকা । সর্দি এবং তদ্রূপ নাক দিয়া জলের জায় তরল স্লেয়া

নির্গমন এবং বারম্বার হাঁচি, বহির্কায়ুতে বাহা অধিক হয় ; নাকের পশ্চাৎ-ভাগে শুষ্ক এবং বন্ধ হইয়া থাকার ভ্রায় অল্পভূত হওয়া ও নাক দিয়া গাঢ় স্লেয়া নির্গমন ।

মুখমণ্ডল । বাম পার্শ্বের নিম্ন মাড়িতে এবং দাঁতে টানিয়া বা কসিয়া ধরাব ভ্রায় বাতুনা ; রজঃস্রাব আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মুখমণ্ডল প্রান্তির চিহ্নযুক্ত এবং চক্ষুর নিম্নভাগ নীলবর্ণ হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । প্রাতঃকালে মুখে চট্‌চটিয়া বিস্ত্রী স্বাদ ; পেটের অসুখ হইলে ঘেরূপ হয় (স্ত্রীলোকের), মুখে সেরূপ বিস্ত্রী গন্ধ, যাহার দরুণ রোগী স্বয়ংই বিরক্ত হয় । গলার মধ্যে স্লেয়ার অতিরিক্ত সঞ্চার, কিন্তু উহার সঙ্গে জর থাকে না ।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত পিপাসা ; মুখগহ্বরে শুষ্ক বোধ ; ক্রুটি খাওয়ার পর মাথা ধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে চাপাবোধ ; তরমুজ ইত্যাদি খাইয়া পেটের অসুখ ; উল্কার উঠা এবং উদরাময় ; বমনো-ধ্বগ ; চট্‌চটিয়া আঠা তরল পদার্থ বমন ; বৃদ্ধ মাতালদিগের বমনোধ্বগ ; আহার ব্রব্যাদি ভাল হজম হয় না এবং একখানি পাথর চাপাইয়া রাখিলে ঘেরূপ হয়, উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে সেরূপ ভারি বোধ হয় ; অত্যন্ত বৃক জ্বালা ; পাকস্থলীতে জ্বালা । দাঁড়াইয়া থাকা কালীন উদরের মধ্য দিয়া শূল বেদনার ভ্রায় সঙ্কোচক বেদনা এবং উহার অন্তঃক্ষণ পরই বাহ্যে বোগ ; উদরে প্রচুর দ্বিগত বায়ুর (Flatulence) সঞ্চার ; কোষ্ঠবদ্ধ ; বাম শ্রেণীপ্রদেশে (Left iliac region) অত্যন্ত প্রথর বেদনা ।

মল । অপরিষ্কৃত জলপানের দরুণ উদরাময়, মল কটাবর্ণের স্লেয়া, প্রাতঃকালে য়াহার বৃদ্ধি হয় ; পাকস্থলীর পরিপাক কার্যের বৈলক্ষণ্যের দরুণ, ঠাণ্ডা, ভিজ্রা বা শেৎশেতিয়া বায়ুতে উদরাময়ের বৃদ্ধি ; গুহ্বার এবং উহার অনেক উপরিভাগে জ্বালা, চুলকানি এবং উজ্জ্বাল লালবর্ণ হওয়া ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রগাঢ় এবং ঘোলাটিয়া, কাল্‌চে কটাবর্ণ এবং উগ্রগন্ধ যুক্ত ; প্রস্রাব করার সময় মূত্রনালীর মুখে অত্যন্ত যাতনা ।

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছার অতিরিক্ত বৃদ্ধি ; রাত্রিতে অসাড়ে ধাতুনিঃসরণ (স্বপ্নদোষ) । স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক

পূর্বে প্রচুর বা অতিরিক্ত রক্তঃশ্রাব ; রক্ত কালচে, চাপ চাপ, থানা থানা এবং জালা উৎপাদক ।

শ্বাসযন্ত্র । স্বরভঙ্গ ; বায়ুনলের উপরিভাগের নিয়ন্ত্রদেশে জালা ও চিড়িকমারা এবং উহার পর কাশি ও গলার মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ী ; নিশ্বাস প্রস্থান কষ্টকর, রাত্রিতেই বাহার বৃদ্ধি হয় এবং বাহ্যিক দ্রবণ রোগী সোজা হইয়া বিছানায় বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় । প্রতিদিন প্রাতে ২ । ৩ ঘণ্টা শ্বাসকষ্টাদিব বৃদ্ধি হয় ; হাঁপানি কাশি ; গলার মধ্যের বামদিকে বায়ুনলের উপরিভাগে হৃৎস্রষ্টীর দ্রবণ শুষ্ক, খকখক করিয়া বা খুশ্খুশে কাশি ; গলার মধ্যে জালা, চিড়িকমারা অথবা আচড়াণের জ্বায় অল্পভূত হওয়ার দ্রবণ কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ফুফুসে বেদনা ; শ্বাসকষ্ট ; প্রাতঃকালে প্রচুর পরিমাণে গলা দিয়া শ্লেষ্মা নির্গমন ; বুকে হঠাৎ বিধানের জ্বায় বেদনা বা যাতনা ; বুকে ফুসফুসাবরক কিল্লী^৩ প্রদাহের বেদনার জ্বায় বেদনা (ব্রাই, ক্যাণী-কার্ক, সিনা) ।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎপ্রদেশে হৃৎকুটানের জ্বায় চাপাযুক্ত বেদনা ।

পৃষ্ঠদেশ । হৃৎকলতার দ্রবণ যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেরূপ কন্কনানি, বসিলে বা কোন বস্তুতে হেলান দিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; মারিলে, অনেকক্ষণ চলিলে বা দাঁড়াইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেরূপ অবশবোধ এবং উহার সঞ্চালনে অশক্তি ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । খোঁড়া হইলে যেরূপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেরূপ ভারি এবং অবশবোধ ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাত জনিত বেদনার জ্বায় কমিয়া ধরা ; সন্ধি গুলি হ্রস্বল, শক্ত এবং বেন খোঁড়া বা অচল হয় ; পায়ের পাতায় অত্যন্ত কষ্টদায়ক ক্ষীতি ।

নিদ্রা । ঘুমের ভাব এবং ক্লাস্ত হইয়া পড়ার ভাব ; ঘুম কম হওয়া ; রোগী শেষ রাত্রি ৩টার সময় জাগিয়া পড়ে এবং কতকক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া প্রাতঃকালে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে (নাক্স-বন্) ।

জ্বর । সন্ধ্যাকালে এবং বহির্বাযুতে শীতবোধ ; এক সময়েই শীত এবং গরমবোধ ।

ব্যবহার । মাথায় সর্দি বা সামান্ত সর্দি ; সর্দি ও তদ্রূপ নাক

দিয়া স্লেয়া নির্গমন ; চক্ষুর বোজক ঝিল্লী প্রদাহ (Conjunctivitis) ; নাকের মধ্যে শিচা হর্ণকযুক্ত পচাযুক্ত বা (Ozæna) ; হাণ্যানিকানি ; অজীর্ণরোগ ; মাতালদিগের বমন ; উদরাময় ইত্যাদি অস্থখে জিজিবার ব্যবহার্য্য । যেপ্রকার অজীর্ণরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হয় এবং আহারের ২১৩ ঘণ্টা পর বৃকজালা আরম্ভ হইয়া ২১৩ ঘণ্টা অবস্থিতি করে, সে প্রকার অজীর্ণরোগে জিজিবার সেবন করাইয়া ৭৮টা রোগীর চিকিৎসায় লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন । লেখক স্বয়ংও এপ্রকার অজীর্ণ রোগে অনেক দিন কষ্ট পাইয়া এই ঔষধ সেবনে অনেক উপকার পাইয়াছিলেন । আহারের ২১৩ ঘণ্টা পর প্রতিদিন ইহার মূল আরোক ৫ ফোঁটা, অর্দ্ধ পোয়া জলে মিশাইয়া ৭৮ দিন থাইয়াই লেখকের বুক আলা সারিয়া গিয়াছিল ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । মুখে ফেণাউঠা ; সহজে বা প্রচুর মূত্রতাগ ; আক্ষেপ বা ঝিলধরা ; অবসন্নতা বা মুছুর ভাব, চরুলতা এবং তদ্রূপ শয়ন করিয়া থাকার ইচ্ছা, আহারের ২ । ৩ ঘণ্টা পর বুক আলা ইত্যাদি জিজিবারের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

প্রতিষেধক ঔষধ । নাস্ত্ বমিকা ।

ডাইলুশন বিচার । ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই । এই ঔষধ দ্বারা যে কএকটা বোগীর চিকিৎসা করা গিয়াছে, উহার সমুদয়কেই মূল আরোক, ৫ ফোঁটা মাত্রায়, সেবন করাইতে হইয়াছিল ।

মেফাইটিস্ আমেরিকেনা,-মেফ্

(MEPHITIS AMERICANA, -MEPH.)

যথানিঃসে স্ফগর অব্ মিকে মিশাইয়া ইহার মিশ্র গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা মস্তিষ্ক এবং কদেবরকা মজ্জাপদার্থীয় স্নায়ুগুণ, বিশেষতঃ নিউমোগ্যাষ্ট্রিক্ স্নায়ু, স্পষ্টরূপে আক্রমণ করিয়া শ্বাস যন্ত্রের

আক্ষিপিক অবস্থা উৎপাদন করে । একজন্ত হাঁপানিকালি এবং ছপিককের চিকিৎসায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

চক্ষু । চক্ষের মধ্যে স্ফটী থাকিলে ঘেরূপ হয়, চক্ষে সেকরূপ যাতনা ; চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা ; চক্ষুর যোজক ঝিল্লী লালবর্ণ ; পুস্তকের অক্ষরগুলি যেন একত্রে জড়াইয়া যায় এবং তদ্রূপ অক্ষর গুলি চিনিতে পারা যায় না ; দূরের বস্তু দেখিবারে অশক্তি (Short-sightedness) ।

মুখগহ্বর । দাঁতের গোড়ায় হঠাৎ ধাক্কা লাগা বা চিড়িকনারার জ্বায় যাতনা ।

পাকস্থলী । প্রাতঃকালে ক্ষুধা একবারেই থাকে না ; বমনোদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে খালিবোধ ও মনে হয় যেন ক্ষুধা ক্ষীত ও বিস্তৃত হইতেছে ; পাকস্থলীতে চাপাবোধ এবং শূল বেদনা ।

মল । অনেকক্ষণ অন্তর তরল মলত্যাগ ।

শ্বাসযন্ত্র । জ্বলাদি পান করার সময় জ্বলাদি বায়ুনের উপরিভাগে প্রবিষ্ট হয় ; গন্ধকের ধূম নিশ্বাস দ্বারা টানিলে ঘেরূপ হয়, সেকরূপ হাঁপানিকালি ; মাতালদিগের হাঁপানিকালি ; নিদ্রাবস্থায় হাঁপানি ; নিশ্বাস কষ্টকর ; প্রশ্বাস প্রায় অসম্ভব, অথবা খেউ খেউ শব্দ বিশিষ্ট ; জ্বলাদি পানে, কথা বলিলে বা উঠেঃস্বরে পড়িলে কাশি ; আক্ষিপিক, গভীর কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে কাঁচা ঘায়ের জ্বায় চড়্ চড়ানি, স্বরভঙ্গ এবং বুকের মধ্য দিয়া বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস টানিবার সময় ফাঁপড়বোধ ; প্রশ্বাসে অশক্তি ; খাওয়ার কএক ঘণ্টা পর উদরস্থ আহার জ্বালাদি বমন ; রাত্রিতে শয়ন করার পর বমনের বৃদ্ধি ; প্রাতঃকালে তরল কাশি এবং গলাদিয়া কতক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । বাহু এবং পায়ে অসুখবোধ ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের বেদনার জ্বায় বেদনা ; কড়াতে (Corns) জ্বালা এবং বেদনা ।

নিদ্রা । নিদ্রার অবস্থায় হাঁপানি ; যথোচিত নিদ্রা হওয়ার পূর্বেই ষোণী জাগিয়া পড়ে এবং আপনাকে আপনি স্মৃহ মনে করে ; প্রাতঃকালে

নিজার জাব বা নিজার ইচ্ছা ; স্পষ্ট স্বপ্ন দেবা এবং জাগিলেও স্বপ্নের বিবর স্বরণশ্রাব্য ।

জ্বর । শরীরের সস্তাপের বৃদ্ধি, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ; ঠাণ্ডা বাতাসে কম শীতবোধ ; ঠাণ্ডাজল ভাল লাগে ।

ব্যবহার । হাঁপানি কাশি ; ভূপিংকফ ; মুখমণ্ডলে বেদনা বা দারুশন ইত্যাদি অস্থে হেফাইটস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । আক্ষেপ ; অস্থিরতা ; গা ভাঙ্গার ইচ্ছা ; কোন কাজ কবিত্তে অনিচ্ছা ; বেদনাদির সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত অঙ্গে সন্ধাঘাতের ভায় অসাড়বোধ হওয়া ; দারুণ মধ্যে অতি সূক্ষ্ম আলোড়ন বা আন্দোলন, যাহার দরুণ অত্যন্ত অসুখবোধ হয় এবং যাহা স্থিতি মধ্যদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করে বলিয়া অনুভূত হয় ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আণ্ডা, আদিনিকাম্, কোরেলিয়াম্, কুড্রাম্, ডুমিয়া, কোকাস্ ।

ডাইলুশন বিচার । এই ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।

কর্নাস্ ফ্লোরিডা,-কর্নাস্-ফ্লোর

(CORNUS FLORIDA,-CORN. FLOR.)

এই গাছ যথানিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে তিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হয় । আমেরিকান্, হোমিওপ্যাথিক কার্মাকোপিয়ার নিয়মানুসারে এই গাছের কাঁচা বাকল যথানিয়মে আব্‌সোলিউট্ আল্ কোহলে (Absolute Alcohol) তিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথায় পূর্ববোধ এবং বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে পাক-স্থলীর কার্যের বৈলক্ষণ্য বা পেটের অস্থখ ; প্রবল শিরঃশীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তক পূর্ববোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত ঘূর্ণের ইচ্ছা ।

পাকস্থলী এবং উদর। বমনোদ্বেষ, বমন, পাকস্থলীতে বেদনা এবং উদরস্থ অাহার জ্বাদি পরিপাক হইতে গৌণ হওয়া। উদরে প্রবল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তরলভেদ।

জ্বর। শরীরের সস্তাপের বৃদ্ধি, চর্ম উষ্ণ, মাথার পূর্ণবোধ; সবি-
রাম জ্বর; জ্বরের আক্রমণের অনেক দিন পূর্ব হইতেই নিদ্রাবেশ বা
নিদ্রার ভাব; মনে অতি কষ্টে এবং আন্তে আন্তে ভাবের উদয় হয়; মাথার
চিমাবোধ এবং ভারিবোধের সহিত শিরঃপীড়া; বমনোদ্বেষ, বমন, ক্ষুধা-
শূন্যতা বা অরুচি; কখন কখন পিত্তযুক্ত অথবা জলবৎতরল ভেদ; শীতকম্প
এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চর্ম ঠাণ্ডা ও চট্‌চটিয়া; বমন এবং বমনোদ্বেষ
ও জ্বরের মধ্যে ভয়ানক প্রবল বেদনা; জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল
শিরঃপীড়া; চর্ম উষ্ণ, কিন্তু অর্দ্ৰ; অর্ক জ্ঞান রহিততা (Stupor); মস্তিষ্কে
পূর্ণবোধ; নাড়ী দ্রুতগামী এবং কঠিন; মানসিক শক্তির অভূত বা মনে
গোলমেলে বোধ।

ব্যবহার। যন্ত্রকার মেলেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বরের বিরাম
(Intermission) অনেকক্ষণ স্থায়ী এবং কোইনাইন্ ব্যবহারে যাহা সারে
না, তাহাতে কর্ণাস্ ফ্লোরিডা বিশেষ উপকারী। (লেখক প্রণীত ইংরেজী
ভাষার জ্বর রোগের চিকিৎসা পুস্তকের ৬৯, ৭০, ৭১ এবং ৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
সবিরাম জ্বর রোগে কর্ণাস্ সার্সিনেটাস্ দ্বারাও অনেক সময় বিশেষ
উপকার পাওয়া যায়।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। নাক্স বমিকা, চায়না, কোইনি-সাল্‌ক্‌

ডাইলুশন বিচার। ইহার ঙ্গ ক্রম ব্যবহার করিয়া মেলেরিয়া
জনিত সবিরাম জ্বরে লেখক বিশেষ কল পাইয়াছেন। তাঁহার মতে জ্বরের
বিরাম কালেই (During Intermission) ২১ মাত্রা সেব্য। ২১ মাত্রার
বদি জ্বর না থামিয়া যায়, তবে এই ঔষধ দ্বারা জ্বর আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা
অতি কম, চিকিৎসার ফল দেখিয়া লেখক এরূপ স্থির করিয়াছেন। তাঁহার
মতে ১২ বা ৩০ ডাইলুশন দ্বারা ঙ্গ ক্রম অপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া
সম্ভাবনা। পাঠক মহাশয়গণ লেখকের উক্ত কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা
করিয়া দেখিতে পারেন।

কর্ণাস্ সার্মিনেটাস্,-কর্ণাস্-সার্মিন্

• (CORNUS CIRCINATUS,-CORN. CIRCIN.)

এই গাছের কাঁচা বাকল যথানিয়মে আব্‌সোলিউট্ আল্‌কোহলে (Absolute Alcohol) ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্কদা ঘূরের ভাব বা ঘুমাইবার ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়েই উদাসীনতা; মন যেন গোলমলে হইয়া যায়, বাহার দক্ষণ কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট হওয়ার অশক্তি; সর্কদা অলসভাবে বসিয়া থাকার ইচ্ছা এবং মনের ক্ষুণ্ণতার অভাব; অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা এবং যে সকল বিষয়ে আপন স্বার্থ থাকে তাহাতেও উদাসীনতার ভাব।

মস্তৃক। • মাথার ভারি বোধ সম্বলিত ঘুম ঘুমে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিজার ভাব; মাথা ধরা, চলিয়া বেড়াইলে, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, অথবা মাথা ঝাকিলে বাহার বৃদ্ধি হয়; মাথা এবং মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; মাথার পশ্চাৎভাগ এবং মাথার দুই পার্শ্বের গভীরতম অংশে দপ্পপিয়া বা চিড়িক, মারার ছায় বেদনা; মস্তিষ্কের সমুদয় অংশের মধ্য দিয়া খোঁচাবিধার ছায় বাতনা; পিত্তাধিক্য জনিত শিরঃ পীড়া।

চক্ষু। চক্ষুর গোলকের মধ্য দিয়া কনকনিয়া বেদনা; চক্ষুর যোজক কিল্লী হরিজ্ঞার আভাযুক্ত; চক্ষু যেন উহার কোটরের মধ্যে বসিয়া যায়; চক্ষুর চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে ভারি বোধ; চক্ষু চিমা এবং ভারি বোধ।

নাসিকা। নাসিকার শ্লেষ্মিক বোজক ঝিল্লীর চুলকানি; অতি প্রত্যুষে বা প্রাতঃকালে সর্দি এবং তদ্রূপ নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে তরল শ্লেষ্মা নিঃসরণ; নাকের হাড় বিশিষ্ট অংশে ভয়ানক কুটুকাণি এবং কাঁটা বিধানের ছায় বাতনা।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বা পাতলা এবং হরিজ্ঞার আভাযুক্ত কার (Eur) দ্বারা লেপযুক্ত; নুখে তিরুস্বাদ; মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে জ্বালা এবং চিড়িকমারা; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা দ্রব্য পানের ইচ্ছা ; শিশুগণের মুখে পচাযুক্ত বা ; শিশুগণের মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধিই মুখে বা ; মুখগহ্বব এবং ঠোঁঠে পচাযুক্ত বা ।

পাকস্থলী এবং উদর । বমনোদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে তিক্ত স্বাদ, সকল প্রকারের আহার জ্ববোই অরুচি ও টক দ্রব্য পানের অস্বাদ্য ; পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ ; পাকস্থলীতে প্রবল দগ্ধপানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ ও অক্ষুধা ; বমনোদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্জলতা ও উদ্যার উঠা ; পাকস্থলী এবং অন্ত্রে দুর্বল বোধ ; পাকস্থলীতে দুর্বল এবং আঁটা বোধ, উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে বিত্ৰী স্বাদ ও মুখে শুষ্কানুব ; মুখের মধ্য, গলার মধ্য এবং পাকস্থলীতে জ্বালা ও চিড়িকমারা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মলত্যাগের ইচ্ছা । পেট কামড়ানী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে গড়গড়, কলকল শব্দ হওয়া ; শুষ্কের নিয়তাবে চাপিয়া ধরার ভ্রায় অনুভূত হইয়া তৎপর মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কদ্বারে জ্বালা এবং চিড়িকমারা ; অতি কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাভি প্রদেশে কামড়ানী ; বাহ্যের বেগ এবং উহার সঙ্গে অন্ত্রের মধ্যে পূর্ণ ও অনুখ বোধ ; অন্ত্রে বেদনা, মলত্যাগের সময় বাঁহা অধিক অনুভূত হয় ; অনবরত অন্ত্রের আলোড়ন ; দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দৰুণ উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত হয়, প্রচুর পরিমাণে কালচে এবং পিত্তযুক্ত মলত্যাগের পর বাহার উপশম হয় ।

মল । বারম্বার বাহ্যে বেগ হয় বটে, কিন্তু বেগ দিলে অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে মল নির্গত হয়, মল চট্‌চটিয়া আঁঠা পদার্থ মিশ্রিত ডেলার ভ্রায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কদ্বারে চাপিয়া ধরার ভ্রায় বা জ্বালা যুক্ত ও চিড়িক শরীর সহিত বেদনা বা যাতনা ; মল তরল এবং পরিমাণে অল্প ; মল পরিমাণে অল্প, তরল এবং চট্‌চটিয়া আঁঠা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে নাভি প্রদেশে কামড়ানী ; প্রচুর পরিমাণে তরল এবং পিত্তযুক্ত মল ভেদ, উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া ও শুষ্কদ্বারে জ্বালা ; কালচে সবুজ, তরল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কদ্বার দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; প্রচুর পরিমাণে, কালচে, স্বাভাবিক মলের ভ্রায়

কঠিন মলভাগ ; কঠিন, শুষ্ক এবং অতি অল্প পরিমাণে মলভাগ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক চাপা বোধ ; আমাশয় এবং ভদ্রকণ শুষ্ক হইয়া ক্রান্তি বোধ ; পিত্তাধিকা জনিত পেটের অম্লতা ; উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্বলতা এবং স্নায়বিক উত্তেজনা ।

মূত্র । মূত্র পরিমাণে অল্প এবং লালবর্ণ অথবা ফিকা ; মূত্রাধার প্রদেশে পূর্ণ বোধ ; বারম্বার মূত্রভ্যাগের ইচ্ছা ।

জননেন্দ্রিয় । সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা, কিন্তু সহবাসের শক্তি থাকে না ।

বক্ষ এবং পৃষ্ঠদেশ । বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশে স্থলী বিধানের স্ফায় বাতনা ; বৃক হামের স্ফায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জল লাল বর্ণের ফুস্ফুসী এবং উহাতে চুলকানি ; বৃক এবং পৃষ্ঠদেশে খেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার স্ফায় বেদনা বা টাটনি ; বৃকের ঠিক মধ্যভাগ হইতে উদর পর্যন্ত খোঁচা বিধার স্ফায় বাতনা ; বৃকের উর্দ্ধাংশে আঁটা বোধ এবং ফাঁপড় হওয়ার স্ফায় অহুত হওয়া । কোমরের পশ্চাৎভাগে ঘূর্ণঘূর্ণ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিজার ভাব ও গা মাটিমাটি করা ; কোমর প্রদেশে বেদনা বা টাটনি, • সন্ধ্যা বা পার্শ্বের দিকে বাকিলে বাহ্যিক বৃদ্ধি হয় ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । হাত এবং বাহ্যে অঙ্গা এবং চুলকানি ; তরল ভেদের পর হাত ঠাণ্ডা হওয়া । পায় দুর্বল এবং ক্লান্তি বোধ ; পা এবং উরুদেশে চুলকানি ; পায়ের পাতায় অঙ্গা বোধ ; তরল ভেদের পর পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ।

চর্ম্ম । মাথার চুল বিশিষ্ট অংশ, পা এবং পায়ের পাতার চুলকানি, চুলকাইলে বা রগড়াইলে বাহ্যিক বৃদ্ধি হয় ; পৃষ্ঠদেশ, পা এবং পায়ের পশ্চাত্তায় থাকিয়া থাকিয়া চুলকানি, রাত্রিতেই বাহ্যিক অধিক উদ্বেগ হয় ; বৃকের উপর হামের স্ফায়, উজ্জল লাল বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্ফুসী এবং উহাতে চুলকানি ; শরীরে ঘন প্রচুর চট্‌চটয়া আঁঠা বর্ষ দ্বারা আবৃত ; জননেন্দ্রিয়ের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে চুলকানি ।

জ্বর । শরীরে দম্কা উষ্ণ বোধ হইয়া তৎপর বর্ষ ; শীতবোধ হইয়া উহার পরকণই কণস্থায়ী বা দম্কা উষ্ণ হইয়া ; মাথা এবং মুখমণ্ডলে রক্তা

ধিক্য বা রক্তাবরোধ ; পর্যায়ক্রমে দম্কা শীত এবং উষ্ণাত্তব ও তৎপর শীতল ঘর্ষ ; পিত্তাধিক্য হেতু স্বপ্ন বিরাম জ্বর (Bilious Remittent Fever) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী, উদর এবং অন্ত্রের অন্ত্রথের উল্লিখিত লক্ষ-
ণাদি প্রকাশ পাওয়া।

নিদ্রা। অত্যন্ত নিদ্রার ভাব এবং ঘর্ষ হওয়ার ধাতু ; ঘুমের অত্যন্ত ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বা মানসিক শক্তির বা ক্ষুণ্ণির সম্পূর্ণ অভাব বা বিনাশ ; নিদ্রার ভাব এবং অবসন্নতা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোবেগ ইত্যাদি ; দিনের বেলা নিদ্রার ভাব এবং দুর্বলতা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা, পৃষ্ঠদেশ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঘুম ঘুমে বেদনা।

ব্যবহার। উদরাময় ; আমাশয় ; শূলবেদনা ; মেলেরিয়া জনিত স বিরাম এবং স্বপ্ন বিরাম জ্বর ; পিত্তাধিক্য হেতু স্বপ্ন বিরাম জ্বর (Bilious Remittent Fever) ইত্যাদি অসুখে কর্ণাস্ সার্সিনেটাস্ ব্যবহৃত হয়। লেখক এই ঔষধ অধিক ব্যবহার করেন নাই। অতএব ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না। স বিরাম জ্বরে একটা রোগীর চিকিৎসায় ইহা দ্বারা লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। চায়না, হাইড্রাষ্টিস্, ইউপেটোরিয়াম্ পাকফোলিয়েটাম্, নাক্স বমিকা।

ডাইলুশন বিচার। এই ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। মেলেরিয়া জনিত স বিরাম জ্বরাক্রান্ত একটা রোগীর চিকিৎসায় ইহার ষ্ট দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

ইলেটেরিয়াম্,-ইলেট্

(ELATERIUM, ELAT.)

এই গাছের ফলের রসের নীচে যে তলানী পড়ে উহা শুকাইয়া স্ফটিক অব-
স্থায় মিশাইয়া মিশ্র ঔষু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি। ইহা শৈল্পিক কিল্লীর উপ-
রাণ প্রবল রূপে আক্রমণ করে। যে অংশ আক্রান্ত হয়, ইহা সে অংশের

নিঃসরণ বৃদ্ধি করে। অতএব ইহা দ্বারা নাসারন্ধ্র, আহার বহা গলনালী, পাকস্থলী অথবা অন্ত্রের শৈথিল্যিক কিল্লী আক্রান্ত হয়। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের শৈথিল্যিক কিল্লীর উপরই ইহার কার্য সর্বাধিক। প্রবল, বাহার দক্ষণ পাকস্থলী এবং অন্ত্রের স্বাভাবিক নিঃসরণের পরিমাণ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়া প্রবল আকারের বমন এবং ভেদ হইয়া থাকে ও পাকস্থলী এবং অন্ত্রের ছাল উঠিয়া বাইরা উক্ত যন্ত্রদ্বয়ের পুরাতন আকারের প্রদাহও হইয়া থাকে। বমনোদ্বেগ, জলবৎ তরল পদার্থ, সবুজের আভাযুক্ত, পিত্তযুক্ত তরল পদার্থ বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্বলতা; অন্ত্রের মধ্যে কর্তনবৎ বেদনা বা পেটকামড়ানী; প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল (আম্, চায়না, বিরেট্-আল্‌ব্), ফেণাযুক্ত অথবা ফিকা, হরিদ্রার আভাযুক্ত সবুজ বর্ণের জলবৎ তরল ভেদ (ক্রোটন, গ্রাটিয়োলা, সিকেল্); কটিদেশ হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সায়টিক্‌ স্নায়ু (Sciatic nerve) গতির পাশ দিয়া আগা গোড়া খোঁচা বিধার জায় ঘূস্‌ঘূসে বেদনা বা কনকনানি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ওলাউঠার জ্বর বা ওলাউঠার পূর্ববর্তী প্রবল উদরা-ময়; সরল ওলাউঠা (Cholericine), বাতাক্রান্ত কটিবাত (Rheumatic Sciatica); কোন কোন প্রকারের সুবিরাম জ্বর ইত্যাদি অন্তর্গত এই ঔষধ ব্যবহার্য। ওলাউঠার চিকিৎসায় বিরেটাম্-আল্‌বাম্‌ দ্বারা কোন উপকার না হওয়াতে ইলেটেরিয়াম্‌ সেবনে উপকার দর্শিয়াছে চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক ইহা কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। অতএব ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না। কল্‌চিকাম্‌, ক্রোটন, বিবেরটাম্‌-আল্‌বাম্‌, সিকেল্‌ কর্ণটামের কার্যের সঙ্গে ইলেটেরিয়ামের কার্যের সাদৃশ্য আছে। ইহার ২য় ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাইমেক্স লেক্টুলেরিয়াম্‌, -সাইমেক্স.

(CIMEX LECTULARIUS, -CIMEX)

ইতর ভাষায় ইহাকে ছারপোকা বলে। ছার পোকের সমুদয় অংশ জ্বালাব্‌ মিকে মিশাইয়া মিশ্রণ্ডা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছারপোকা বণা নিরসে ডাইক্লুট্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোকও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি । ইহার কার্য এবং ব্যবহার সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা ঋষিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই । “শীতকম্প আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হাতের পাতায় পাতায় ঘাটিয়া ধরা ; শীতলাবস্থার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা, বিশেষতঃ সন্ধিতে ; পিপাসা, রোগী উষ্ণাবস্থার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত জলাদি পান করিতে পারে ; জল পানে প্রবল শিরঃপীড়া এবং শ্বক্ শ্বক্ করিয়া শুষ্ক কাশির উদ্বেক হয়, বাহার দক্ষণ আবার শ্বাস কষ্ট হয় ; জলপানের পরক্ষণই প্রস্রাবের বেগ হওয়া ; উষ্ণাবস্থার পরই দুষ্টক্ষুধা ; অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম ; ঘর্ম্মাবস্থার পিপাসা না থাকা ; অরের বিরাম কালে অত্যন্ত পিপাসা ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমানে সবিরাম অরে এই ঔষধ ব্যবস্থা ।” হিষ্টিরিয়া রোগাজ্ঞাস্ত রোগীর রোগের আক্রমণের সময় ইহা দোঁকাইলে ফিট্‌স্ (Fits) বা আক্রমণ অতি শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া যায় । দায়ুগুণের উপর ইহার কার্য অনেকটা কল্পরীর স্তায় এবং ইহার ভ্রাণেই উপকার হয় বলিয়া লেখক বিশ্বাস করেন । অররোগে ওর এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম এবং হিষ্টিরিয়া রোগে হুল আরোক, এক কোঁটা মাত্রায়, ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন ।

রিসিনাস্ কমিউনিস্,-ভেরাণ্ডা,-রেডী,-রিসিন্

(RICINUS COMMUNIS,-CASTOR-OIL PLANT,-RICIN.)

ভেরাণ্ডার বিচি দিয়া তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই গাছের পাতা দিয়া যথানিয়মে আরোক ও প্রস্তুত হয় । ইহার আরোকই হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসার অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি । হৃৎ শরীরে ইহা সেবনে প্রবল ভেদ হয় । অতএব আলোপ্যাথিক চিকিৎসক এবং কবিরাজগণ ইহা রেচক ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন । হোমিওপ্যাথিক মতে ওলাউঠা রোগের চিকিৎসায় ইহা এক অত্যন্ত উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । বমন এবং পিত্তযুক্ত জলবৎতরল পদার্থ ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে বেদনা ; কখন কখন ফেণবৎ তরল পদার্থ, স্লেষ্মা, মাচ্চ, মাংস খোয়া জলের স্তায় রক্ত মিশ্রিত তরল পদার্থ ভেদ, শরীরের চর্ম্ম

ঘরকের স্থার ঠাণ্ডা এবং অনেককাল জলে ভিজিলে ঘেরূপ হয়, সেরূপ কৌকড়া ; মুখমণ্ডল ফিকা বা শিটা ও রক্ত, বরভঙ্গ, নাড়ী লুপ্তপ্রায়, হাত পা ঠাণ্ডা এবং পাগের ডিমে খিল ধরা, মাথায় কিম্ব কিম্ব করা এবং কখন কখন নিত্রার ভাব ও পিপাসা ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমানে ওলাউঠা রোগে রিসিনাস্ ব্যবহার্য্য । অন্তর্জাতিক মেগার পর, ইং ১৮৮৪ সনের গ্রীষ্মকালে কলিকাতা নগরে ওলাউঠার যে এক ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত লক্ষণ গুলি অনেক রোগীরই বর্তমান ছিল । অস্ত্রান্ত ঔষধ দ্বারা কোনও উপকার না পাওয়াতে লেখক রিসিনাস্ সেবন করাইয়া কোন কোন রোগীর চিকিৎসায় ভাল ফল পাইয়াছিলেন, আবার কোন কোন রোগীর চিকিৎসায় কোনও উপকার পান নাই । এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ লেখক প্রণীত ইংরেজী ভাষার ওলাউঠার চিকিৎসা পুস্তকের ২১ চইতে ২৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে । ইহার ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের আরোকই উপকারী । পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া অনেক সময় উদরাময় হইয়া থাকে । এই প্রকারের উদরাময়ের চিকিৎসায় অনেক রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন । প্রাতঃকালে ভেদ আরম্ভ হইয়া বেলা ১২টা অবধি ভেদ হয় এবং আহার করিবার পরই একবার দান্ত হইয়া দান্ত বন্ধ হইয়া যায় । যদি ১২টার সময় বা উহার পূর্বে রোগী কিছু না খায়, তবে সমুদয় দিন রাত্রি ই ক্রমাগত অন্ন অন্ন দান্ত হইতে থাকে এবং তৎপর দিবস প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার প্রবলবেগে দান্ত হইতে থাকে ইত্যাদি লক্ষণ যেপ্রকার উদরাময়ে থাকে, তাহাতেই এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়, অনেক রোগীর চিকিৎসায় ফল দেখিয়া লেখক একরূপ স্থির করিয়াছেন । উদরাময়েও ৬ষ্ঠ ক্রম উপকারী ।

রোবিনিয়া,-রোবিন্

(ROBINIA, -ROBIN.)

এই গাছের শিকড়ের বাকল যথানিয়মে ২০ ডিগ্রী ওয়ার প্রক্সিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি । ডাক্তার বার্ট্ (Dr. Bart) বলেন যে, নিউমোগ্যাস্ট্রিক ন্নায় (Pneumogastric nerve) দিয়া ইহা পাকস্থলীর উপর কার্য্য করিয়া পরিপাক কার্য্যের ব্যাধাত জন্মাইয়া পাকস্থলীতে অতিরিক্ত পরিমাণ অন্ন উৎপাদন করে, যাহার দরুণ এত তীব্র টক পদার্থ বমন হয় যে, উহার দরুণ দাঁত অত্যন্ত টকে যায় । অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা ; অত্যন্ত ষিট্ ষিট্ করা ; মাথায় অনবরত ঘূসঘূসে চাপাবোধ এবং কপালে দপ্পদপানি এবং কনু কনানি, নড়াচড়া বা পুস্তকাদি পাঠ করিলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; অনবরত গলা দিয়া টক জল উঠা ; বমনোদ্বেগ এবং তৎপর অত্যন্ত টক স্বাদবিশিষ্ট জলবৎ তরল পদার্থ বমন, যাহার দরুণ দাঁত টকে যায় ; পাকস্থলীতে ঘূসঘূসে বেদনা এবং কষ্টানুভব বা অঁটাবোধ ; পাকস্থলী এবং উদর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং বিস্তৃত ও উহাতে দূষিত বায়ুর সঞ্চার (Flatulence), শূল বেদনার স্রাব বেদনা এবং টক গন্ধযুক্ত উপরাময় ; বারিহায বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে গুহ্বহায দিয়া কেবল দূষিত বায়ু নিঃসৃত হইয়া তৎপর কঠিন মল নির্গত হয় ; হরিদ্রাবর্ণের জালা উৎপাদক তরল ভেদ (উদরাময়) ; শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের টকগন্ধযুক্ত তরল ভেদ (ক্যাক্-কার্ক, পডোফ্, ক্রম্) ইত্যাদি রোবিনিয়ার প্রাকৃতিক লক্ষণ । পাকস্থলীর অসুখ ; বমন সম্বলিত শিরঃপীড়া (Sick-headache) ; অজীর্ণ রোগ ; বুকজালা ; পাকস্থলীর অন্নরোগ ; শিশুগণের ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে রোবিনিয়া ব্যবহার্য্য । ক্যাল্কেরিয়া কার্বোনিকা, আইরিস্, পাল্-সেটিল্লা, ম্যাগ্নেসিয়া কার্বোনিকা, ক্রম ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সহিত রোবিনিয়ার কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।

চিকিৎসা-প্রবেশিকা

অর্থঃ

যে যে রোগে যে যে ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে

তাহার সংক্ষিপ্ত নাম। এই সকল ঔষধের লক্ষণা-

দির বিস্তৃত বিবরণ “ঔষধ-সোপান,”

“সরল-চিকিৎসা” এবং “চিকিৎসা-

সোপানে” দ্রষ্টব্য।

জ্বর রোগ সমূহ (Fever)।

(১) একজ্বর সমূহ (Continued Fevers)

(ক) সামান্য একজ্বর (Simple Continued Fever)। একন্, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফার, বিরেট-বির, আর্সিনিক, জেল্‌স্। অনেক সময় ইপিকাক্, রাস্টজ, পাল্‌স, বিরেট-আব্, মার্ক্-নল্ ব্যবহার্য।

(খ) আন্ত্রিক জ্বর বা জ্বরবিকার (Enteric or Typhoid Fever)। বিরেট-বির, ব্যাপ্ট, ব্রাই, বেল, মার্ক্-নল্, ওপিয়াম্, আর্স, রাস্টজ, কার্বো-বেজ, মিউর-আস্, হাডোস্, চায়না, ক্যাম্ফার, বিরেট-আব্, ফক্‌রাস্, লাইকোপ্, ফস্-আস্, জেল্‌স্, ল্যাকেসিস্, ট্রামন্, পাল্‌স, নাইট্রিক্-অক্স, জিকাম্। কখন কখন এগিস্, আর্বিকা, ক্যাক্-কার্ব, ক্যানাবিস্-ইণ্ড, কলচ, হামামেলিস্, আন্টি-টার্ট্‌ও ব্যবহার্য।

(২) মেলেরিয়া জনিত জ্বর সমূহ (Malarious Fevers)।

(ক) দরিদ্র বা পাল জ্বর (Intermittent Fever-Agüe)। একন্, বেল, আর্সিনিক্, কোইনান্, চায়না, ক্যাম্ফ, ইপিকাক্,

কর্ণাস্ ফ্লোরিডা, কর্ণাস্ সার্সিনেটাস্, নেটাম্-মিউর, কার্কো-বেজ্, মার্ক্, সল্, বিরেট্-আব্, পাল্, ফেরাম্-মেট্, আণ্টি-ক্রুড্, ইগ্নেস্, ক্যামো-মিলা, ব্রাই, রাস্টক্স, ইউপেট্-পাক্, সাল্ফ্, সিড্রন্, আর্বিকা, সিনা, হিপ্-সাল্ফ্, ক্যাক্-কার্ক্, লাইকোপ্, সিয়েনোথাস্, আমন্-মিউর, ইউকে-লিপ্-ট্-গ্ৰব্, আরানিরা-ডারেড্, এপিস্, সাইমেক্স্, ওপিয়াম্, ল্যাকেসিস্, গলিপোরাস্, ককিউল্, জেল্, ক্যাক্টাস্, ক্যাম্ফার, মিনিয়াসিস্, পডোফ্, শ্রাষু কাস্, সিপিয়া, অ্যাবাডিলা, লোবিলিয়া, আল্‌থোনিয়া, মার্ক্-বিনারোড্, মার্ক্-বাইবাস্, ফফরাস্ ।

(খ) স্বল্প বিরাম জ্বর (Remittent Fever) । ব্রাই, ক্যামোমিলা, কর্ণাস্ ফ্লোরিডা, জেল্, ইপিকাক্, মার্ক্-সল্, নাক্স-বম্, পাল্, সাল্ফ্, চায়না, কোইনাইন, আর্সিনিক্, বেল্ । কখন কখন হায়োস্, ষ্টামন্, পডোফ্, ব্যাপ্ট্, লেপ্টেণ্ড্রাও প্রযোজন হইতে পারে । ঐতন্নিম্ন সবিরাম বা পালাজ্বরের শীর্ষ দ্রষ্টব্য ।

(গ) পিত্তজ্বর (Yellow Fever) । ক্যাম্ফার, বিরেট্-আব্, একন্, বেল্, ব্রাই, আর্সিনিক্, ল্যাকেসিস্, আঞ্জেল্ট্-নাইট্রিক্, ক্যাহ্, ক্রোটেলাস্, কস্, মিরিকা সেরিফেরা । এই প্রকার জ্বর এতদেশে হয় না ।

(ঘ) সাংঘাতিক জ্বর বা পার্ণিসাস্ ফিবার (Pernicious Fever) । সবিরাম এবং স্বল্প বিরাম জ্বরের শীর্ষ দ্রষ্টব্য ।

(ঙ) মেলেরিয়া জনিত পুরাতন আকারের জ্বর সম্বলিত অস্থ বা কোইনাইনে আটকান জ্বর বা অস্থখ (Malarial or Cinchona Cachexia) । আর্সিনিক্, নাক্স-বম্, ফেরাম্-মেট্, ফেরাম্-আয়োড, নেটাম্-মিউর, লাইকোপ্, ক্যাক্-কার্ক্, সাল্ফ্, কার্কো-বেজ্, মার্ক্-সল্, মার্ক্-বিনারোড্, মার্ক্-বাইবাস্ । এতন্নিম্ন সবিরাম এবং স্বল্পবিরাম জ্বরের শীর্ষ দ্রষ্টব্য ।

(চ) বিকারের লক্ষণাক্রান্ত মেলেরিয়া জনিত তরুণ জ্বর (Typhomalarial Fever) । সবিরাম এবং স্বল্পবিরাম জ্বরের শীর্ষ দ্রষ্টব্য ।

(ছ) আসামের কালাজ্বর (Káláázar of Asam) । মার্ক্-সল্,

মিউর-আস্, নাইটিক্-আস্, নাক্স-বম্, ব্রাই, সাল্ফ্ । এতদ্বিন্ন সবিরাম্ ।
এবং স্বল্পবিরাম্ জ্বরের লীৰ্ঘ দ্রষ্টব্য ।

(৩) স্ফোটকজ্বর সমূহ (Eruptive Eevers) ।

(ক) হাম জ্বর (Measles) । একন্, বেল্, ব্রাই, পাল্‌স্, আস্, ইপিকাক্, মার্ক্-সল্, ফস্‌ফরাস্, সাল্‌ফার, সিনা, চায়না । আস্, রাস্-টক্স, জিক্, কুপ্রাম্, ওপিয়াম্, বিরেট্-আব্, পডোফ্, এপিস্, আণ্টি-ক্‌রুড্, ইউফেস্, আর্বিকা, ডাল্‌ক্, কার্কো-বেজ্, ডিসিরা, ক্যামোমিলা, কফিরা, সিনা, হিপ্-সাল্‌ফ্, ক্যাম্‌ফাব, রাস্-টক্স । ক্যাক্-কার্ক, কষ্টি-কাম্, হায়োস্, কোইনাইন্-আস্, লাইকোপ্, সাইনিসি, নাইটিক্-আস্, কল্‌চ, সিনিয়াস্‌সি ।

(খ) ডেঙ্গুজ্বর (Dengue Fever) । বেল্, একন্, রাস্‌টক্স, ব্রাই, আসিনিক্, ইপিকাক্, পাল্‌স্, চায়না, নাক্স-বম্, কোইনাইন্, ইউ-পেট্-পাফ্ ।

(গ) বসন্ত (Small-Pox) । একন্, বেল্, মার্ক্-সল্, আণ্টি-ক্‌রুড্, আণ্টি-টার্ট, ক্যাম্‌ফার, এপিস্, সাল্‌ফ্, কার্কো-বেজ্, মিউর-আস্, ব্যাক্সি-নিন্, ওপিয়াম্, রাস্‌টক্স, সিমিসিফ্, হামামেলিস্, সারাসেনিয়া-পাপূর, বেরিয়োলিন, হিপ্-সাল্‌ফ্, ফস্-আস্, বিরেট্-বির, হাইড্রাস্টিস্ ।

(ঘ) জল বা পান বসন্ত (Chicken-Pox) । একন্, বেল্, মার্ক্-সল্, রাস্‌টক্স, সাল্‌ফ্ ।

(ঙ) কিসর্প (Erysipelas) । একন্, বেল্, রাস্‌টক্স, আস্, এপিস্, ব্রাই, ফস্, গ্রাফ্, ষ্ট্রামন, কুপ্রাম্-আসিটিকাম্, ল্যাক্, বিরেট্-বির ।

(চ) আরক্ত-জ্বর (Scarlet Fever) । এই রোগ এতদ্ব্যপেক্ষে হয় না । বেল্, মার্ক্-সল্, আস্, কুপ্রাম্-আসিটিক্, জিকাম্ । হাইড্রোস্যারেনিক্ আসিড্, টেবেকাম্, ল্যাকেসিস্, এইরাছাম্ গ্রাভুলোসা, সাল্‌ফ্, স্পঞ্জিয়া, ব্রোমিন, ক্যাছ্, হেলিবোবাস্, এপিস্, মিউর-আস্ । অরাম্‌মিউর, সাইলিসিয়া ইত্যাদি ইহার ঔষধ ।

ওলাউচা (Cholera)। কাম্ফার, বিরেট-আল্, একন্, বেল্, ইপিকাক্, কার্বো-বেজ্, ক্যাঙ্ক, টিরিবিছ্, ক্যালী-বাই, ওপিয়াম্, মর্ফিন্, রিসিনাস্, হামামেলিস্, ইউপেট-পাক্, সিকেল্, হাইড্রোসায়েনিক্ আস্, সিনা, সিকুটা, ফফরাস্, চায়না, ফস্-আস্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, কলোস্, ক্রোটন, আইরিস্, বাটোফা, নিকোটিন্, ক্যামোমিলা, ডায়ো-কোরিয়া, ডায়োকোরিন্, ইউকর্ক্, পডোফ্, এণ্ড্রুজা, আণ্ডি-ক্লুড্, এপিস্, বিশ্বাখ্, বেজ্-আস্, বোরাক্স্, ব্রাই, ক্যালক-কার্ব্, মার্ক-সল্, নাক্স-মফ্, সাইলিসি, থুজা, সালফ্, রাস্টক্স, ষ্টাফিস্, হিপ-সালফ্, ল্যাকেসিস্, ইয়েস্, ব্রোমাইড্ অব্ কাম্ফার ।

ডিপথিরিয়া (Diphtheria)। কার্বো-লিক্ আসিড্, মিউর-আস্, একন্, এপিস্, আস্, এরাম্, বেল্, ব্রোমিন্, ক্যালক-ক্লোরেট্, ক্যাঙ্ক, ক্যাপ্স্, গোরেকাম্, হিপ-সালফ্, আয়োড্, ক্যালী-বাই, ক্যালী-পার্মেজ্, ল্যাক্, লাইকোপ্, মার্ক-সায়েনাইড্, মার্ক-আয়োড্, নাইট্রিক্-আস্, ফাইটোলাকা ।

ছুপিং কফ বা কাশি (Hooping Cough, -Pertussis)। একন্, আস্থা, আনাকাড্, হাইড্রোসায়েনিক্-আস্, আণিকা, আস্, বেল্, ব্রাই, ক্যামোমিলা, চেলিডন, সিনা, কোকাস্, কোরেল-কব্, কুথ্রাম্, ডুসিরা, হিপ-সালফ্, ইপিকাক্, ক্যালী-বাই, ক্যালী-কার্ব্, মেফাইটিস্, মার্ক্, নেক্-থালিন্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, সিলা, আণ্ডি-টাট্, বিরেট-আল্ ।

কর্ণ মূলস্থিত গ্রন্থির প্রদাহ (Parotitis, -Mumps)। বেল্, কার্বো-বেজ্, হায়োস্, মার্ক-সল্, মার্ক-কর, পাল্‌স্, রাস্টক্স, একন্ ।

সূতীকা জ্বর (Puerperal Fever)। একন্, আস্, বেল্, ব্রাই, ক্যাঙ্ক, ক্যাম্, কলোস্, হায়োস্, ইপিকাক্, ফ্রিঅাজ্, ল্যাক্, মার্ক্, নাক্স-বম্, রাস্টক্স, সিকেল্, বিরেট-আল্, চায়না, কোইনি সালফ্, কোইনি-আস্ ।

ধাতুগত রোগ সমূহ (Constitutional Diseases) ।

বাতরোগ (Rhenmatism) । বেঙ্ক-আস্, স্যালিসিলিক্-আস্, একন্, আমন্-ফস্, আন্টি-টার্ট, আর্নিকা, আস্, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্টাস্, কলোকিনাম্, কষ্টিকাম্, ক্যাম্, চেলিডন্, চায়না, চিনিনাম্, সিমিসিক্, কল্চ, ডালক্, ফেরাম্, ফ্রান্সেলেস্, কালী-বাই, ক্যালমিয়া, ক্রিয়াজ্, ল্যাক্, লেডাম্, লাইকোপ্, মার্ক্, নাক্স-বম্, ফস্, ফাইটোল্, পাল্ন্স্, রডোড্, রাস্-টক্স্, রুটা, সার্সী পেরিলা, সাল্ফ্, থুজা, বিরেট্-আলব্, বিরেট্-বির, স্পাইজেল্, ডিজিট্, রানান্-কুল্-বাগব্, আন্টি-কুড্, আপো-সিনাম্-আণ্ড্রোইস্, অরাম্-মিউর, বার্কেরিস্, ক্যালক্-কার্ক্, ক্যাক্স-ফস্, কলোস্, জেল্ন্স্, ল্যাক্সনাস্, লোবিলিয়া-ইন্ফেট্, লাইকোপাস্, মিনি-য়াহ্, মার্ক্-বিনায়োড্, প্রাটিনা, সাস্কুনেরিয়া, সাইলিসি, টিক্টা, ট্যারেণ্টুল, বেলিরিয়াণ্, জিঙ্কাম্ ।

ক্ষুদ্র সন্ধিবাত (Arthritis,-Gout) । বেঙ্ক-আস্, একন্, আর্নিকা, আস্, অরাম্-মিউর, বেল্, ব্রাই, কল্চ, ফেরাম্-মেট্, মার্ক্-বাইবাস্, লেডাম্, নাক্স-বম্, ফস্, পাল্ন্স্, রাস্-টক্স্, স্যাবাইনা, সাল্ফ্-এসিস্, চায়না, ডিজিট্, গোরেকাম্, ক্যালী-বাই, লাইকোপ্, রডোড্ ।

কৰ্কট রোগ (Cancer) । আসিটিক্-আস্, আস্-আলব্, আস্-আয়োড্, অরাম্, বেল্, ক্যালক্-কার্ক্, কার্কো-আনিমেল্, কষ্টিকাম্, চেলিডন্, ক্রিমেটিস্, কোনারাম্, কুগুরাঙ্গ্, গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, হাইড্রাট্, আয়োড্, ক্রিয়াজ্, ল্যাক্সেস্, লাইকোপ্, মার্ক্, মেজিরিয়াস্, মুরেজ্, নেট্রা-ফার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, নাক্স-বম্, ফস্, ফাইটোল্, সিপিয়া, সাই-লিসি, টাকিস্, থুজা, জিঙ্কাম্ ।

উপদংশ বা গরমীর ব্যারাম (Syphilis) । কুয়োরিক্-আস্, নাট্রিক্-আস্, আস্, আসাফ্, ব্যাডায়্যাগা, বেল্, বার্কেরিস্, কার্কো-আনিমেল্, সিনাবেরিস্, কোরেল-কব্, কুগুরাঙ্গ্, হিপ্-সাল্ফ্, হাইড্রাট্, আয়োড্, ক্যালী-বাই, ক্যালী-আয়োড্, ক্রিয়াজ্, ল্যাক্, মার্ক্-কর, মার্ক্-সল, মার্ক্-আয়োড্, মার্ক্-বাইবাস্, মার্ক্-বিনায়োড্, নাক্স-বম্, ফস্-

আস্, ফাইটোল্, সিপিয়া, প্লাটিনা, ষ্টাকিস্, ষ্টিলিজ্, সালফ্, থুজা, মেজিরিয়াম্ ।

সাংঘাতিক চর্ম রোগ বা লুপাস্ (Lupus)। ইহাতে কখন কখন নাকে বা হইরা নাকের উপাংশ পর্যন্ত বিনষ্ট হয় । ইহাকে অম্পর্শ রোগও বলে । লুপাস্ সাধারণতঃ তিন প্রকাব । (১) লুপাস্ ইরিথিমेटোডিস্ (Lupus Erythematodes) । ইহাতে লক্ষণ বিশেষে ক্যাল্ক্, নেট্রাম্-মিউর, ফস্, সিপিয়া, সাইলিসি । মুখমণ্ডল আক্রমণ করিলে আয়োড্, নেট্রাম্-মিউর, সালফ্ ; জননেন্দ্রিয়ে হইলে লাইকোপডিয়াম্, মার্ক্-কর, মার্ক্-সল্, মেজিরিয়াম্, প্লাথাম্-আসিটিকাম্, সিপিয়া, জিক্কাম্ । (২) লুপাস্ এক্সিডেন্স্ (Lupus Exedens) । আস্, অরাম্, বেল্, সিকুটা, হিপ্-সালফ্, হাইড্রোকোটাইল্, হাইড্রাষ্ট্, ক্যালী-বাই, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, সাইলিসি, ষ্টাকিস্, সালফ্, থুজা । ওষ্ঠের এপিথেলিয়োমাতে (Epithelioma of the Lip) এপিচ্, আস্, বেল্, ক্রিমেটিন্, কষ্ট্, কোনা-রাম্, সাইলিসি, সালফ্ । (৩) লুপাস্ এক্সফোলিয়েটিকাস্ (Lupus Exfoliatus) । আস্, অরাম্, ব্যারাইটা, কার্বো-বেজ্, সিকুটা, কোনা-রাম্, গ্রাফ্, ক্যালী-বাই, ক্যালী-আয়োড্, হাইড্রোকোটাইল্, লাইকোপডিয়াম্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, ফস্, সিপিয়া, সাইলিসি, সালফ্, থুজা ।

কুষ্ঠরোগ (Leprosy, -Elephantiasis Græcorum)। আনাকাডিয়াম্, আলুমিনা, আস্, কলোসিস্, গ্রাফ্, হাইড্রোকোটাইল্, ল্যাক্, নেট্রাম্-কার্ক্, পিটোল্, ফফরাস্, সিপিয়া, সাইলিসি, সালফ্, কুপ্রাম্, মার্ক্ ।

গোদ (Elephantiasis, -Barbadoes leg)। ইহা পা এবং অণ্ড কোষাধারই সচরাচর অধিক আক্রমণ করে । হাইড্রোকোটাইল্, আস্, নাইট্রিক্ আসিড্ (গরমীর ব্যারাম জনিত হইলে), ওপিয়াম্, ক্রিমেটিন্, গ্রাফ্, আয়োড্, লাইকোপডিয়াম্, মার্ক্, সালফ্, থুজা, আনাকাড্, হামা-মেলিস্, হাইড্রাষ্ট্ ।

গণ্ডমাল (Scrofula)। আস্-আয়োড্, আস্-মেট্, আসা-কিটিডা, আক্লিপিয়ান্-টিউবার, অরাম্-মেট্, ব্যাডায়াগা, ব্যারাইটা-কার্ক্, বেল্, ব্রোমিয়াম্, ক্যাল্ক্-কার্ক্, ক্যাল্ক্-আয়োড্, ক্যাক্-ফস্, চিমা-

ফিলা, সিনা, সিষ্টা, কোনারাম্, কোরাইডেলিস্, কর্ণাস্-গারিস্, গ্রাফ্, হেক্সা লাভা, হিপ্-সাল্ফ, হাইড্রাট্, আয়োড, ক্যালী-আয়োড, লিথিয়াম্-কার্ক, লাইকোপডিয়াম্, মার্ক, নেট্রাম্-কার্ক, কডলিবার অএল্, পিটোল্, ফাইটোলাকা, সোরিনাম্, রাস্টক্স, সার্সাপেরিলা, স্পঞ্জিয়া, টিলিজিয়া, সাল্ফ, থেরিডিয়ান্ ।

মস্তিষ্কের তরুণ শোথ (Tubercular Meningitis, Acute Hydrocephalus) । কার্কোলিক্ আসিড্, একন্, এপিস্, অ্যাপোসিনাম্-ক্যান্, অর্জেন্ট-নাইট্রিক্, আস্, অটিমিসিয়া, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্ক-কার্ক, ক্যাল্ক-ফস্, সিমিসিফ্, সিনা, কুপ্রাম্, ডিজিট্, জেলন্, গ্লোনয়েন্, হেলিবোর, হায়োস্, লাইকোপ্, মার্ক-সল্, ওপিয়াম্, ফস্, পাল্‌স্, সাইলিসি, ট্রান্, সাল্ফ, বিরেট-আব্, বিরেট-বিরাইড, জিন্কা ।

গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ (Scrofulous Ophthalmia) । আসিড্ নাইট্রিক্, এপিস্, এথ্রা, আস্, অরাম্, বেল্, ক্যাল্ক-কার্ক, ইউফেস্, গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ, মার্ক-কর, লাইকোপডিয়াম্, পাল্‌স্, রাস্টক্স, সাল্ফ ।

গ্রন্থির গণ্ডমালা জনিত অসুখ (Scrofulous Diseases of Glands) । বেল্, একন্, হিপ্-সাল্ফ, আয়োড, মার্ক-আয়োড, ক্যালী-আয়োড, আমন্-মিউর, ফাইটোল্, ক্যাল্ক-কার্ক, সাইলিসি, সাল্ফ । কডলিবার অএল্ (Cod-liver-oil) ।

যক্ষ্মাকাশ (Phthisis Pulmonalis, Pulmonary Consumption) । একন্, আগারিকাশ, আকালিকা ইণ্ডিক্, আমন্-কার্ক, আমন্-মিউর, আণ্টি-টার্ট, আস্, ব্যাপ্ট, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্ক-আস্, ক্যাল্ক-কার্ক, ক্যাল্ক-ফস্, কার্কো-ড্রেজ্, চায়না, সিমিসিফ্, ডুসিরা, ফেরাম্-আয়োড, হামামেলিস্, হিপ্-সাল্ফ, ক্যাথী-কার্ক, ক্যালী-বাট, নেডাম্, লাইকোপডিয়াম্, লাইকোপাস্, নেট্রাম্-মিউর, নাইট্রিক্-আস্, ফস্-আস্, ফফরাল্, পাল্‌স্, কয়েক্স, সাজ্‌মেরিয়া, সার্সাপেরিয়া, সেনিসিয়ো-অব্, সাইলিসি, স্পঞ্জ, ট্রান্, সিলফিয়াম্, সাল্ফ, থেরিডিয়ান্, টিলিয়াম্, বিরেট-আব্, ক্রিয়াগ্ । কডলিবার অএল্ (Cod-liver-oil) ।

অন্ত্রক্ষয় বা টেবিস্ মেসেন্টেরিকা (Tabes Mesenterica,—Consumption of the bowels)। আর্স্, ক্যাক্-কার্ক্, কফ্রিক্ আসিড্, আর্স্-আয়োড্, ব্রোমিন্, ক্যাক্-ফস্, সাল্ফ্। এতদ্বির গণ্ড-মাংসার দীর্ঘ দ্রষ্টব্য।

অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ জনিত অস্থখ (Rachitis,-Rickets)। আসাফিটাডা, ব্যাবাইটা-কার্ক্, বেল্, ক্যাল্ক্-কার্ক্, ক্যাল্ক্-ফস্, স্কুয়োরিক্ আসিড্, ক্যালী-আয়োড্, ক্যালী-ফস্, লাইকোপডিয়াম্, মেজিরিয়াম্, ফফরিক্ আসিড্, পাল্ফ্, কুটা, সাইলিসি, ষ্টাফিন্, সাল্ফ্, ফেরাম্-ফস্, ফফরাস্।

শর্করা বহুমূত্র (Diabetes Mellitus)। আর্জেন্ট্-মেট্, আর্স্, বার্কেরিস্, কার্বোয়লিক্ আসিড্, কষ্ট্, ক্যামোমিলা, কুপ্রাম্, কিউ-রেয়ার, ডিজিট্, হেলোনিয়াস্, ফস্-আম্, ক্যালী ব্রোমাইড্, জিরাঙ্ক্, ল্যাকেস্, ল্যাটিক্-আস্, লিথিয়াম্-কার্ক্, লাইকোপডিয়াম্, লাইকোপাস্, মফাশ্, নেট্রাম্-মিউর, নেট্রাম্-সাল্ফ্, ফস্, প্লাধাম্, পডোফিলাম্, রটি-ন্থিয়া, লিকেল্, সাল্ফ্-আস্, ট্যারান্টুলা, টিরিবিহিনা, ইউরেনিয়াম্-নাইটেট্, সাইলিসি। শর্করা শূন্য বহুমূত্র (Diabetes Insipidus) ফস্-আম্, আর্জেন্ট্-মেট্, মিউরেজ্, নেট্রাম্-মিউর, সিলি-ম্যারিট্, ইউ-রেনিয়াম্-নাইটেট্ বিশেষ উপকারী।

পাপূরা বা ল্যাণ্ড্ স্কার্বি (Purpura,-Land Scurvy)। ইহাতে রক্তের দূষিত অবস্থার দরুণ মাড়ি, মুখ, মূত্রকোষ, অন্ত্র, ফুফুস ইত্যাদি হুইতে রক্তস্রাব হয়। আবার এক রকমের ধার্কি আছে বাহা রক্তের উক্ত প্রকারের পুরাতন আকারের দূষিত অবস্থার দরুণ ঘটয়া থাকে। ইহাতে দাঁতের গাঁড়া দিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত পড়ে। আর্ণিকা, আর্স্, বেল্, বার্কেরিস্, ব্রাই, ক্রোটেলাস্, হানামেলিস্, হায়োস্, আরোড্, ক্যালী-আয়োড্, ল্যাকেস্, লেডাম্, নাক্স-বম্, ফস্, রাস্-টজ্, কুটা, লিকেল্, সাইলিসি, ট্রায়ান্, সাল্ফ্, সাল্ফ্-আস্, টিরিবিহিন্, একন্, আমন্-কার্ক্, আমন্-মিউর, এপিস্, ফফিয়া, ডাল্ফ্, ব্যাবাইটা, কোনায়াম্, ফস্, আর্স্, মার্ক্।

রক্তান্নতা (Anæmia)। পিক্রিক্-আস্, আর্স্, ক্যাল্ক্-ফস্,

চায়না, ফেরাম্, হেলোনিয়াস্, নেট্রাম্-মিউর, নেট্রাম্-সালফ্, নাক্স-বম্, হাইড্রাই, ক্যালক্-কার্ব্, কার্বো-বেজ্, সিনা, কোনায়াস্, মার্ক্, ল্যাকেশ্, ফস্-আস্, রাস্টঞ্জ্, সিপিগা, মাইলিসি ।

মূত্রিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) । আলিট্রস্, আনুসিনা, আন্টি-জুড্, আস্, আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, বেজ্, ক্যালক্-কার্ব্, চায়না, সিনা, কোনায়াস্, মাইক্লেমেন্, ফেরাম্, গ্রাফ্, হেলোনিয়াস্, ইগ্নেনস্, ইপিকাক্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-বম্, ফস্, প্রাথম্, পালস্, সিপিগা, সেনিসিয়ো, সালফ্ ।

সার্বাস্থিক এবং স্থানিক শোথ (Dropsy, General and Local) । আসিটিক্-আস্, একন, এপিস্, আপোসিনাম্, আস্, আক্লি-পিয়াস্, আপ্পেরেগাস্, অরাম্, ব্রাই, ক্যাষ্ট্, ক্যাঙ্ক্, চিমাফিলা, চায়না, কলচ্, ডিজিট্, ইউপেট্-পাপূর, ফ্লুয়োরিক্-আস্, হেলিবোরাস্, হেলোনিয়াস্, হিপ্-সালফ্, আইরিস্-বাস্, ক্যালী-কার্ব্, ল্যাকেশ্, লেডাম্, লেপ্টাণ্ড্রা, মার্ক্, সিনা, সেনিসিয়ো, সেনিগা, স্পাইজেল্, সালফ্, আন্টি-টার্ট্, ট্রিবিছ্ । সক্রিয় শোথে সালফ্, আন্টি-টার্ট্, আস্, ব্রাই, ক্যাক্, অ্যারোড্, ক্যালমিয়া, লাইকোপডিয়াম্, রাস্টঞ্জ্, মাইলিসি ।

স্নায়ুমণ্ডলীর অস্থখ

(DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.)

মস্তিষ্ক এবং উহার আবরক ঝিল্লীতে রক্তাধিক্য বা রক্তা-বরোধ (Hyperæmia of the Brain and its Membranes) । বেজ্, একন, অক্সট্রাপিন-সালফ্, এপিস্, স্মোনয়েন্, বিরেট্-বিরাইড্, জেলস্, আগারিকাশ্, ব্যারাইটা, ইগ্নেনস্, রাস্টঞ্জ্, ষ্টাফিস্, বিরেট্-আব্ ।

* মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা (Anæmia of the Brain) । আমন্-কার্ব্, ক্যাক্কার, ইপিকাক্, সিকেল্, কুথাম্-মেট্, আস্, ক্যাক্-কার্ব্, কলটি-

কাস্, ডিজিট্, আণ্টি-টার্ট্, বিরেটাম্-বির, জিকাম্, সাইলিসি। যন্তিকে রক্তব্রতা হেতু মাথা ঘোরার পক্ষে সাইলিসি, ব্যারাইটা-কার্ক, গ্র্যাক্, লাইকোণডিয়াম্, আয়ু।, ক্লোরিক্-আসিড্-উপকারী। (সরল চিকিৎসার ২৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মস্তিষ্ক প্রদাহ,-মেনিঞ্জাইটিস্ (Encephalitis,-Meningitis,-Inflammation of the Brain)। বেল্, একন্, ওপিয়াম্, রাস্টক্, আণ্ণিকা, ব্রাই, হেলিবোরাস্, সাল্ফ্, হায়োস্, সিকুটা, মোনয়েন্, সিমিসিক্, কুপ্রাম্-আসিটিকাম্, জেল্, বিরেট্-বিরাইড্, জিকাম্, ট্রাইবন্, মার্ক্, নাক্স-বম্, প্রাধাম্, আয়োড্, আণ্টি-টার্ট্, ক্যালী-আয়োড্, আট্রো-পিন্-সাল্ফ্।

সংশ্ৰাণ রোগ (Apoplexy)। ইকুলাস্-হিপ্, একন্, অণ্ণিকা, ব্যারাইটা-কার্ক, বেল্, ক্যাক্ট্, ক্যাক্-কার্ক, কষ্ট্, বকিউল্, কুপ্রাম্, জেল্, মোনয়েন্, হাইড্রোসারেনিক্-আস্, হায়োস্, ইপিকাক্, ল্যাকেস্, লরোস্, ল্যাক্-নাক্স, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, মোরিনাম্, সাল্ফ্, সান্দুনেরিয়া, সিমিয়া, বিরেট্-বিরাইড্।

সূর্য্যঘাত (Sunstroke)। একন্, আসিড্-নাইট্রিক্, আণ্টি-কুড্, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্কার, ক্যাক্ট্, কার্কো-বেজ্, মোনয়েন্, জেল্, ল্যাকেস্, নেট্রাম্-কার্ক, বিরেট্-বিরাইড্।

মস্তিষ্কের পুরাতন শোথ বা ক্রনিক্ হাইড্রোকিফেলাস্ (Chronic Hydrocephalus,-Dropsy of the brain)। বেল্, ক্যাক্-কার্ক, ক্যালক্-কস্, হেলিবোরাস্, সাল্ফ্, এপিস্, আস্, আয়োড্, ডিজিট্, মার্ক্, সাইলিসি, ফেরাম্-আয়োড্।

কসেরুকা মজ্জা এবং উহার আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ (Spinal-Meningitis)। একন্, এপিস্, বেল্, কুপ্রাম্, জেল্, মার্ক্, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, অক্সালিক্-আস্, রাস্টক্, সাল্ফ্, ব্রাই, সিকেল্, ক্যালী-আয়োড্, মার্ক্-কর, আস্, ট্রাইবন্, জিকাম্, প্রাধাম্, বকিউলাস্, ইমেনস্, ফল্, বিরেট্-আল্ফ্, বিরেট্-বিরাইড্, ক্যালক্-কার্ক, নেট্রাম্-মিউর, সাইলিসি, আয়োড্, কষ্ট্।

মস্তিষ্কের প্রদাহ সম্বলিত ফসেরুকা মৰ্জা এবং উহার
আবরকবিল্লীর প্রদাহ (Cerebro Spinal-Meningitis,—Spotted
Fever)। একন্, জেল্‌স্, বেল্, বিরেট্-বিরাইড্, ব্রাই, আন্, কুপ্রাম্,
আসিটিকাম্, ওপিয়াম্, হায়োস্, আর্জেন্ট্-নাইট্রাস্, আর্নিকা, সিকুটা,
সিমিসিক্, ককিউল্, জোটেলাস্, প্রোনয়েন্, নাক্স-বম্, বিরেট্-আব্,
আগারিকাশ্, আমোনিয়াম্, এপিস্, ব্যাপ্ট্, ক্যাষ্ট্, ক্যান্ফার, ক্যাঙ্ক্,
ডিজিট্, হাইড্রোসায়েনিক্-আন্, লাইকোপডিয়াম্, ফফরাস্, গ্লাভাম্,
সোলেনাম্, ট্যারেন্টুলা, আন্টি-টার্ট্, জিঙ্কাম্ ।

মেরুদণ্ডের উত্তেজনা বা স্নায়ুশূল (Spinal Irritation,—
Neuralgia Spinalis)। একন্, আর্নিকা, বেল্, ক্যাষ্ট্, সিমিসিক্,
ককিউল্, ফেরুম্, ইগ্নেস্, নাক্স-বম্, জেল্‌স্, আন্, ফফরাস্, সাল্ক্ ।

পক্ষাঘাত (Paralysis)। একন্, আনুমিনা, আর্নিকা, কষ্ট্,
গ্লাভাম্, ব্যারাইটা-কার্ক্, ককিউল্, সাল্ক্, রাস্‌টক্স্, নাক্স-বম্, ফফ-
রাস্, রাস্‌টক্স্, সিকেল্‌মার্ক্, আন্, জেল্‌স্, ওপিয়াম্, আনাকার্ড্, ডাক্,
কল্‌চ্, ল্যাকেস্, ইগ্নেস্, ষ্টানাম্, ষ্টীকিস্, সাইলিসি, কুপ্রাম্, বিরেট্-
আব্, ষ্ট্রাম্, নেট্রাম্-মিউর, জিঙ্কাম্, বেল্, হায়োস্, অক্সালিক্-
আন্, প্রাটিনা, বিরেট্-বিরাইড্, বুডোড্, নাক্স-মক্, আগারিকাশ্, আব্,
ব্রাই, ক্যাঙ্ক-কার্ক্, কার্বো-বেজ্, কোনায়াম্, ফাইসটিগ্‌মা, চায়না,
সিকুটা, কটা, আক্কাট্রা, নেট্রাম্-ফস্, কপলী-আরোড্, ক্যালী-ফস্,
ফেরাম্, ইকুলাস্, এইলাহ্, চেলিডন্, লেডাম্, লাইকোপডিয়াম্, সোরি-
নাম্, সিলিয়া, পিক্রিক্-আন্, এপিস্, ইয়েম্, ওপিয়াম্, সিকেল্, ষ্টানাম্,
কিউয়েরার ।

ধনুষ্ঠঙ্কার, দাঁত লাগা (Tetanus,—Lock-jaw)। একন্, আর্নিকা
বেল্, ক্যান্ফার, সিকুটা, কুপ্রাম্, হাইড্রোসায়েনিক্-আন্, হায়োস্,
জয়েস্, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, ফাইটোল্, রাস্‌টক্স্, ষ্ট্রাম্, বিরেট্-বিরাই-
ড্, আমন্-কার্ক্, আক্কাট্রা, আন্, ইয়েম্, লাইকোপডিয়াম্, বকশ্,
ফাইসট্, নিকোটিন্ ।

জলাতক বা পাগলা কুকুর, শেয়াল ইত্যাদির কামড়ের

দরুণ অস্থখ (Hydrophobia,-Rabies)। বেল, হাইড্রোফবিনাম্, কাহ, হায়োস, ল্যাকেস, ষ্ট্রামন, ইউকল্লিগাম্, স্কুটেলেরিয়া।

আক্কেপ বা কন্বাল্ন্স (Convulsions,-Eclampsia)। একন্, আর্স, বেল, কষ্ট, ক্যামোমিলা, সিকুটা, সিনা, কুপ্রাম, জেলন্, হায়োস, ইগ্নেনস, ইপিকাক্, ওপিয়াম্, সিকেল, সাইলিসি, ষ্ট্রামন, সাল্ফ, জিঙ্কাম্, আর্জেন্ট-নাইট্রিক্, ক্যাম্ফার, বিরেট-আব্, হেলিবোরাস্, হিপ-সাল্ফ, ক্রিয়াজোট, লরোস, নাক্স-বম্, ষ্ট্রানাম্, আর্টি-টার্ট, ট্রিবিব্, মার্ক, বিরেট-বিরাইড্, এথুজা, প্লোনয়েন্, ইনাহি।

আক্কেপিক বা কৃত্রিম ঘুংড়ী কাশি (Laryngismus Stridulus,-Spasmodic Croup)। একন্, সাধু কাশ, বেল, কুপ্রাম-মেট, আয়ো-ডিয়াম্, মকাশ, ইপিকাক্, আর্স, ক্যামোমিলা, ক্রোরিগ, জেলন্, ফক-রাস্, কোরেল-কৃত্রাম্, ইগ্নেনস, সাইলিসি, ব্রোমিন, ল্যাকেস, মেফাইটিস, ওপিয়াম্, প্রাঘাম্, ষ্ট্রামন, সাল্ফ, ফাইটোল, বিরেট-আব্।

মূগীরোগ (Epilepsy,-Falling Sickness)। আমিল-নাইট্রেট্, আর্জেন্ট-নাইট্রিক্, বেল, পটাশ-ব্রোমাইড, বুকো, ক্যালক-কার্ক, ক্যাম্ফার, কষ্ট, সিকুটা, কুপ্রাম-মেট, হাইড্রোসায়েনিক, আর্স, হায়োস, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, সাইলিসি, প্রাঘাম্, সিকেল, ইথেন্স, ডিজিট, আগারিকাশ, ষ্ট্রামন, আর্টিমিসিয়া, ইজিগো, ষ্ট্রানাম্, সাল্ফ, জিঙ্কাম্, ইনাহি, আর্স, ক্যালক-আর্স, ককিউল, ক্যালী ব্রোমাইড, সাইলিসি, ষ্ট্রামন, ট্রিকুনিয়া।

অনিচ্ছা পূর্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্পন্দন বা কোরিয়া (Chorea,-St. Vitus's Dance)। আগারিকাশ, আর্স, আষ্টিরিয়াস-কৃত্রাম্, কষ্ট, চারনা, সিমিসিক্, ককিউল, কুপ্রাম, হায়োস, ইথেন্স, লরোস, লিলিয়াম্-টারি, মাইগেল, নাক্স-বম্, পালস, রডোড, রাস্টক্স, স্কুটেলেরিয়া, ষ্ট্রামন, টারান্টুলা, ক্যাক-কার্ক, নেটাম-মিউর, ওপিয়াম, সিকেল, মিশিয়া, ষ্টিকটা, বিরেট-বিরাইড, জিঙ্কাম, সিনা, ক্রোকাশ, আয়োড, স্পাইজেল, ফেরাম-রিড্যাক্ট, ষ্টিকটা, অসাকিটিডা, গ্রাক, সাল্ফ, চারনা, জেলন্, ফস্ আর্স।

যুতবৎ মুচ্ছা বা ক্যাটেলেন্সি (Cataplexy) । যুগ্মরোগ, আক্ষেপ, হিষ্টিরিয়া এবং অন্তঃপ্রকারের দ্রাবক রোগের লীর্ষ দ্রষ্টব্য ।

গুণ্ণাঘাত বা হিষ্টিরিয়া (Hysteria) । একন্, আনাকাড, আস্, আসাকিডা, অরাম্, বেগ্, ব্রোমিন্, ক্যাষ্ট্, ক্যাল্-ক্-কার্ক্, কলোফিলাম্, ককিউল্, কানায়াম্, জেল্-স্, হায়োস্, ইগ্নেন্, ল্যাকেস্, ম্যাগ্নেন্-মিউর, মফাশ্, নাক্স-বম্, প্যালোডিয়াম্, প্লাটিনা, পাল্-স্, সিপিয়া, ট্যারেণ্টুলা, থেরিডিয়ান্, বেলিরিয়ান্, ক্যাল্-ক্-কার্ক্, সিমিসিফ্, জেল্-স্, লাইকোপ্, ষ্টিক্টা, সাবাইনা, নাক্স-বম্, নেটাম্-মিউর, লিলিয়াম্-টাইব্রি, মার্ক্, ফফরাস্, ট্রামন্, বায়োলা-অডোরেরটা, কফিয়া ।

মনোমত্ততা (Hypochondriasis) । নাক্স-বম্, সালফ্, ষ্টাকিস্, নেটাম্-মিউর, কানায়াম্, সিমিসিফ্, আর্জেন্ট-নাইট্রিক্, আস্, হায়োস্, নেটাম্-সালফ্, ষ্টানাম্, ট্যারেণ্টুলা, বেলিরিয়ান্, বিরেট-আল্, ফস্, ক্যাক্-কার্ক্, চায়না, আনাকাড, অরাম্, ক্রিমোটিস, প্লাটিনা, ইগ্নেন্, পাল্-স্, ফস্-আস্, প্রাটিয়োলা, সিপিয়া, পিট্রোল্, আগ্নাম্, জিকাম্, নাইট্রিক্-আস্ ।

স্নায়ুশূল বা নিউরেলজিয়া (Neuralgia) । একন্, আস্, বেগ্, কষ্ট্, সিড্রন্, ক্যামোমিলা, চেলিডন্, চায়না, কোইনাইন, সিমিসিফ্, কলোস্, জেল্-স্, ম্লোনয়েন্, হিপ্-সালফ্, ইগ্নেন্, আইরিস্, ক্যালী-বাই, মেজি-রিয়াম্, ফস্, প্লাটিনা, মার্ক্, নাক্স-বম্, পাল্-স্, রেনান্-কুলাশ্, রাস্-টক্স, সিপিয়া, স্পাইজেল্, ষ্টাকিস্, ষ্টানাম্, ট্রামন্, সালফ্, বিরেট-আল্, বিরেট-বিরাইড, বার্কফাম্, জিকাম্, ফস্, জিক্-বেলিরিয়ান্, ব্রাই, ট্যারেণ্টুলা, টিরিবিহ্ ।

বমনোদ্বৈগ বা বমন সম্বলিত শিরঃপীড়া (Nervous sick-head-ache) । নাক্স-বম্, বেগ্, ব্রাই, ম্লোনয়েন্, বিরেট-আল্-বাম্, কফিয়া, সিমিসিফ্, একন্, আইরিস্, সালফ্, সিপিয়া, ক্যাক্-কার্ক্, জেল্-স্, সাক্স-নেব্রিয়া, আস্, চায়না, স্পাইজেল্, ককিউল্, ক্যাক্-কার্ক্, আস্, কোইনি-সালফ্, জিক্ ।

শিরঃপীড়া (Headache) । ফস্-আস্, পিক্রিক্-আস্, সিমিসিফ্,

আলোক, আমন-কার্ক, আর্জেন্ট-নাইট্রিক্, বেল, বোবিষ্টা, ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যাক-কার্ক, ক্যানাবিস-স্ফাট, চিনিলাম (কোইনাইন), ককিউল, ফেরাস, জেলস্, গ্লোনথেন, হিপ-সাল্ফ, ইগ্নেস, আইরিস, ল্যাকেস, নেজা, নেট্রাম-কার্ক, নাক্স-বম, প্লাথাম, সালুনেরিয়া, সাইলিনিস, স্পাইজেল, জিকাম্-একন, চায়না, ইপিকাক্, ফস্, ফাইটোল, পালস্, পিপিয়া, সাল্ফ, বিয়েট-আলব্ ।

নিদ্রাশূন্যতা (Sleeplessness) । একন, বেল, আশ্বা, ক্যাম্, সিমিসিক্, কফিয়া, হায়োস্, মফাশ্, নাক্স-বম, ওপিয়াম্, চায়না, জেলস্, পালস্, অরোড, ক্যালী-ব্রোমাইড্ ।

মদোন্মত্ততা (Delerium Tremens) । আগারিকাশ্, আন্টি-টার্ট, আন্, বেল, ব্রোমাইড্ অব্ ক্যাম্ফার, ক্যাম্ফার, কফিয়া, হায়োস্, ল্যাকেস, নাক্স-বম, ওপিয়াম্, ট্রায়ন, সাল্ফ ।

মানসিক বা মস্তিষ্কের অবসন্নতা বা দুর্বলতা (Brain-fag) । ফস্-আন্, এথুজা, অনাকাড্, ক্যাল-ফস্, সাইলিনিস, নাক্স-বম, ইগ্নেস, ক্যাক-কার্ক, কুপ্রাম্, জেলস্, পিক্রিক্-আন্, জিকাম্, আগারিকাশ্, আর্জেন্ট-নাইট্রাস্, অরাম্, 'সিমিসিক্, সাল্ফ, ট্রাকিস্, কফিয়া, হায়োস্, আশ্বা, ল্যাকেস ।

সামান্য স্তব্ধ বায়ু (Simple Melancholia) । অরাম্, প্লাটিনা, আন্, মার্ক-সল, ইগ্নেস, সাল্ফ, ফফরাস্, বেল, পালস্, ল্যাকেস, অনাকাড্, ককিউল, হেলিবোর, হায়োস্, নাক্স-বম, ক্যানাবিস্ হাইড্রিকা, কষ্ট, সিমিসিক্, ব্রোমিন্, কলোস্, ক্যালী-ব্রোমাইটাম্, ট্রায়ন, নেট্রাম্-মিউর, হেলোনিয়াম্, লিলিয়াম্-টাইজি, লাইকোপডিয়াম্, আগ-নাল্, প্লাথাম্, জিকাম্ ।

বুদ্ধিরলোপ সম্বলিত উন্মত্ততা বা ডিমেন্সিয়া (Dementia) । মানসিক বা মস্তিষ্কের অবসন্নতা বা দুর্বলতার শীর্ষ ব্রষ্টব্য ।

উন্মত্ততা (Mania, Insanity) । অনাকাড্, আগারিকাশ্, অরাম্-মেট, বেল, আন্, হায়োস্, অরোড, মার্ক, নাক্স-বম, ট্রায়ন, বিয়েট-আব, জিক্-মেট্ ।

চক্ষুরোগ সমূহ (DISEASES OF THE EYE)

১. চক্ষু প্রদাহ (Ophthalmia)। নাইটি ক্-আন্, এথ্‌জা, একন্, এপিন্, আর্জেন্ট-নাইট্রাস্, অ্যাস্, অরাম্, ব্যারাইটা, আরোড্, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, ইউক্রেস্, হিপ্-সাল্‌ফ্, ক্যালী-বাই, মার্ক্-কর, পাল্‌স্, রাস্‌টক্, স্পাইজেল্, সাল্‌ফ্, ক্যামোমিলা, গ্রাক্, লাইকোপডিয়াম্, মার্ক্-সল্, নাইটি ক্-আন্।

চক্ষুর আইস-প্রদাহ (Iritis,-Inflammation of the Iris)। একন্, আর্গিকা, অ্যাস্, আগাফিটিডা, অরাম্, বেল্, ব্রাই, সিড্‌স্, ক্যামো-মিলা, চায়না, নিমিসিফ্, সিনাবেরিন্, ক্রিমোটিন্, কল্‌চ্, ইউক্রেস্, জেল্‌স্, হায়াবেলিস্, হিপ্-সাল্‌ফ্, ক্যালী-আরোড্, মার্ক্-সল্, মার্ক্-কর, নাই-ট্রিক্-আন্, পিটোল্, রাস্‌টক্, স্পাইজেল্, সাল্‌ফ্, টিরিবিছ্, থুজা।

আংশিক বা অসম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা। এবং দৃষ্টিহীনতা (Ama-
rosis,-Gutta serena,-Amblyopia)। একন্, আগারিকান্, আন্টি-ক্লড্, আর্জেন্ট-নাইট্রাস্, অট্রিকা, অরাম্, ব্যারাইটা, বেল্, বোবিটো, ক্যাক্-কার্ক্, ক্যাগ্‌স্, কর্কো-বেজ্, কষ্ট্, চেলিডন্, চায়না, সিকুটা, নিমিসিফ্, সিনা, ক্রোটেলান্, সাইক্রেমেন্, ড্রিসিয়া, ইলাপ্, কোরেল্, জেল্‌স্, হিপ্-সাল্‌ফ্, হাইড্রোসায়েনিক্-আন্, হারোস্, ইগ্‌নেস্, ক্যালী-আসেট্, ল্যাক্সনাস্, লিপিয়ার্, লাইকোপডিয়াম্, মার্ক্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-বজ্, ফক্ষরাস্, ফাইসট্, প্রাধাস্, পাল্‌স্, রুটা, সিকেল্, সিপিরা, সাইলিসি, ট্রায়মন্, সাল্‌ফ্, থুজা, বিরেট্-আব্, বিরেট্-বিরাইড্, জিঙ্কাম্।

চক্ষুর সম্মুখে দাগ দেখা (Mucæ Volitantes,-Spots before the Eyes)। হারোস্, বেল্, কোনাগাম্, ককিউলান্, মার্ক্-কর, ক্যালী-আরোড্, ক্যালী-কার্ক্।

চক্ষে ছানি পড়া (Cataract)। ব্যারাইটা, ক্যানাবিস্-ত্ৰাট্, কষ্ট্, চিমাফিলা, কল্‌চ্, কোনাগাম্, ম্যাগনেস্-কার্ক্, কল্‌স্, পাল্‌স্, সাণ্টোনাইন, সিপিরা, সাইলিসি, সাল্‌ফ্, আদন্-কার্ক্, বেল্, ক্যাক্-কার্ক্, চেলিডন্, ডিজিট্, ইউক্রেস্, হারোস্, লাইকোপডিয়াম্, নাইটি ক্-আন্, এপিয়ার্, রুটা, সেমিগা, স্পাইজেল্, ট্রায়মন্, প্রাধাস্।

গ্লকোমা (Glaucoma) । একন্, অরাম্, বেল্, ব্রাই, সিট্রন্, লিমিদিফ্, কলোল্, কোনারাম্, জেলন্, ক্যালী-আয়োড্, ফফরাস্, ফাইটোল্, ফ্রনাম্-স্পাইনোলা, রডোড্, স্পাইজেল্ ।

টেরা চক্ষু (Strabismus,-Squinting) । আগারিকাশ্, বৈল, লিনা, বাইক্রেমেন্, জেলন্, হায়োস্, স্পাইজেল্, সালফ্, আলাম্, অরাম্, ক্যাক্, চায়না, ক্যালী আয়োড্, ফস্, সিকুটা ।

দূরের দ্রব্যাদি দেখিতে অশক্তি (Myopia,-Near or Short-sightedness) । আমন্, আনাকাড্, কার্কো-বেজ্, কোনারাম্, নাইট্রিক্-আস্, পিটোল্, ফস্, ফস্-আস্, পালন্, সালফ্, ফাইসট্ ।

চক্ষুর পাতার প্রদাহ (Blepharitis,-Inflammation of the Eye-lids) । একন্, আলুমিনা, আণ্ডি-টার্চ্, এপিস্, আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, আস্, বেল্, ক্যালক্-কার্ক্, কষ্ট্, ক্যামোমিলা, দিনাদেরিস্, ক্রোটন্, ইউক্লেস্, ক্রিমোটিল্, গ্রাক্, হিপ্-সালফ্, ক্যালী-মিউর, মার্ক্, মার্ক্-বিনা-য়োডাইড্, মেজিরিয়াম্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-বম্, সোরিনাম্, পালন্, রাস্-টক্স, সিনিয়া, সাইলিসি, ষ্টাকিস্, সালফ্, থুজা, বিবের্ট্-বিরাইড্ ।

চক্ষুর পাতায় ত্রণ বা আঞ্জনি (Hordeolum,-Stye on the Eye lid) । আলাম্, কষ্ট্, ফস্-আস্, ফেরাম্, মার্ক্, ষ্টাকিস্, সালফ্, ইউক্লেসিনিয়াম্, ফস্, রাস্-টক্স, সেলিগা, নেট্রাম্-মিউর, ষ্টানাম্, সালফ্, ক্যালক্-কার্ক্, ক্যাহ্, লাইকোপ্, পালন্, গ্রাক্ ।

চক্ষুর পাতা চক্ষুর মধ্যে ঢুকিয়া যাওয়া (Intropium,-Inversion of the Eye lid) । বোরাক্স্, ক্যালক্-কার্ক্, লাইকোপ্, মার্ক্, সালফ্ (চক্ষুর প্রদাহের শীর্ষ দ্রষ্টব্য) । চক্ষুর পাতা উল্টিয়া যাওয়া (Ectropium,-Eversion of the Eye-lid) । ক্যালক্, মার্ক্, লাইকোপ্, সালফ্, এপিস্, আর্জেন্ট্-নাইট্রাস্, হামামেলিস্, নাইট্রিক্-আস্ । (চক্ষুর প্রদাহের শীর্ষ দ্রষ্টব্য) ।

চক্ষুর পাতার উপস্থির প্রদাহ সম্বলিত চক্ষুর যোজক কিল্লী প্রদাহ বা দানায়ুক্ত চক্ষুর পাতার উপস্থি প্রদাহ (Farsal Ophthalmia,-Granular Eyelid,-Eczema Palpabrarum) মার্ক্,

হিপ্-সাল্ফ, ক্যাক্স-কার্ক, সাল্ফ, ক্রিমেটিন্। এতদ্বিধ গণমালা জনিত চক্ষুঃপ্রদাহ এবং সামান্য চক্ষুঃপ্রদাহের শীর্ষ দ্রষ্টব্য।

কর্ণরোগ সমূহ

(DISEASES OF THE EARS.)

কর্ণের বহির্দেশের কোটরের অস্থ (Diseases of the External meatus.) ।

(১) কর্ণের বহির্দেশের কোটরের প্রদাহ (Inflammation of the External Meatus.) । একন্, বেল্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্, মার্ক্, ক্যামোমিলা, ব্রাই। (২) কর্ণের বহির্দেশের কোটরে ফোড়া বা ত্রণ (Abscesses or boils in the outer part of the Meatus.) । বেল্, সাইলিদি, হিপ্-সাল্ফ্, সাল্‌ফ্। এতদ্বিধ কর্ণের পটহের অস্থের শীর্ষ দ্রষ্টব্য। (৩) কর্ণের মধ্যে থেলের অতিরিক্ত সঞ্চার (Accumulation of wax in the ear) । কর্ণের মধ্যদেশে জৈবৎ, উষ্ণ জল দিয়া থেল বাহির করিয়া ফেলিবে। এতদ্বিধ লক্ষণ বিশেষে গ্রাফ্, সাল্‌ফ্ বা স্পঞ্জিয়ার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যবস্থা।

কর্ণের পটহের অস্থ (Diseases of the Membrana Tympani.) ।

(১) কর্ণের পটহের প্রদাহ বা মিরিঞ্জাইটিস্ (Myringitis.—Inflammation of the Membrana Tympani.) । একন্, বেল্, পাল্‌স্, মার্ক্, ক্যামোমিলা, সাল্‌ফ্।

(২) পটহে ছিদ্র হওয়া (Perforation of the Membrana Tympani.) । আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে যে এই রোগ সারে লেখক এরূপ বিশ্বাস করেন না। তবে মার্ক্, হিপ্-সাল্ফ্, সাল্‌ফ্ ইত্যাদি ঔষধ জলি ব্যবহার করিয়া দেখা যাইতে পারে। উক্ত ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে কড্-লিবার অয়েল্ (Cod-liver-oil) মধ্যাহ্ন এবং রাত্রিতে আহারের পর ৫ হইতে ৫ কোটা মাত্রায় সেবনে উপকার দর্শিলেও দর্শিতে পারে।

কর্ণের পটহের শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর অস্থখ (Diseases of the mucous membrane of the Tympanum.) ।

(১) পটহের শ্লেষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ (Inflammation of the mucous membrane of the Tympanum.) । একন, বেল, ক্যামোবিলা, মার্ক, সাল্ফ্. ।

(২) পটহের শ্লেষ্মিক ঝিল্লিতে শ্লেষ্মার সঞ্চয় (Accumulation of mucus within the Tympanum.) । কান দিয়া পূঁষাদি ক্লেদ নিঃসরণ (Otorrhœa.) । মার্ক, হিপ-সাল্ফ্., মিউর-আন্, কষ্ট্., ক্যাক্-কার্ক, সাল্ফ্., নাইট্রিক-আন্, আয়োড্., অরাম্, মার্ক-আয়োড্., সাইলিসি, ক্যালী-আয়োড্., টেলুরিয়াম্. । এতন্নিম্ন গণ্ডমালা (Scrofula) এবং কর্ণ শুলের ঋতুগুণ্য। ইহাতেও কডলিবার অয়েল্. (Cod-liver oil) উপকারী ।

বধিরতা (Deafness) । কার্য্য সম্বন্ধীয় বা স্নায়বিক বধিরতা (Functional or nervous Deafness) ; (১) মস্তিষ্কের ব্যঙ্গিক পরিবর্তন, অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা, কানের আভ্যন্তরিক এবং বহির্দেশের অবরোধ, পটহ পুরু হওয়া এবং উহাতে ক্ষত ও ছিদ্র হওয়া ; কানের মধ্যে শ্লেষ্মা, সিরাম্ বা পূঁষ হওয়া ; ইউষ্টেকিয়ান্ নলীর (Eustachian tube) শ্লেষ্মিক ঝিল্লী পুরু হওয়া, আকুস্টিক্ স্নায়ুর (Acoustic nerve) পক্ষাঘাত, মোহক জ্বর, আরক্ত জ্বর, বাতজনিত জ্বর, হামজ্বর, কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থির প্রদাহ, গরমীর ব্যারাম, ক্ষুদ্রসন্ধি বাত বা গাউট্., অধিক পরিমাণে কোইনাইন্ কণ্ডর, নানা প্রকারের তরুণ এবং পুরাতন আকারের প্রদাহ ও গলার মধ্যের অস্থি ইত্যাদির দরুণ বধিরতা ; (৩) বোবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বধিরতা (Deaf-dumbness) ; (৪) ঠাণ্ডা লাগা, কানে হঠাৎ শব্দ লাগা, কানে ঘুলা বা প্রবল আঘাত ইত্যাদি লাগা, আঘাত লাগিয়া অভিটারি স্নায়ু (Auditory-nerve) কাটিয়া যাওয়া ; কানের যোজক ঝিল্লীর ক্ষীণি, কানে ঠেল হওয়া, অথবা কানের মধ্যে কোন পদার্থ ঢুকিয়া লাগিয়া থাকা, মূগী রোগ, সন্তান প্রসব, মস্তিষ্কে আব (Tumour) এবং স্নায়ুশুলের দরুণও বধিরতা হইতে পারে । ধাতুগত দুর্বলতা এবং গণ্ডমালার দরুণ বধিরতায় ক্ষয়ক্ষতি ;

কোন নির্দিষ্ট সময়ে জায়বিক বধিরতায় কোইনি-সাল্ফ্ ; দূরের শব্দ শুনিতে অশক্তিতে আয়োড্, ফস্-আস্ ; স্থানস্পন্দন সম্বলিত বধিরতায় ক্যাক্টাস্, পিট্রোল্, স্পঞ্জ্, আস্, সাল্ফ্ ; ঠাণ্ডা লাগিয়া বধিরতায় একন্, বেল্, পাল্ (তরুণ হইলে) ; পুরাতন হইলে মার্ক্, ক্যালী-আয়োড্ ; শেখশেতিয়া স্থানে থাকার দরুণ ঠাণ্ডা লাগিয়া বধিরতায় ডাল্ফ্ ; বধিরতার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় বেদনার ত্রাই। অরাদি অন্ত্রের পর বধিরতা, মোহক বা আরক্ত জরের পর বধিরতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরায় বেল্ ; হামজর এবং কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থির প্রদাহের পর বধিরতার পাল্ ; মস্তিষ্ক এবং কসেফকা মজ্জাবিরক প্রদাহের পর বধিরতায় সাইলিস্, চায়না, সাল্ফ্, ফস্-আস্ ; কর্ণের চতুর্দিকের ফুসুড়ী বসিয়া যাওয়া বা কানের নিঃসরণ রক্ত হওয়ার দরুণ বধিরতায় সাল্ফ্, হিপ্-সাল্ফ্, অরাম্ । গলার মধ্যে অন্ত্র, যথা টনুসিল্ প্রদাহ ইত্যাদিতে মার্ক্-আয়োড্, ক্যালী-আয়োড্, মার্ক্-কর, আয়োড্, ব্যারাইটা-আয়োড্, আয়োড্-সাল্ফ্, বেল্, ক্যাল্-ফস্, ব্যারাইটা-কার্ক। মাথায় জ্বালাতাদি লাগিয়া বধিরতা এবং বধিরতার সঙ্গে সঙ্গে কানের মধ্যে হামা দেওয়ার জ্বার ফুসুড়ী থাকিলে আর্গিকা, কুইনি-সাল্ফ্ ; কানে শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বধিরতায় বেল্, চিনিলাম্-সাল্ফ্, অরাম্, পিট্রোল্, পাল্ ; কানের মধ্যে বারবার বাতাস প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, সেরূপ আন্দোলনের শব্দ হওয়ার সহিত বধিরতায় কষ্ট্, গ্রাফ্ ; ধূম কলের শব্দ যেরূপ হয়, কানের মধ্যে সেরূপ শব্দ হওয়ার সহিত বধিরতায় • ডিক্টিট্ ; কানের মধ্যে গোলমলে সোঁ সোঁ শব্দের সহিত বধিরতায় হাই-ড্রাষ্ট্ ; কানে কোন প্রকারের শব্দ অসহ্য হওয়ার সহিত বধিরতায় নাক্স-বস্ বা ইগ্-নোস্ ; কানে সোঁ সোঁ শব্দ ও গনে গোলমলে বোধের সূহিত কানে কম শুনাতে ব্যাপ্ট্ ; শরীরের সকল স্থানে রক্ত সঞ্চালনের অসমতার দরুণ মাথা ঘোরায় সঙ্গে সঙ্গে বধিরতায় বেল্, বিরেট্-বিরাইড্ ; মাথার উপরিভাগ বা কপালে ভারিবোধের সহিত মস্তিষ্কে গোলমলে বোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বধিরতায় ব্রোমাইড্, অব্, পটাশ্, জেল্ ; বৃদ্ধ বয়সে বধিরতায় কানের মধ্যস্থিত যন্ত্রের কার্যের হীনতার দরুণ বধিরতার ফফরাস্ বিশেষ উপকারী।

কর্ণ শূল (Otalgia)। একন্, আগারিকাশ, এপিস, আর্গিকা, আর্স, আসাক্, আসেরাম্, অরাম্, ব্যারাইটা-কার্ক, বেগ্, বার্কেট্রিস্, বোবিষ্টা, ব্রাই, ক্যাট্, ক্যাঙ্কার্ক, ক্যাঙ্ক-আয়োড্, ক্যাঙ্ক-ফস্, ক্যাপ্স্, কার্কো-বেজ্, কষ্ট্, ক্যামোমিলা, চেলিডন, চায়নী, সিকুটা, সিষ্টাস্, কোনারাম্, কিউরেয়ার, ডাল্‌ক্, ইলাপ্স-কর, জেলস্, গ্লোনয়েন, গ্রীক্, গোয়েকাম্, হিপ্-সালফ্, হাইড্রাষ্ট্, আয়োড্, ক্যালী-বাই, ক্যালী-কার্ক, ক্যালী-আয়োড্, ক্যালী-মিউর, ক্যালী-সালফ্, জিয়াজ্, ল্যাক্-নাস্, লেডাম্, লাইকোপ্, ম্যাগ্নেস-মিউর, মেকাইটিস্, মার্ক্-ডালস্, মার্ক্-সল্, মেজিরিয়াম্, মিউর-আস্, নেট্রাম্-কার্ক, নেট্রাম্-সালফ্, নাইট্রিক্-আস্, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, ফস্-আস্, ফাইটোল্, পিক্রিক্-আস্, প্লাণ্টেগো, প্লাটিনা, সোরিনাম্, পালস্, রডোড্, রাস্টক্স, সাক্সনোরিয়া, সাইলিসি, স্পাইজেল্, ষ্ট্রামন, সালফ্, টেলুরিয়াম্, টিরিবিং, থেরিডিয়ান্, থুজা। কানের মধ্যের যাতনা সম্বলিত যতপ্রকারের অসুখ আছে তাহাই কর্ণশূল নাম দিয়া এই স্থলে লিখিত হইল।

নাসিকার রোগ সমূহ

(DISEASES OF THE NOSE.)

নাকের মধ্যে দুর্গন্ধযুক্ত ঘা বা ওজিনা (Ozæna)। নাইট্রিক্-আস্, আলুমেন, আর্স, এরাম্, অরাম্, ব্যাপ্ট্, গ্রীক্, হাইড্রাষ্ট্, আয়োড্, ক্যালী-বাই, মার্ক্-বিনিয়াড্, ক্যালী-কার্ক, মার্ক্-কন্, সাক্সনোরিয়া, থেরিডিয়ান্, জিক্স-মেট, সাইক্রেমেন্, জেলস্, ফাইটোল্, ষ্টিজ্, পালস্, ম্যাগ্নেস-মিউর। রোগ গরমীর ব্যারাম জনিত হইলে অরাম্-মেটলিকাম্ ২য় বা ৩য় দশমিক ক্রমের শুঁড়া, ২ বা ১ গ্রেইন্ মাত্রায় প্রতিদিন ২১০ মাত্রা করিয়া সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহাতে নাইট্রিক্ আসিড্ ১ম দশমিক ক্রমের আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায়, প্রতিদিন ২১০ মাত্রা করিয়া সেবনেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। উক্ত দুই ঔষধের উপকারিতা

সম্বন্ধে কাইলেডেল ফিরাহ, ইং ১৮৯০ সনের ১৫ই জুলাই তারিখের, হোমিও-প্যাথিক রেকর্ডার (Homœopathic Recorder of the 15th July, 1890) নামক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্রিকায় লেখক লিখিত যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সুবিধা হইলে পাঠকগণ উহা দেখিতে পারেন । এই রোগে কড্‌লিবার অয়েল্ (Cod-liver oil) বিশেষ উপকারী ।

নাকদিয়া রক্ত পড়া (Epistaxis, -Bleeding from the nose) । একন্, অংগারিকাশ্, আমন্-কার্ক, আণিকা, বেল্, ব্রাই, কার্কো-বেজ্, চায়না, ক্রোকাশ্, ইরিজারন্, হানামেলিস্, ইপিকাক্, ফফরাস্, পাল্‌স্, সিকেল্, ফেরাম্, মিলিফোলিয়াম্ ।

নাসা বা নাকড়া (Polypus-Nasi, -Polypus of the nose) । ক্যাক্-কার্ক, টিউক্রিয়াম্, মার্ক্-আয়োড্, ক্যালী-বাই, ফফরাস্, থুজা, সাজুনেরিয়া, ওকিয়াম্, বেল্, সাল্‌ফ্ ।

নাকের আত্মাণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ (Anosmia, -Loss or perversion of the sense of smell) । একন্, বেল্, ক্যাক্-কার্ক, জেল্‌স্, নেট্রাম্-মিউর, নাজ্-বম্, ফস্, পাল্‌স্, সাজুনেরিয়া, সিপিরা, লাইলিস্, সাল্‌ফ্, আলাম্, অরাম্, ক্যাপ্স্, কষ্ট্, হিপ্-সাল্‌ফ্, হায়োস্, ইপিকাক্, ক্যাল্মিয়া, লাইকেপ্, ম্যাগ্নেস্-মিউর, মেজিরিয়াম্, নাইট্রিক্-অম্, ওলিয়াগার, ওপিয়াম্, রাস্টক্, বিরেটাম্, ক্যাক্-কার্ক, মার্ক্ ।

রক্ত সঞ্চালন সম্বন্ধীয় যন্ত্রের অস্থখ

(DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.)

• হৃৎপিণ্ডের রোগ সমূহ (Diseases of the Heart) ।

হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ (Carditis), হৃৎবাহ্যাবরক বিল্লী প্রদাহ (Pericarditis), হৃৎদন্তাবরক বিল্লী প্রদাহ (Endocarditis) । একন্, ডিজিট্, বিরেট্-আব্, অম্, স্পাইজেল্-ফফরাস্, ব্রাই, ল্যাকেস্, সাল্‌ফ্,

ক্যাঙ্ক, আণিকা, বেল, অরাম, ক্যানাবিস্-স্যাট্, ডিজিট্, আয়োড্, ক্যালী-কার্ক, ক্যালমিয়া, পাল্‌স্, রাস্‌টক্স্, টেবেকাম্, কল্‌চ্, নেজা।

হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি (Hypertrophy or Enlargement of the Heart)। ডিজিটালিন্ বা ডিজিটালিন্, একন্, নেজা, ক্যাঙ্ক, আণিকা, ফেরাম্, পাল্‌স্, চায়না, আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, প্রাটিনা, সিগিয়া, নাক্স-বম্, ক্যামোমিলা, ওপিয়াম্, ককিয়া, বিরেট্-বিরাইড্, বেল্, কার্কো-বেজ্, আস্, স্পাইজেল্, অরাম্, প্রাধাম্, কুপ্রাম্-সাল্‌ক্, নেট্রাম্-মিউর, পিটোল্।

হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতি (Dilatation of the Heart)। ডিজিট্, জেল্‌স্, টেবেকাম্। এতদ্বিন্ন হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি এবং উহার মেদোপকৃষ্টতার (Fatty Degeneration of the Heart) শীঘ্র দৃষ্টব্য।

হৃৎপিণ্ডের মেদোপকৃষ্টতা (Fatty Degeneration of the Heart)। ক্যানফার, বিরেট্-আব্, পাল্‌স্, আমন্-কার্ক্, ডিজিট্, ওপিয়াম্, ক্যানাবিস্, লরোস্, ফেরাম্, চায়না, ক্যাক্-কার্ক্, আস্, আয়োড্, কুপ্রাম্, প্রাধাম্, ফল্-আস্, ফফরাস্, আণিকা।

হৃৎবেদনা বা হৃৎস্নায়ুশূল (Angina Pectoris, -Breast Pang)। আস্, লবোস্, নাইট্রেট্ অব্ আমিল্, হাইড্রোসায়েনিক্-আস্, কুপ্রাম্, স্পাইজেল্, ডিজিটালিন্, নেজা, আক্সাইট্রা, ক্যাঙ্ক, জেল্‌স্, ল্যাকেস্, টেবেকাম্, বিরেট্-আব্, রাস্‌টক্স্, শাখ্‌কাল্।

মূচ্ছা বা অচেতন হইয়া পড়া (Syncope, -Fainting Fits, -Swooning)। ক্যানফার, মকাল্, আমন্-কার্ক্, একন্, চায়না, আস্, আয়োড্, বিরেট্-আব্, ডিজিট্, বিরেট্-বিরাইড্।

হৃৎস্পন্দন এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যের বৈলক্ষণ্য (Palpitation and irregularity of the action of the Heart)। মকাল্, ককিয়া, আয়োড্, নাক্স-বম্, ফল্-আস্, নাক্স-বম্, ডিজিট্, টেবেকাম্, চায়না, আটোপিয়া, একন্, ক্যাঙ্ক, পাল্‌স্, স্পাইজেল্, হাইড্রোসায়েনিক্-আস্, লিলিয়াম্-টাাইগ্রি, ল্যাকেস্, ইকুলাস্, আমন্-কার্ক্, আস্, আসাফিটিডা, ব্যাডায়গা, বেল্, ক্যাডমিয়াম্, ক্যাক্-কার্ক্, প্রাটিনা, পডোফ্, সিকেল্, সাল্‌ফ্, অরাম্, ককিউল, ফেরাম্, জেল্‌স্।

অসম নাড়ী (Intermittent Pulse)। ডিজিট, ফফরাস, নাক্স-বম, ফস-আস, একন্, বেল, স্পাইজেল ।

ধমনীর প্রদাহযুক্ত স্ফীতি বা বিস্তৃতি (Aneurism)। একন্, ক্যালী-আয়োড, আণিকা, বিরেট-বিরাইড, বেল, ডিজিট, জেলস্, সিমিসিক্, ক্যাক্স-কার্ক, ফস্, লাইকোপ, নেট্রাম্-সালফ্ ।

শিরার প্রদাহ (Phlebitis, Inflammation of the veins)। ফফরাস, এপিস্, ল্যাকেস্, সিকেল, আস্, মার্ক, ব্রাট, ষ্টাফিস্, রাস্-টক্স, বেল, হামামেলিস্, পালস্, একন্, হায়োস্, কার্কো-বেজ্, সাইলিলি, হিপ্-সালফ্, লাইকোপডিয়াম্, নাক্স-বম, আণিকা, চারনা, কোনারাম্, সালফ-বাপট, মিউর-আস্, বিবেট, ক্যামোমিলা, স্পাইজেল, জিকাম্ ।

শিরার বিস্তৃতি (Varicose Veins)। হামামেলিস্, পালস্, সাইলিলি, ক্লোরিক-আসিড, আগারিকাশ্, ষ্টাফিস্, লাইকোপ, গ্রাফ, একন্, আলোজ, আস্থা, আণিকা, আস্, বেল, ক্যালক্স-কার্ক, কষ্ট, চারনা, ফেরাম্, হিপ-সালফ, ঈগ্নেনস্, ক্রিয়াজ্, ল্যাকেস্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-বম, প্লাটিনা, সিপিয়া, স্পাইজেল, সালফ্, জিকাম্, হাইড্রোকোটেইল, মিলিফোলিয়াম্, ফফরাস ।

গুলগণ্ড (Goitre, -Bronchocele, -Derbyshire-Neck)। আয়োড, বিন্ আয়োডাইড অব্ মার্করি, স্পিজিয়া, ক্যালক্স-কার্ক, আয়োডাইড অব্ মার্করি, ক্যালী-আয়োড, নেট্রাম্-কার্ক, ফফরাস, এপিস্, সালফ, ক্লোরিক-আসিড, আস্থা, আমন্, ব্যাডায়াগা, ক্যালক্স-আয়োড, কষ্ট, লাইকোপ, নেট্রাম্-মিউর, ষ্টাফিস্, কার্কো-বেজ্, কোনারাম্, ডিজিট, ক্যালী-কার্ক, ম্যাগ্নেস্-কার্ক, মার্ক, পিটোল্, ফস্-আস্, প্লাটিনা, সাইলিলি ।

এক্স অপথাল্মিক্ গুলগণ্ড (Exophthalmic Bronchocele)। ফেরাম্, ক্যাকট, বেল, প্রোনয়েন্, নাইট্রেট অব্ আরিল, নেট্রাম্-মিউর, লাইকোপ, চারনা, পালস্, নাক্স-বম, আয়োড, নেট্রাম্-মিউর ।

শ্বাসযন্ত্রের অসুখ

(DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.)

গ্রীষ্মকালীয় সর্দিজ্বর বা হাঁপানি (Hay asthma,-Hay-Summer-catarrh)। ইপিকাক্, হাইড্রো নারেনিক্-আন্, ক্যালী-বাই, কার্বো-লিক্-আন্, ইউফে-স্, আন্, আয়োড্, ক্যালী-আয়োড্, স্যাবাডিল্লা, মার্ক্-সল্, অরালিয়া-রেসিমোসা।

প্রকৃত ঘুংড়ী কাশি (Croup or Angina Trachialis,-Inflammatory Croup)। একন্, হিপ্-সাল্ফ্, আয়োড্, স্পঞ্জ্, ক্যালী-বাই, ব্রোমিন্, কক্ষরান্, আন্টি-টার্ট্, আমন্-কষ্ট্, বেগ্, ক্যাল্-কার্ক্, ক্যামোমিলা, ল্যাকেস্, সান্নুনেরিয়া, ব্রাই, ইপিকাক্।

সর্দিজ্বর বা ক্যাটার (Coryza,-Catarrh)। ক্যাক্সার, একন্, এলি-য়ান্-সিগা, আন্, বেগ্, ব্রাই, কার্বো-বেজ্, ডাল্ফ্, জেলস্, মার্ক্-সল্, নাক্স-বম্, পালস্, সাল্ফ্, আমন্-কার্ক্, অরাম্, ক্যামোমিলা, হিপ্-সাল্ফ্, ইপিকাক্, ক্যালী-বাই, ল্যাকেস্, গ্রাষু-কান্, সিসিরা, আমন্-ব্রোমাইড্, হাইড্রাষ্ট্, ক্যালী-কার্ক্, মার্ক্-আয়োড্, স্যাবাডিল্লা, সান্নুনেরিয়া।

স্বরভঙ্গ বা স্বরশূন্যতা (Aphonia,-Loss of voice,-Hoarseness)। একন্, আলুমিনা, আমন্-কার্ক্, বেগ্, ক্যাল্-কার্ক্, কার্বো-বেজ্, কষ্ট্, ক্যামোমিলা, ডুসিরা, ডাল্ফ্, জেলস্, হিপ্-সাল্ফ্, ক্যালী-কার্ক্, লাইকোপডিয়াম্, মার্ক্-সল্, নাক্স-বম্, কন্, ফাইটোল্, পালস্, রাস্টক্স্, সাল্ফ্, ব্রাই, স্পঞ্জ্, আণিকা, ব্যারাইটা-কার্ক্, ক্যালী-বাই, স্ট্রোনয়েন্, অক্সালিক্-আন্, কষ্ট্, জেলস্।

বায়ু উপনল প্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis)। একন্, আমন্-কার্ক্, আন্টি-টার্ট্, আন্, বেগ্, ব্রাই, কষ্ট্, ক্যাক্স-কার্ক্, কার্বো-বেজ্, হিপ্-সাল্ফ্, ইউপেট্-পাক্, ইপিকাক্, এপিস্, ক্যালী-বাই, ল্যাকেস্, লাইকোপডিয়াম্, মার্ক্, কন্, পালস্, ব্রোমিন্, সেনিগা, সোলেননাম্, রাস্টক্স্, সাল্ফ্, স্পঞ্জ্, বিরেট্-আল্, ক্যামোমিলা, আয়োড্, ব্রোমিন্, ব্যারাইটা-কার্ক্, এপিস্, ক্যানায়াম্, রাস্টক্স্, ইগ্নেনস্, আমন্-কার্ক্, বেজো-

সিক্-আস্, কমেক্স্, গ্রাফ্, জিফাম্-মেট্, ক্যালী-কার্ক্, ক্যানাবিস্-ইণ্ড্, আট্রোপিন্, মফিরা-আসিটেট্, নাক্স-বম্, নেট্রাম্-মিউর, চায়না, সাবুনেরিয়া, ইকুগান্-চিপ্, হায়োন্, নাইট্রিক্-আস্, আরালিয়া। শ্বাস-নলীর প্রসারণ (Bronchiectasis) বাহার দরুণ স্নেহাতে অত্যন্ত দুৰ্গন্ধ হয়, উহাতে সাল্ফ্, ক্যাঙ্ক্-কার্ক্, ষ্ট্যানাম্ ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র বায়ু নলের স্থিতি এবং বিস্তৃতিতে (Emphysema) লোবিলিয়া-ইন্ফ্লেটা, আণ্টি-টার্ট্, আস্, কার্কো-বেজ্, লাইকোপডিয়াম্, ডিজিট্, ফস্ ব্যবস্থা। এতদ্বির কালির লীধ্ দ্রষ্টব্য।

হাঁপানিকাসি (Asthma)। একন্-রাডিক্স্, ইপিকাক্, আস্, নাক্স-বম্, লোবিলিয়া-ইন্ফ্লেটা, বিরেট-আল্‌ব্, সাল্ফ্, ক্যানাবিস্-স্কাট্, ডিজিটালিন্, ক্যালী-আয়োড্, ইউপেট্-পাক্, কমেক্স্, ষ্ট্যানাম্, পাল্‌স্, মঞ্চাশ্, কলট্, ককিউল্, ষ্টাকিন্, নাক্স-মক্, ওপিয়াম্, নাইট্রিক্-আস্, মফিরা, প্রাধাম্-মেট্, আয়োড্, জিক্-মেট্, অরাম্, লাইকোপডিয়াম্, বোবিষ্টা, ল্যাক্টিকান্‌বিরোসা, আরালিয়া-রেসিৰোসা, আর্জেন্ট্, সিপিরা, ক্যাঙ্ক্-কার্ক্, কার্কো-বেজ্, কষ্ট্, অসফিটিডা, আস্থ্রা, ব্রোমিন্, ব্রাই, ক্যামোমিলা, চায়না, কোনারাম্, ফেরাম্, ক্যালী-কার্ক্, ল্যাক্স্, ফক্ষরাস্, বিরেট্-আল্‌ব্; হাইড্রোদায়নিক্-আস্।

ফুস্ফুস প্রদাহ (Pneumonia, Inflammation of the Lungs)। একন্, আস্, বেজ্, ব্রাই, কার্কো-বেজ্, ইপিকাক্, ক্যালী-কার্ক্, লাইকোপ্, মার্ক্, নাইট্রাম্, ওপিয়াম্, ফক্ষরাস্, রাস্-টক্স্, সাবু-নেরিয়া, হিপ্-সাল্ফ্, আণ্টি-টার্ট্, সাল্ফ্, অক্সালিক্-আস্, ব্রোমিন্, চেলিডন, আয়োড্।

ফুস্ফুসাবরক্ বিল্লী প্রদাহ (Pleurisy, Pleuritis)। একন্ এপিগ্, আণিকা, আস্, আস্‌ফ্রিপিয়াম্, ব্রাই, ক্যাঙ্ক্, ডিজিট্, হিপ্-সাল্ফ্, ক্যালী-কার্ক্, মার্ক্, ফক্ষরাস্, রাস্-টক্স্, রেনান্‌কুলাস্, স্কইলা, সাল্ফ্, আণ্টি-টার্ট্, হেলিওপার, আয়োড্, নাক্স-বম্, কার্কো-বেজ্, স্যাবাডিলাহাস্, জেল্, নাইট্রিক্-আস্, সাইলিন্, ফেরাম্, ক্যালক্-কার্ক্, স্যারাইটা-কার্ক্,

কৃত্রিম ফুস্ফুসাবরক্ বিল্লী প্রদাহ বা প্লুরোমিয়া, পিসিসিক্,

rodynia) । একন্, ব্রাই, সিমিসিক্, রেনান্‌কুলান্, কলচ্, অর্গিকা, আন্
নান্-বন্, পাল্‌স্ ।

কফ বা কাশি, -উৎকাশি (Cough) । একন্, আণ্টি-টার্ট্, অর্গিকা,
নাইট্রিক্-আসিড্, আলুমিনা, আয়ু, আন্, এরাম্, বেল্, বিন্মাথ্, ব্রোমিন্
ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, ক্যাপ্‌স্, কষ্ট্, ক্যামোমিল্, চার্ননা, সিলা, কোনারাম্,
কোরেলিয়াম্, ক্রোটেলান্, ডুসিরা, হিপ্‌সাল্‌ফ্, হাইড্রাস্, ইগ্নেস্, ইপি-
কাক্, ক্যালী-ব্রাই, ল্যাকেস্, ল্যাকটুকা, লোবিলিয়া, লাইকোপডিয়াম্,
মার্ক্, নেজা, নেট্রাম্-কার্ক্, নাক্‌স্-বন্, নেট্রাম্-সাল্‌ফ্, কফবাস্, ফন্-
আস্, পাল্‌স্, ক্রমেজ্, শ্যাম্বুকাস্, সিলা-ম্যারিট্, সেনিগা, সাইলিসি,
স্পঞ্জ, ষ্টেনাম্, সাল্‌ফ্, বার্ক্যাকাম্, বারোলা-অডোরোটা, বিরেট্-অগ্‌ব্,
আয়োড্, অকজালিক্-আন্, সিমিসিক্, চের্ণডন্, কোকাস্, কুপ্রাম্, কেরাম্,
জেল্‌স্, গ্রাক্, লরোস্, ন্যাঞ্জনাম্, ফন্-আন্ । “ ”

পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রের অস্থখ

(DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.)

মুখগৃহের প্রদাহ (Stomatitis, -Inflammation of the mouth) ।
আন্, মার্ক্-সল্, নাইট্রিক্-আন্, হাইড্রাট্, ব্যাপ্ট্, ক্যালী-ক্লোরিকাম্,
কার্বো-বেজ্, ডাক্, ক্যাঙ্ক্, ক্যাপ্‌স্, হেলিবোরাস্, আয়োড্, আইরিস্,
মার্ক্-কর, নান্‌-বন্, ফাইটোল্, সাইলিসি, কফরাস্, কফরিক্-আন্,
ক্যালী-ব্রাই, হিপ্‌সাল্‌ফ্, এরাম্, ক্যালী-আয়োড্ ।

মুখগৃহের মধ্যে ক্ষত (Aphoe, -Thrush, -Soremouth) ।
একন্, আন্, ব্যাপ্ট্, বোরাক্স, ক্যালক্-কার্ক্, কলোফিলাম্, ক্যামো-
মিল্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আন্, নান্‌-বন্, ক্যালী-ক্লোরিট্, ষ্টাক্‌স্, সাল্‌ফার,
সাল্‌ফ্-অ-আন্, মিউর-আন্ ।

দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস (Offensive-Breath) । কার্বো-বেজ্,
হিপ্‌সাল্‌ফ্, নাইট্রিক্-আন্, মার্ক্-সল্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্ ।

মুখে পচাযুক্ত বা বা ক্যান্‌সার (Cancerum Oris)।
মার্ক-সল্, মিউর-মাস, নাইট্রিক-মাস, কালী-ক্লোরেট, আর্স, হাই-
ড্রাই। এতদ্বির সুখগ্হবরের মধ্যে ক্ষতের নীৰ্ব্বে দ্রষ্টব্য।

দাঁত উঠার সময় অসুখ (Troubles during Dentition-
Teething)। একন্, আলুমিনা, এপিস্, আস্, বেল, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যান্-
কার্ক, ক্যামোমিলা, দ্বিকুটা, সিলি, কক্কিয়া, কুপ্রাম্-মেট, ডাক্, ফেরাম্,
গ্রাফ্, হিপ-সাল্ফ, হায়োস্, ইগনেস্, ইপিকাক্, ক্রিয়াজ্, ল্যাকেন্, লাই-
কোপ্, ম্যাগনেস্-কার্ক, ম্যাগনেস্-ফস্, মার্ক্, নাক্স-মক্, নাক্স-বম্,
পডোফ্, রম্, সাইলিসি, সাল্ফ, সাল্ফ-আস্, বিরেট-আল্, ষ্টায়ন্।

দন্তশূল বা দাঁতে বেদনা (Odontalgia, -Toothache)। একন্,
আর্টি-ক্রুড, আস্, বেল, ব্রাই, ক্যান্-কার্ক, ক্যামোমিলা, কক্কিয়া, ডাক্,
হায়োস্, ক্রিয়াজ্, ম্যাগনেস্-কার্ক, মার্ক্, মেজিরিয়াম্, নাক্স-মক্, নাক্স-
বম্, প্লাটিনা, পাল্, নিপিয়া, স্পাইজেল্, ষ্টাকিস্, সাল্ফ, আর্নিকা, রাস্,
টক্স, কার্বো-বেজ্, ব্যারাইটা-কার্ক, চারনা, হিপ-সাল্ফ, ইগনেস্, ওপি-
য়াম্, ফফরাস্, সাইলিসি, রডোড্, কল্চ, সাইক্লোমেন্, ইউফোরসিয়াম্,
মোনয়েন্।

দন্তমাড়ি ব্রণ (Gum boil)। হেক্-লা-লাবা, ফস্, বেল, ক্যান্-
কার্ক, হিপ-সাল্ফ, মার্ক্, সাইলিসি, একন্, ফস্, সাল্ফ।

জিহ্বা প্রদাহ (Glossitis, -Inflammation of the Tongue)।
রেল্, মার্ক্, একন্, হিপ-সাল্ফ, নাইট্রিক-মাস্, এপিস্।

জিহ্বায় ক্ষত (Ulceration of the Tongue)। মার্ক্-বিনায়ো
ডাইড, নাইট্রিক-মাস্, হাইড্রাইট্, মার্ক-সল্।

বন্ধজিহ্বা (Lingua Froenata, -Tongue-tie)। এই রোগ অস্বচিকিৎসা
সম্বন্ধীয়। অতএব ইহার চিকিৎসা অস্বচিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

গলার মধ্যে তরুণ এবং পুরাতন আকারের বেদনা বা
ক্ষত (Sore-throat, Acute and Chronic)। একন্, ইঙ্কগারস্, এইলাছাস্,
এপিস্, আমন্-কার্ক, আর্জেণ্ট-নাইট্রিক্, এরাম্, ব্যাপ্ট্, ব্যারাইটা-কার্ক,
বেল, ক্যান্ট, ক্যান্-কার্ক, ক্যান্, ক্যাপস্, ক্যামোমিলা, নিমিসিক্,

জেলস্, হিপ্-সাল্ফ্, ইগ্নেস্, আয়োড্, ক্যালী-বাই, ল্যাকেস্, লাই-কোপডিয়াম্, ম্যান্‌সিনেসা, মার্ক্-সল্, মার্ক্-কর, নেজা, নাক্স-বম্, ফফরাস্, ফাইটোল্, পালস্, রাস্-টক্স্, সাইলিসি, অক্সালিক্-অস্, আলুমিনা, আর্গিকা, সিনাবেরিস্, ডাক্।

গলার মধ্যের ঝিল্লির শিথিলতা (Relaxed throat), গলার মধ্যের ঝিল্লীর ক্ষত (Ulcerated throat), গলার মধ্যের ফ্যারিংগ্ নামক অংশের প্রদাহ (Pharyngitis, -Clergimen's Sore-throat)। বেল্, মার্ক্, ফাইটোল্, ক্যাক্-ফস্, অর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, ল্যাকেস্, হিপ্-সাল্ফ্, ক্যালী-বাই, এইলাহ্, আমন্-কার্ক্, এপিস্, ব্যাপট্, ক্যামোমিলা, জেলস্, আয়োড্, লাইকোপডিয়াম্, নাক্স-বম্, কার্বো-বেজ্, ফফরাস্, পালস্, সাইলিসি, অরাম্।

তালুকার পার্শ্বস্থিত গ্রন্থি প্রদাহ বা টনসিলাইটিস্ (Cynanche Tonsillaris, -Tonsillitis, -Quinsy, -Inflammation of the Tonsils)। একন্, আমন্-মিউর, এপিস্, ব্যারাইটা-কার্ক্, বেল্, ক্যাক্-ফস্, হিপ্-সাল্ফ্, ল্যাকেস্, মার্ক্-সল্, মার্ক্-আয়োড্, মার্ক্-বিনায়োডাইড্, নাক্স-বম্, সাইলিসি, সাল্ফ্, অস্, ইকুলাস্, এইলাহ্, আমন্-কার্ক্, ব্যাপট্, ক্যামোমিলা, জেলস্, ইগ্নেস্, আয়োড্, লাইকোপডিয়াম্, ফফরাস্, ব্রাই, প্লাসাম্।

পাকস্থলী প্রদাহ (Gastritis, -Inflammation of the Stomach)। অক্সালিক্-অসিড্, একন্, এপিস্, আর্গিকা, অস্, বেল্, ব্রাই, ক্যাহ্, ইপিকাক্, আইরিস্, মার্ক্-কর, নাক্স-বম্, ফফরাস্, পালস্, বিরেট্-অল্, কার্বো-বেজ্, ক্যালী-বাই, আয়োড্, ক্যাম্ফার, ডিজিট্, মেজিরিয়াম্, টাটারাস্-টিবিরেটাস্, আন্টি-ফ্রুড্, হাইড্রাট্।

পাকস্থলীর পুরাতন ক্ষত (Chronic ulcer of the Stomach)। অটোপিন্-সাল্ফ্, ব্যারাইটা-কার্ক্, অর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, অস্, ক্যালী-বাই, ফফরাস্, প্লাসাম্, নেট্রাম্-মিউর, চায়না, সিকেল্, বিরেট্-অল্, কাস্ক্-কার্ক্, ল্যাকেস্, ইউরেনিয়াম্, ফ্রিজ্, হাইড্রাট্, ইপিকাক্, হামামেলিস্, বেল্।

রক্ত বমন (Hæmatemesis, -Vomiting of blood) । একন্, আর্গিক, আস্, বেল্, ক্যাঙ্ক, কার্কো-বেজ্, চায়না, ইরিজারণ, হামামেলিস্, ইপিকাক্, নাক্স-বম্, ফস্, সিকেল্, বিরেট্-আল্, পাল্, লাইকোপডিয়াম্, হায়োস্, ফফরাস্, মেজিরিয়াম্, ক্যাঙ্ক, নেট্রাম্-মিউর, জিক্কাম্, সাল্ফ্, সিকুটা, সাজুনেরিয়া, মিলিকোণিয়াম্, ব্রাই, সেনিসিয়ো, কলিমনিয়া, আষ্টিলেগো ।

অজীর্ণ (Dyspepsia, Indigestion) । আমন্-মিউর, আনাকার্ড্, আর্টি-ক্রুড, আর্গিকা, আস্, বোবিষ্টা, ব্রাই, ক্যাঙ্ক-কার্ক, কার্কো-বেজ্, ক্যামোমিলা, চেলিডন্, চায়না, জেল্, হিপ্-সাল্ফ্, হাইড্রাষ্ট্, ইগ্নেস্, লাইকোপডিয়াম্, ইপিকাক্, ক্যালী-বাই, নাক্স-বম্, ফফরাস্, পাল্, রোবিনিয়া, কুটা, সিপিয়া, সাইলিসি, ষ্টাকিস্, সাল্ফ্, সাল্ফ্-আস্, মার্ক্, ষ্টাকিস্, ফফরিক্-সাসিড্, ফেরাম্, একন্, বেল্, কলোসিহ্, ক্রিয়াজ্, কুপ্রাম্, ওপিয়াম্, আপোমর্কিরা, ক্যালী-কার্ক, নেট্রাম্-মিউর, ম্যাগ্নেস্-মিউর, কোনায়াম্ ।

পাকস্থলীতে বেদনা বা আক্ষেপ (Gastrodynia, -Cardialgia, -Gastralgia, -Pain or spasm in the Stomach) । হাইড্রোসায়েনিক্-আস্, সাল্ফ্, বিষাথ্, ব্রাই, সিনা, নাক্স-বম্, আস্, ক্যামোমিলা, বেল্, কলোসিহ্, ককিউল্, ইগ্নেস্, সিপিয়া, পাল্, ফেরাম্, চায়না, ক্যাঙ্ক-কার্ক, কার্কো-বেজ্, ফফরাস্, প্রাটিনা, সিকেল্, লাইকোপডিয়াম্, প্রাথম্, ককিয়া, ষ্টাকিস্, টেবেকাম্, ষ্টানাম্, বিরেট্-আল্, জিক্কাম্, কুপ্রাম্, ম্যাগ্নেস-নিস্, ব্রাই ।

অম্লরোগ এবং বুকজ্বালা (Acidity and Heart-burn) । সাল্ফ-আস্, আর্জেন্ট-নাইট্রিক্, ক্যাঙ্ক-কার্ক, বেলিরিয়ানা, নাক্স-বম্, পাল্, ক্যাম্প্, জিজিবার, ক্যাঙ্ক-কার্ক ।

মাথা ঘোরা (Vertigo, Giddiness) । একন্, আয়ু, আমন্-কার্ক, এপিস, আর্জেন্ট-নাইট্রাস্, আর্গিকা, বেল্, ব্রাই, ক্যাঙ্ক-কার্ক, সিকুটা, ককিউল্, কোনায়াম্, ফেরাম্, জেল্, মৌনয়েন্, গ্রাফ্, ইণ্ডিগো, আয়োড্, লেডাম্, মার্ক্, নাক্স-বম্, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, ফফরাস্, পাল্,

রাস্টক্স, সাক্সনেরিয়া, সাইলিস, স্পাইজেল, টেবেকাম, থুজা, ল্যাকেন্স, ব্যারাইটা-কার্ক, ফ্লোরিক-আন্স, ডিজিট, গালফ, হাইড্রো-নাথেনিক্‌ আস্, ব্যাপ্টে, সাইক্রেমেন, ক্রিয়াজ্, পিটোল, নেট্রাম্, মিউর, রাস্টক্স, স্পাইজেল ।

পিভাধিকা হেতু শিরঃপীড়া (Bilious Headache) । ক্যামো-মিলা, নাক্স-বম্, ব্রাই, ইপিকাক্, পাল্ন্স, স্টিপিয়া, নাক্স-মক্, আইরিস্, আন্টি-ক্লুড্, মার্ক্ ।

মুখে জল উঠা (Pyrosis,-Water-Brash) । কার্কো-বেজ্, নাক্স-বম্, লাইকোপডিয়াম্, ব্রাই, গালফ-আন্স, পাল্ন্স, আন্টি-ক্লুড্-আন্স, বিরেট-আব্ ।

বমন (Vomiting,-Sickness) । কার্কোলিক্-আন্স, এথুজা, আন্টি-টার্ট্, আপোমফিরা, আস্, ব্রাই, ক্যামোমিলা, কফিউল্, কোনাগাম্, আরোড, ইপিকাক্, আইরিস্, ক্রিয়াজ্, লোবিলিয়া, মার্ক্, নাইট্রাম্, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, পিটোল, ফফরাস্, কাইটোলাকা, পাল্ন্স, আন্টি-টার্ট্, বিরেট-আব্, কুগ্রাম্-আন্স, বিস্মাথ্, সিকেল্ ।

জল পথে নৌকা বা জাহাজাদি আরোহণে বমন বা বমনোদ্বেগ (Sea-Sickness) । আপোমফিরা, কফিউল্, পিটোল, ষ্টাফিস্, টেবেকাম্, নাক্স-বম্, ক্রিয়াজ্, কবিগীর ক্যাম্ফার, বিরেট-আব্ ।

অন্ত্র প্রদাহ (Enteritis,-Inflammation of the Bowels) । একন্, আন্টি-ক্লুড্, আণিকা, আস্, বেগ্, ব্রাই, ক্যাহ্, কলোসিহ্, লাইকোপডিয়াম্, মার্ক্-সল্, মার্ক্-কর, পডোকিলাম্, বিরেট-আব্, ক্যানী-বাই, ল্যাকেন্স, নাক্স-বম্, ফফরাস্, গালফ্ ।

আমাশয় (Dysentery) । একন্, আলোজ্, আণিকা, আস্, ব্যাপ্টে, বেগ্, ব্রোমিয়াম্, ব্রাই, ক্যাহ্, ক্যাপ্স, কার্কো-বেজ্, ক্যামো-মিলা, চায়না, কলচ্, কলোন, ডাক্, হামামেলিস্, ইপিকাক্, ক্যানী-বাই, ম্যাগ্নেন্স-কার্ক, মার্ক্-কর, মার্ক্-সল্, নাইট্রিক্-আন্স, নাক্স-বম্, ফফ-রাস্, পডোকিলান্, পাল্ন্স, রাস্টক্স, গালফ্, প্রাথম-ম্যেট্, গালফ্ ।

আস, ফস্-আস, ব্যারাইটা-কার্ক, সিকেল, ক্যাক্-কার্ক, ঠাকিস, হিপ-সাল্‌স, বিরেট-আব্‌, ইরিজারণ, ডায়োফরিয়।

অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia-Rupture)। লাইকোপডিয়াম, ককিউল, ওপিয়াম, একন, বেল, নাক্স-বম, ক্যাক্-কার্ক, সাল্‌ফ্‌ ।

অন্ত্রের পরাঙ্গ পুণ্ডীয় পীড়া (Parasitic Diseases of the Intestines),-কুমি (Worms)। একন, বেল, ক্যাক্-কার্ক, চায়না, সিনা, লাইকোপডিয়াম, মার্ক-সল্‌, মার্ক-কর, শ্রাটোনাইন, স্পাইজেল, ষ্টানাম, সাল্‌ফ্‌, টিউক্রিয়াম, আটিকা, ইগ্নেন্স, ফিলিক্স-মাস্‌, আন্টি-ক্রুড, জিকাম্‌, বেলিরিয়ান্‌ ।

উদরাময় (Diarrhoea-Purging)। ফ্লোরিক-আস, ফস্-আস, সাল্‌ফ্‌-আস, একন, আলোজ, আন্টি-ক্রুড, এপিগ্‌, আপোসাই-নাম্‌, আজেন্টি-নাইট্‌ক্‌, অর্পিকা, আস্‌, বেল্‌, বেজ্‌-আস্‌, বিশ্বাথ্‌, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক, ক্যাম্‌ফার, কার্কো-বেজ্‌, ক্যামোমিলা, চায়না, কল্‌চ, সিনা, কলোসিন্‌, ক্রোটন, কুপ্রাগ্‌, ডাল্‌ক্‌, ফেরাম্‌, ফেল্‌গ্‌, গামি গাটি, হেলিবোরাস্‌, হিপ-সাল্‌ফ্‌, হায়োস্‌, জায়োড্‌, ইপিকাক্‌, আইরিস্‌, য়াট্রোকা, লেপ্‌টাণ্ডা, লাইকোপডিয়াম্‌, ম্যাগ্নেন্স-কার্ক, মার্ক্‌, মুকর লুটিয়াম্‌, নাক্স-মক্‌, নাক্স-বম্‌, পিট্রোল, ফফরাস্‌, ফফরিক্‌-আস্‌, পডোফিলাম্‌, পাল্‌স্‌, রুম্‌, রাস্‌টক্‌, রুমেক্‌, সিকেল, সাল্‌ফ্‌, থুজা, বিরেট-আব্‌, মার্ক-কর, কেরাম্‌-মেট্‌, গ্রাফ্‌, ক্যালক্‌-ফস্‌, ক্যালী-কার্ক, সিনিয়া, কষ্ট, প্রাথম্‌, জিকাম্‌, নেটাম্‌-মিউব, নাইট্‌ক্‌-আস্‌ ।

শূল বেদনা বা অন্ত্রাক্‌প (Enterodynia, Enteralgia, Spasms of the Bowels)। একন, আলোজ, আস্‌, বেল্‌, ব্রাই, কার্কো-বেজ্‌, ক্যামোমিলা, চায়না, সিনা, ককিউল, কফিয়া, কুপ্রাম্‌-মেট্‌, ডায়ো-ফরিয়, ডায়োফরিণ, ইগ্নেন্স, ইপিকাক্‌, লাইকোপডিয়াম্‌, নাক্স-বম্‌, ওপিয়াম্‌, প্লাথাম্‌, পাল্‌স্‌, ষ্টানাম্‌, বিরেট-আব্‌ ।

শিশুগণের শূল বেদনা (Colic of Infants)। একন, বেল্‌, ক্যামোমিলা, চায়না, সিনা, কলোস্‌, ইগ্নেন্স, ইপিকাক্‌, লাইকোপডি-য়াম্‌, নাক্স-বম্‌, পাল্‌স্‌, সেনা, বিরেট-আব্‌, রুম্‌ ।

কোষ্ঠবদ্ধ (Constipation,-Costiveness)। নাইটিক্-আস্, আলুমিনা, আগারিকাশ্, আমন্-মিউর, আনাকার্ড, আন্টি-ফুড্, এপিস্, বেল্, ব্রাই, ক্যালক্-কার্ক, কষ্ট্, চেলিডন, কলিন্সনিয়া, গ্রাফ্, হাইড্রাট্, ইগ্নেনস্, আরোড্, আইরিস্, ক্যালী-কার্ক, লাইকোপডিয়াম্, ম্যাগনেস্-মিউর, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, প্লাটিনা, ফফরাস্, প্লাঘাম্-মেট্, গালস্-ক্টা, মার্সিপেরিলা, সিমিয়া, সাইলিসি, সালফ্, সালফ্-আস্, থুজা, বিরেট্-আব্, জিক্-মেট্, ইক্সলাস্, পডোফিলাম্, মার্ক্-কর।

গুহা ফাটা বা গুহো ক্ষত (Fissure and Ulcer of the Rectum)। ইক্সলাস্, গ্রাফ্, নাইটিক্-আস্, ইগ্নেনস্, রাটেনহিয়া, পিটোল্। এতদ্বিন্ন হাইড্রাটিস্ এবং ক্যালেক্সুলার বাহ্যপ্রয়োগ উপকারী (সরল-চিকিৎসার ৪৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভগন্দর বা গুহদ্বারে নালী বা (Fistula in ano)। সাইলিসি, ক্যালক্-ফস্, লাইকোপডিয়াম্, কষ্ট্, নাক্স-বম্, সালফ্, নাইটিক্-আস্, হিপ্-সালফ্। এতদ্বিন্ন ক্যালেক্সুলা এবং হাইড্রাটিসের বাহ্যপ্রয়োগ ব্যবস্থা।

অর্শরোগ (Hæmorrhoids,—Piles)। আসিড্-মিউর, একন্, ইক্সলাস্, আলোজ্, এপিস্, আস্, বেল্, ক্যালক্-কার্ক, কার্বো-বেজ্, কষ্ট্, কলিন্সনিয়া, ডারোকুরিয়া, গ্রাফ্, হার্মামেলিস্, হাইড্রাট্, ইগ্নেনস্, ক্যালী-কার্ক, নাইটিক্-আস্, নাক্স-বম্, ফফরাস্, পডোফিলাম্, গালস্, রাস্-টক্স, সিমিয়া, সালফ্, লাইকোপডিয়াম্, আমন্-কার্ক, সাইলিসি।

গুহাদ্বারের চুলকানি (Pruritis Ani,—Itching of the anus)। সালফ্, নাইটিক্-আস্, লাইকোপডিয়াম্, আন্টি-ফুড্, আস্, থুজা। এতদ্বিন্ন অর্শ এবং অজীর্ণ রোগের লীর্ষ দ্রষ্টব্য।

গুহাদ্বার বাহির হইয়া পড়া (Prolapsus Ani)। ইগ্নেনস্, নাক্স-বম্, মার্ক্-সল্, পডোফিলাম্, লাইকোপডিয়াম্, সালফ্, ক্যালক্-কার্ক, সিমিয়া, আস্, ব্রাই, অগ্নিকা, ফেরাম্।

যকৃতের সামান্য বিবৃদ্ধি, যকৃতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ,- যকৃতের অসুখ (Simple Enlargement of the Liver,—Congestion

of the Liver, Liver Complaints) । নাক্স-বম, ক্যামোমিলা, আই, বেল, পডোফিলাম, মার্ক, সাল্ফ, চেলিডন, সিপিরা, চায়না, লাইকোপডিয়াম, আইরিস, হিপ-সাল্ফ, ষ্টাফিস, নাইট্রিক্-আস, ফক্ষরাস, আগারিকান, বার্কেরিস, কাডুয়াস, ইউপেট-পাক, ক্যালী-বাই, লেপ্টাণ্ডা, ম্যাগ-নেস-মিউর ।

যকৃতের তরুণ প্রদাহ (Hepatitis Acuta, -Acute inflammation of the Liver) । একন, আস, বেল, আই, চেলিডন, চায়না, হাইড্রাষ্ট, লেপ্টাণ্ডা, নার্ক-নল, মার্ক-ডালস, ল্যাকেস, নাক্স-বম, পাডোফিলাম, ফক্ষরাস, পালস, সাইলিসি, সাল্ফ, কোনারাম, হিপ-সাল্ফ, ক্যামোমিলা ।

যকৃতের পুরাতন প্রদাহ জনিত রোগ সমূহ (Chronic inflammatory affections of the Liver) :—(১) মেদোময় যকৃত (Fatty Liver) ; (২) যকৃতের বিবৃদ্ধি (Hypertrophy of the Liver) ; (৩) যকৃতের পুরাতন হ্রাস ও কঠিনতা (Cirrhosis of the Liver) ; (৪) যকৃতের শিক্তাপকৃষ্টতা (Waxy or amyloid Liver) ; (৫) জায়কলের আকারবৎ যকৃত (Nutmeg-Liver) ; (৬) যকৃতের তরুণ বা পীত হ্রাস (Acute or yellow atrophy of the Liver) । নাক্স-বম, সাল্ফ, চায়না, সিপিরা, লাইকোপডিয়াম, ডিজিট, ফক্ষরাস, অয়োড, কোনারাম, ক্যালক-কার্ক, সাইলিসি, আন্টি-ক্রুড, গ্রাক, মার্ক-বাইবাস, নাইট্রিক্-আস, কার্কো-বেজ, আস, হিপ-সাল্ফ, ক্যালী-কার্ক, ল্যাকেস, চেলিডন, নেট্রাম-মিউর, ফেরাম-মেট, ম্যাগনেস-মিউর ।

পাণ্ডুরোগ, -কামল বা নেবা (Icterus, -Jaundice) । একন, আস, অরান, আই, কাডুয়াস, ক্যালক-কার্ক, ক্যামোমিলা, চেলিডন, ক্রোটেলাস, চায়না, ডিজিট, হাইড্রাষ্ট, অয়োড, লেপ্টাণ্ডা, ম্যানসিনেলা, মার্ক, নাক্স-বম, ফক্ষরাস, পডোফিলাম, পালস, বেল, সিপিরা, ম্যাগনেস-মিউর, সাল্ফ, মিরিকা-সেরিফ ।

পিণ্ডাশিলা (Gall-Stones, Biliary Calculi) । নাক্স-বম, সাল্ফ, ক্যালক-কার্ক, বার্কেরিস, চায়না ।

যকৃতের কৰ্কট রোগ (Carcinoma Hepatis, -Cancer of the Liver)। হাইড্রাষ্, আয়োড্। এতদ্ভিন্ন যকৃতের পুরাতন প্রদাহজনিত রোগ সমূহ এবং কামল রোগের শীর্ষ দ্রষ্টব্য।

অন্ত্রবেষ্টে ঝিল্লীপ্রদাহ (Peritonitis, -Inflammation of the Peritoneum)। একন্, বেল্, বিরেট্-আল্, ব্, মার্ক্-সল্, ব্রাই, সাল্ফ্, আস্, ওপিয়াম্, নাক্স-বম্, চায়না, ফক্ষরাস্, কলোসিস্, এপিস্, মার্ক্-কর, কোইনি-আস্। এতদ্ভিন্ন অন্ত্র প্রদাহের (Enteritis) শীর্ষ দ্রষ্টব্য।

মূত্রযন্ত্রের অস্থখ

(DISEASES OF THE URINARY SYSTEM.)

আল্-বুমেন্ সহ মূত্র বা আল্-বুমিনুরিয়া, -মূত্রকোষ-প্রদাহ, -ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ (Albuminuria, -Nephritis, Bright's Disease)। ফক্ষরিক্-আস্, বেল্, সাইলিস্, এপিস্, আস্, ডিজিট্, ফেরাম্, মার্ক্-কর, প্রাষাম্, টিরিবিহ্, আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, বার্ক্‌বিস্, ক্যাহ্, হেলোনিয়াস্, ক্যালমিয়া, ফক্ষরাস্, সান্সাপেরিলা, সিকেল্, আন্টি-টার্ট্, টিরিবিহ্, একন্, লাইকোপডিরাম্, রাস্-টক্স্।

মূত্রাধারের প্রদাহ (Cystitis, -Inflammation of the bladder)। একন্, এপিস্, আলিকা, বেল্, ক্যাক্সার, ক্যানাবিস্-ইণ্ডিকা, ক্যাহ্, চিমাফিলা, ডিজিট্, ডাক্, মার্ক্, নাক্স-বম্, ফক্ষরাস্, পাল্‌স্, সান্সাপেরিলা, সাল্ফ্, ট্যারান্টুলা, ইউবা-আস্।

মূত্রাধারাদিতে পাথরী (Calculus, -Stone, -Gravel)। নাক্স-বম্, ফক্ষরিক্-আস্, লাইকোপডিরাম্, বার্ক্‌বিস্, ক্যাহ্, পডোফিলাম্, ক্যানাবিস্, জেল্‌স্, একন্, ক্যামোমিলা, অক্সালিক্-আসিড্, নেট্রি-কার্ক্, মার্ক্, হামামেলিস্। এতদ্ভিন্ন পাথর বড় হইলে অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা উহা বাহির করিয়া ফেলা উচিত।

মূত্রাধারের উত্তেজনা বা আক্ষেপ, -মূত্রকৃচ্ছ (Irritability of

the bladder,-Strangury,-Difficult urination) । একন্, এপিস্, অর্গিকা বেল্, ক্যাহ্, ক্লন্, কোনায়াম্, কোপেইবা, ইউপেট্-পাপূর, ফেরাম্, লাইকোপডিয়াম্, মার্ক্-সল্, রাস্ টক্স, নাক্স-বম্, ক্যাম্ফার, ডাল্‌ক্ ।

মূত্রধারণে অশক্তি,-বিছানায় প্রস্রাব করা (Enuresis,-Incontinence of urine,-Wetting the bed) । বেজ্-আস্, বেল্, ক্যাহ্, কষ্ট্, লিনা, কোনায়াম্, ফেরাম্, জেল্‌স্, ক্যালী-ব্রোমাইড্, ক্যালী-নাইট্রিক্, নাক্স-বম্, ফস্ফরিক্-আস্, পাল্‌স্, রাস্ টক্স, অ্যাস্টোনাইন্, সিপিয়া, সাল্‌ক্, পডোফিলাম্, নাইট্রিক্-আস্, স্পাইজেল্, অর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, সাইলিসি, লিনা (স্কুইলা), একন্, সিকেল্, ক্যামোমিলা ।

মূত্রাবরোধ (Dysuria-Retension of urine) । বেজ্-আস্, একন্, এপিস্, অর্গিকা, অ্যাম্পেরেগাস্, বেল্, বার্কেরিস্, ক্যাক্-কার্ক্, ক্যাম্ফার, কোপেইবা, ডিজিট্, ডাল্‌ক্, ইউপেট্-পাপূর, ফেরাম্, জেল্‌স্, হেলোনিয়াস্, হাইড্রাষ্ট্, ল্যাকেস্, লাইকোপডিয়াম্, মার্ক্, নেট্রাম্ মিউয়, নাইট্রিক্-আস্, নাক্স-বম্, ফস্ফরিক্ আস্, ফাইটোজ্, পাল্‌স্, সার্সাপেরিলা, সিপিয়া, টিরিবিঙ্ক্ ।

প্রমেহ রোগ (তরুণ এবং পুরাতন) (Gonorrhoea,-Gleet) । একন্, আগ্নাস্, অর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, ক্যানাবিন্-স্কাট্, ক্যাহ্, ক্যাপ্, কোপেইবা, জেল্‌স্, হাইড্রাষ্ট্, হিপ্-সাল্‌ক্, অ্যায়োড্, নাইট্রিক্-আস্, মার্ক্-সল্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, সার্সাপেরিলা, সেনিসিয়ো, সিপিয়া (জীজলাকর), সাল্‌ফার, থুজা । রোগ পুরাতন হইলে চিমাফিলা, হাইড্রাষ্ট্, ক্যালী-অবোড্, পিট্রোসেলিনাম্, থুজা ।

মূত্রনালীর সংকোচন বা অপ্রশস্ততা (Stricture of the Urethra) । আক্কেপিক্ সংকোচনে ক্যাম্ফার, জেল্‌স্, নাক্স-বম্ । মূত্রনালীর প্রদাহে একন্, বেল্, ক্যাহ্, ক্রিমেটিন্, নাক্স-বম্, মার্ক্-অ্যায়োড্, চিমাফিলা ; প্রদাহ জনিত সংকোচনে ক্যানাবিন্-স্কাট্, হাইড্রাষ্ট্, ক্রিমেটিন্ । এতদ্বিন্ন আগারিকাশ্, ক্যালী-অ্যায়োড্, নাইট্রিক্-আস্, ট্রামন্, অর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, বার্কেরিস্ । এতদ্বিন্ন মূত্রাবরোধের শীর্ষ দ্রষ্টব্য ।

ব্যালানাইটিস্ (Balanitis) । মার্ক্-কর, মার্ক্-থুজা ।

মূত্রাধারের পক্ষাঘাত (Paralysis of the Bladder)। ক্যাথ, সিকেল্।

দুগ্ধবৎ মূত্র বা কাইলুরিয়া (Chyluria)। ইউবা আনু'ই, কক্ষ-রিক্ আসিড্, চায়না।

রক্তমূত্র (Haematuria)। বেল্, হামামেলিস্, মিলিকোলিয়াম্, টিরি-বিহ্। এতদ্বিন্ন মূত্র যন্ত্রের অন্তরের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মূত্রকোষের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (Congestion of the kidneys)। বেল্, টিরিবিহ্।

মূত্রকোষের মেদোপকৃষ্টতা (Fatty degeneration of the kidneys)। কক্ষরাস্।

মূত্রাধারের গ্রীবা এবং মূত্রনালীর মধ্যস্থিত প্রস্টেট্ গ্রন্থির প্রদাহ (Prostatitis, Inflammation of the Prostate Gland)। আরোড্, পান্‌স্, ষ্টাফিস্, থুজা।

শুক্র ক্ষরণ বা অনিচ্ছাপূর্বক ধাতু নিঃসরণ স্বপ্নদোষ, (Spermatorrhoea, Involuntary Emissions)। কক্ষরিক্-আসিড্, ক্যাফার, ক্যাথ্, চায়না, ডিজিট্, আইরিস্, মুফর লুটিবাম্, নাক্-বম্, কক্ষ-রাস্, ষ্টাকিসেগ্রিয়া, আগ্নান্, ব্যারাইটা-কার্ক্, প্লাটিনাম্, ইগ্নেন্স্, জেল্‌স্, আইরিস্, সাগ্‌ফ্, ক্যাক্-কার্ক্, ডিজিটালিন্ ওয় দশমিক ক্রমের ঞ্‌ড়া, কোনাগাম্, সিপিগা, অরাম্-মেট্, অরাম্-মিউব, লাইকোপডিয়াম্, গ্রোফাইটিস্, সাস'পেরিলা, সাইলিসি, থুজা, জিক্-অক্‌সাইড্।

চর্মরোগ সমূহ

(DISEASES OF THE CUTANEOUS SYSTEM.)

ফোড়া (Abscesses)। তরুণ আকারের ফোড়ায় লক্ষণ বিশেষে একোনাইট্, আসিনিব্, আমাকিটিডা, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, হিপার মাল্‌ফিউরিস্, ল্যাকেসিস্, লেডাম্, মার্কিউরিয়াম্, মেজিরিয়াম্, পাল্-মেটিল, রাস্টক্স, সাইলিসিয়া, সাগ্‌কার, আর্গিকা। (২) পুরাতন আকা-রের ফোড়ায় লক্ষণ বিশেষে অরাম্, ক্যাকেরিয়া কার্বোনিকা, কোনাগাম্,

হিপার সাল্‌ফিউরিস্, অ্যামোডিন্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াম্, নাইট্রিক্ অসিড্, ফক্‌রাস্, নাইলিসিয়া, সাল্‌ফার। হাড়ের ফোড়ার লক্ষণ বিশেষে অ্যাসার্কিটিড্, অয়াম্, ক্যাকেরিয়া-কার্ক্, ক্যাকেরিয়া ফক্‌রেটা, হিপার সাল্‌ফার, মার্কিউরিয়াম্, নাইট্রিক্ অসিড্, ফক্‌রাস্, নাইলিসিয়া, সাল্‌ফার। যক্‌তে ফোড়ার লক্ষণ বিশেষে বেলাডোনা, চায়না, হিপার সাল্‌ফার, ক্যালী-কার্ক্, অ্যাকেসিস্, মার্কিউরিয়াম্, ফাইটোলাকা, পডো-ফিলাম্, রুটা, সাইলিসিয়া। গণ্ডমালা জনিত ফোড়াতে লক্ষণ বিশেষে ব্যারাইটা-কার্ক্, বেলাডোনা, ক্যাকেরিয়া-কার্ক্, ক্যাকেরিয়া ফক্‌রেটা, কোনায়াম্, ডাল্‌কেমেরা, হিপার-সাল্‌ফ, ক্যালী-কার্ক্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াম্, নাইট্রিক্ অসিড্, ফক্‌রাস্, রাস্‌টক্স্, ষ্টাকিসেপ্তিয়া, সাল্‌ফার। তরুণ আকারের ফোড়ার তরুণ প্রদাহের জ্বর জ্বর, দপ্‌দপিয়া বেননা, আক্রান্ত স্থান লালবর্ণ এবং ক্ষীত হইয়া উহাতে পুঁথ উৎপন্ন হয়। ফোড়ার পুঁথ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে হিপার সাল্‌ফার, ৩য় ক্রমের গুঁড়া বা ৬৪ ডাঃ ব্যবস্থা। যদি আত্যন্তিক ঔষধ প্রয়োগে ফোড়া ফাটিয়া না যায়, তবে অস্ত্র দ্বারা ফোড়া চিরিয়া পুঁথ বাহির করিয়া ফেলিবে। যদি ফোড়া ফাটিয়া উহাতে পচাযুক্ত বা হয়, তবে উহাতে ক্যাণ্ডেলুলার বাহু প্রয়োগ দ্বারা উপকার দর্শে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, আণবিকার মূল আরোক ফোড়ার উপর লাগাইলে ফোড়া আপনা আপনিই ফাটিয়া পুঁথ বাহির হইয়া যায়। যায় যদি নালাই হয় এবং উহা হইতে জলের জ্বর তরল কলতানি পড়ে, তবে সাইলিসিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। গাঢ় পুঁথ পড়িলে হিপার সাল্‌ফার অধিক উপকারী। আত্যন্তিক মস্ত্রেব ফোড়ার চিকিৎসাও শরীরে বহির্দিশে ফোড়ার চিকিৎসাব জ্ঞায়। ফোড়াতে পুঁথ উৎপন্ন হইলে দপ্‌দপ্ করে এবং টাটায়। এনতাবস্থায় ময়দা এবং তিসির পুল্‌টিশে বাতনার অনেক উপশম হয় এবং ফোড়া শীঘ্র শীঘ্র পাকে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বা বয়স ফোড়া (Acne)। (১) যুবতী বালিকা-পরের মুখমণ্ডলে হইলে লক্ষণ বিশেষে বেলাডোনা, কার্কো-বেজিটিবিলিস্, হিপার-সাল্‌ফার, সাল্‌ফার, অসিনিক্, ক্যাল্‌কেরিয়া, লাকেসিস্, লেডাম্, নেট্রাম্, ব্রোমিন্, লাক্স-বমিকা, ফক্‌রিক্-অসিড্, পাল্‌সেটিলা, অসি-

নিক্স-ব্রোমাইড্, আর্সিনিক-আয়োডাইড্, ক্যালী-ব্রোমেটাম্, সাল্ফার-
আয়োডাইড্ ব্যবস্থা । (২) কঠিন আকারের ত্রণে লক্ষণ বিশেষে কার্বো-
বেজ্, লেডাম্, সাল্ফার, আর্সিনিক্, বেলেডোনা, হিপার-সাল্ফার,
নাক্স-বমিকা, পাল্‌সেটিগা, সাল্ফার, ক্যালী-ব্রোমেটাম্, কালী-আয়ো-
ডাইড্, সাল্ফার-আয়োডাইড্ ব্যবস্থা । (৩) মৃত্তিকা পাণ্ডু রোগাক্রান্ত
(Chlorotic) বালিকাগণের হামের ত্রায় লাল ত্রণে লক্ষণ বিশেষে ক্যাল-
কেরিয়া, সাল্ফার, গ্রাফাইটিস্, হিপার-সাল্ফার, নেট্রাম্ সাল্ফ, নেট্রাম্-
মিউর, সাবাইনা, সেলিনিয়াম্ ব্যবহার্য্য । (৪) মূখমণ্ডলে গোলাপী রঙ্গের
দুস্কৃড়ীতে লক্ষণ বিশেষে কার্বো-আনিমেগিস্, আর্সিনিক্, ক্রিয়াজোট্,
মেজিরিয়াম্, রাস্-টক্স, রুটা, বিরেট্রাম্, ক্যালকেরিয়া, ক্যানাবিস্,
কার্বো-বোজটেবিলিস্, সিকুটা, ক্যালমিবা, নেডাম্, নাইট্রিক্-আসিড্,
ফস্ফরাস্, ফস্ অ্যাস, সাইলিসি, থুজা, অ্যামাম্, অরাম্-মিউর, ক্যাস্,
ক্যাপ্‌স্, কষ্ট, ক্রিমেটস্, ল্যাক্সেসিন্, নাক্স-জুয়ান্স্, পিটোল, প্লাস্মাম্,
সিপিয়া, সাল্ফ, সাল্ফ-অ্যাস্ ব্যবস্থা । (৫) কীটবৎ দুস্কৃড়ীতে (Acne
Vermiformis) লক্ষণ বিশেষে সেলিনিয়াম্, সাল্ফ, গ্রাফ, নেট্রাম্,
নাইট্রিক্-অ্যাস্, ব্রাই, ক্যালক্, ডায়োক্, ডুসিরা, নেট্রাম্-মিউর, অরাম্,
ডিজিট্, প্লাস্মাম্, শ্রাবাডিলা, সাবাইনা । (৬) রক্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট যুবা
যুৱতীর মুখ মণ্ডলে দুস্কৃড়ীতে লক্ষণ বিশেষে বেজ্, কার্বো-বেজ্, হিপ-
সাল্ফ, সাইলিসি, সাল্ফ-আয়োড, অ্যাস-ব্রোমাইড্, ক্যালী-ব্রোমাইড্
ব্যবস্থা । মাতাগণের দুস্কৃড়ীতে লক্ষণ বিশেষে ক্রিয়াজ, লেডাম্, নাক্স-
বম, সাল্ফ, অ্যাস্, ল্যাক্, পাল্‌স্ । (৭) অতিরিক্ত স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস
বা দ্রুতগমনের দরুন হইলে লক্ষণ বিশেষে ক্যালক্, ফস্-অ্যাস্, সাল্ফ
ব্যবস্থা । কখন কখন হাইড্রোকোটাইন্ ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

গ্রন্থি প্রদাহ (Adenitis) । অক্রান্ত গ্রন্থিগুলি ক্ষীত, লাল বর্ণ
'এবং উহাতে দপ্পদিয়া বেদনা বা টাটানিতে বেল্ ; বোগল এবং কুঁচ্কির
গ্রন্থির প্রদাহে (বাগী) পূঁয় হওয়ার উপক্রম হইলে অ্যাস্-আয়োড্ ; গরমীর
ব্যারাম্ বা পারার অপব্যবহার জনিত বাগীতে অরাম্ ; চর্ম্মগ্রন্থিত গ্রন্থির
ক্ষীতিতে ব্রাই ; হস্তাদির নিয়ন্ত্রিত, বোগলের, কুঁচ্কির গ্রন্থি (বাগী),

গ্রীবার গ্রন্থি, কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থি, মুখমণ্ডলস্থ গ্রন্থির প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে কান দিয়া পুঁষ পড়িলে এবং কানে কম শুনিবে কাল্‌ক-কার্ক্‌; স্তনের গ্রন্থির ভ্রায় ক্ষীতি এবং কঠিনতা যাহাতে মোমাছির চাকের ভ্রায় ক্ষত হয়, তাহাতে কার্কো আনিমেল্‌; বোংলের গ্রন্থির ক্ষীতি, হন্নাস্থি নিম্নস্থিত লাল নিঃসারক গ্রন্থির প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাড়ির হাড় পোকায় (Caries) ধরিলে সিষ্টাস্‌; বহির্দেশের গ্রন্থির ক্ষীতিতে কোনারাম্‌; অনেক দিন ধরিয়া গ্রন্থির ক্ষীতি, বিশেষতঃ পারার অপব্যবহারের পর বোংল ও কুঁচ্কির সন্ধির প্রদাহ, উহাতে পুঁষ হওয়া, সন্ধি গুলির গণ্ডমালা জনিত প্রদাহ ও উহাতে পুঁষ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দিবা রাত্রি প্রচুর ঘর্ম, টক ও উগ্র স্বাদ বিশিষ্ট জব্য খাওয়ার ইচ্ছা ও দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়ে হিপার-সাল্‌ফ্‌; কুঁচ্কি, গ্রীবাদেশ অথবা বোংলের গ্রন্থির গণ্ডমালা বা সন্ধি বাত জনিত প্রদাহ এবং কঠিনতায় আরোডিন্‌; আক্রান্ত স্থান ক্ষীত ও ঠাণ্ডা; হন্নাস্থির নিম্নস্থিত, বোংল, কুঁচ্কি, অথবা কর্ণ-মূলস্থিত গ্রন্থির প্রদাহ, ক্ষীতি অথবা উহাতে পুঁষ হওয়া, বিশেষতঃ গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট রোগীব বা গরমীর ব্যারামের দরুণ হইলে মার্ক্‌; বোংল এবং কুঁচ্কির গ্রন্থির প্রদাহ এবং ক্ষীতিতে বাস্টাক্স বিশেষ উপকারী। গ্রীবাদেশ, কর্ণমূলস্থিত, বোংল, কুঁচ্কির সন্ধির ক্ষীতিতে, প্রদাহ থাকুক আর না থাকুক, সাইলিসিয়া বিশেষ উপকারী। সকল প্রকারের গ্রন্থির প্রদাহ, ক্ষীতি কঠিনতা এবং উহাতে পুঁষ হওয়াতেই সাল্‌ফার উপকারী। পারার অপব্যবহার জনিত গ্রন্থির অসুখে ইহা আরো অধিক উপকারী। স্তনের গ্রন্থির ভ্রায় ক্ষীতিতে ফাইটোলাকা বিশেষ উপকারী। স্তনের এই প্রকারের অসুখে হাইড্রাণ্টিস্‌ মূল আরোক ৫ ফোঁটা কতক পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উক্ত লোশনে একখানি সূতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত স্তনে লাগাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ডাক্তার হিউজ্‌ (Dr. Hughes) বলেন যে, অতিরিক্ত দুগ্ধের সঞ্চয় হেতু স্তন ফোড়া হইলে ফাইটোলাকা ব্যবহারে ফোড়া বৃদ্ধি পাইতে পারে না। গ্রন্থি প্রদাহে, বিশেষতঃ গ্রন্থি প্রদাহ যদি গরমীর ব্যারাম, পারার অপব্যবহার বা গণ্ডমালা জনিত হয়, কডলিবার অয়েল্‌ বিশেষ উপকারী,

অনেক রোগীর চিকিৎসার কল দেখিয়া লেখক এরূপ স্থির করিয়াছেন।
মধ্যাহ্নে ৩৪ ফোঁটা এবং রাত্রিতে ৩১৪ ফোঁটা আহারের পর সেব্য । "

চর্মের লালবর্ণ প্রদাহ বা ইরিথিমা (Erythema, Inflammatory redness of the Skin)। বেল, একন্, এপিস, রাস্টল্, ক্যালী-বাই, নাক্স-বম্, ব্রাই, ম্যাঙ্গেনাম্, ফেরাম্, আস্, নানান্ ক্লাস-বাম্ ।

গায় গোলাপী রঙ্গের ফুস্কুড়ী,-কৃত্রিম হাম,-রোজিয়োলা,-
রোজ-রাস্ (Roseola, Rose-rash, False measles)। একন্, রাস্টল্, বেল্ ।

আমবাত বা আর্টিকেরিয়া (Urticaria, Nettle-rash)। এপিস, ক্যাক্-কার্ক, কষ্ট, কোরেল্, কোপেইবা, রাস্টল্, জাটিকা-ইউরেজ্, একন্, আণ্টি-ক্রুড্, নাক্স-বম্, পাল্, ডাল্, ব্রাই, সিমিসিফ্, কলচ্, আস্, ইপিকাক্, হাইড্রাষ্ট, আন্, চিনিনাম্-সাল্ফ্, সাল্ফ্, ইগ্নেস্, কফিরা, বিব্রেট্-বিরাইড্ ।

শিশুগণের চামড়ার ভাজে ভাজে ছাল উঠিয়া যাওয়ার
ক্রিয়া ক্ষত (Intertrigo, Chafing, Soreness of Infants)। ক্যামো-
মিলা, ক্যাক্-কার্ক, লাইকোপডিয়াম্, মার্ক, সাল্ফ্ । এতত্তির ক্যাণে-
জুলার লোশনের (Lotion) বাহ প্রয়োগ প্রয়োজন হইতে পারে। অনেক
সময় ক্যালেলুলার লোশন অপেক্ষা ক্যালেলুলার মিশ্রিত ওলিব্ অয়েল্
আক্রান্ত স্থানে লাগাইলে অধিক উপকার পাওয়া যায় ।

শরীর চুলকানি,-প্রুরাইগো (Prurigo, Itching of the
skin)। আস্, মেজিরিয়াম্, রাস্টল্, সাল্ফ্, একন্, ইগ্নেস্, মার্ক্,
কার্কো-বেজ্, আপোসাইনাম্, কষ্ট ।

লাইকেন্ (Lichen)। যামাছি ইত্যাদিও এই শ্রেণীভুক্ত। সাল্ফ্,
আণ্টি-ক্রুড্, এপিস্, লেডাম্, আস্, নাক্স-জুয়াল্, উহার ঔষধ ।

শিশুগণের ষ্ট্রফিউলাস্ নামক ফুস্কুড়ী (Strophulus, Red
gum, Tooth-rash)। ক্যামোমিলা, আণ্টি-ক্রুড্, পাল্, ক্যাক্-কার্ক ।

ধুস্কি (Pityriasis,-Branny Tetter,-Dandruff) । আস্, গ্রাফ্, লাইকোপডিয়াম্ । গ্লিসেরিন্ সোপ (Glycerine Soap) বা সরিষার তৈলের খেল দিয়া সপ্তাহে একবার করিয়া মাথা ধোয়াইলে অনেক উপকার দর্শিতে দেখা যায় ।

খোস (Psoriasis,-Lepra Vulgaris,-Dry-Tetter) । মার্ক্, অ্যাম্বোজ্, নাইট্রিক্-আস্, স্কাইরিন্, সালফ্, সিপিরা, লাইকোপডিয়াম্, ক্যালী-আরোড্, রাস্-টক্স, মেজিরিয়াম্, পিট্রোল্, কার্বোলিক্-আস্, টিউক্রিয়াম্, আস্, গ্রাফ্, হিপ্-সালফ্ ।

হার্পিস্ (Herpes,-Shingles-Tetter) । একন্, রাস্-টক্স, সালফ্, আস্, হাইট্রোল্, গ্রাফ্, মার্ক্, ফক্-বাস্, টেলুরিয়াম্, সিপিরা, রানান্-কুলান্-বাস্, ম্যাঙ্গেনাম্, ষ্টাকিস্, সিষ্টান্, নেট্রাম্-মিউর ।

বিকচ (Eczema, Catarrhal inflammation of the skin,-Scald head,-Milk-crust) । আনাকার্ড্, আন্টি-ক্লুড্, আস্, ব্যারাইটা-কার্ক্, বেল্, বোবিষ্টা, ক্যাক্-কার্ক্, কাহ্, ক্রিমেটিন্, ক্রোটন্, ডাক্, গ্রাফ্, হিপ্-সালফ্, হাইড্রাষ্ট্, হাইড্রো-কোঁটাইল্, নাক্স-জুয়ান্, ক্যালী-কার্ক্, লাইকোপডিয়াম্, মার্ক্-কর, নেট্রাম্-মিউর, ওলিয়াও, পিট্রো-সেলিনাম্, রাপান্-কুলান্, রাস্-টক্স, সিপিরা, ষ্টাকিস্, সালফ্, থুজা, বায়োলা-ট্রিকালার ।

ইম্পেটিগো নামক ক্ষুদ্র (Impetigo) । আন্টি-টার্ট্, ক্যাক্-মিউর, সিকুটা, ক্যালী-বাই, মেজিরিয়াম্, সাইলিসি, বায়োলা-ট্রিকালার ।

সাইকোসিস্,-মেণ্টোগ্রা,-বার্বার'স্ ইচ্ (Sycosis,-Mentagra,-Barber's Itch) । লাইকোপডিয়াম্, নাইট্রিক্-আস্, প্রাটিন্, থুজা ।

চিলব্লেইন্ (Chilblain,-Chaps) । আগারিকান্, পিট্রোল্, আর্বিকা, ট্যানাস্-কমিউনিস্, পালস্, রাস্-টক্স, কাহ্, বেল্, আস্, ফক্-বাস্, ক্রিয়াজ্, নাইট্রিক্-আস্ ।

ক্ষত (Ulcers) । আন্টিরিয়াস্-ক্রেবল্, (ক্যালেলুগার স্থানিক প্রয়োগ), আসাকিটিভা, কার্বো-বেজ্, কমক্রেডিয়া, হিপ্-সালফ্, হাই-

ড্রাই, ক্যালী-বাই, ল্যাকেস্, মার্ক, মেজিরিয়াম্, সাইটিক্-আস্, সাইলিসি, সাল্ফ্ ।

ব্রণ (Boil,-Furuncle)। পিক্রিক্-আস্, একন্, আর্গিকা, বেল্, বার্কোরিস্, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্-বাইবাস্, সাল্ফ্ ।

দুর্ভব্রণ,-পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncle,-Anthrax)। আস্, বেল্, ব্রাই, কার্কোরি-বেজ্, হিপ্-সাল্ফ্, ল্যাকেস্, মিউর-আস্, রাস্-টক্স্, সাইলিসি ।
যদি পচা লাগিলে ক্যালেলুলা বা কার্কোলিক্-আসিডের বাহু প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে । যতদিন এনে পচাযুক্ত ঘা থাকে, ততদিন উক্ত দুই ঔষধের একটীর লোশন (Lotion) করিয়া উহাতে একখানি স্থতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া ঘর লাগাইয়া রাখিবে । বা পরিষ্কার হইয়া আসিলে ক্যালেলুলা বা কার্কোলিক্-আসিডে অলিভ্-অয়েল্ (Olive oil) মিশাইয়া ঘর লাগাইবে ।

আঙ্গুলহাড়ী (Whitlow,-Felon,-Gathered Finger)। আঙ্গুল-মিনা, এপিস্, আস্, বেল্, গ্রাক্, হিপ্-সাল্ফ্, লেডাম্, মার্ক্, কাই-টোল্, সাইলিসি ।

কড়া (Corns)। আর্গিকা প্রাষ্টার, আর্গিকা লোশন ইত্যাদির বাহু প্রয়োগ ব্যবস্থা । ক্যাক্, সাল্ফ্, (বিরেট্-বিবাইডের বাহু প্রয়োগ), আন্টি-কুড্, লাইকোপডিয়াম্, ফফরাস্, সিপিরা, সাইলিসি ।

বাসঁ প্রদাহ (Bursitis,-House maid's knee,-Miners Elbow)। সাইলিসি, টিক্-টা, আর্গিকা, একন্, বেল্, রাস্-টক্স্, লেডাম্, আরোড্, ক্যালী-আরোড্, গ্রাক্, আগারিকাশ্, হিপ্-সাল্ফ্, সাইলিসি, ব্রাই ।

পায়ের বুহু বা ক্ষুদ্র অঙ্গুলীর সন্ধির উপরস্থিত বাসঁর (Bursa) প্রদাহ (Banion)। আর্গিকা, হিপ্-সাল্ফ্, সাইলিসি, আরোড্ । (আর্গিকা, বিরেট্-বিবাইড্ এবং আরোডিনের বাহু প্রয়োগ) ।

নিবাস্ (Noevus)। ব্জা, ক্যাক্-কার্ক্, (ক্রিয়াজোটার বাহু প্রয়োগ) ।

ওয়েন্ বা সিবেসিয়াল্ টিউমার (Wen,-Sebaceous Tu-

moyle) । ব্যাংক্রাইট-কার্ক, সাইলিসি, ক্যান্টী-আরোড, লাইকোমডিসান, ক্যাক-কার্ক, সাল্ফ ।

আঁচিল (Warts) । ক্যাক-কার্ক, থুলা, আন্টি-ক্রুড, কষ্ট । এতত্ত্বি আঁচিলের উপর থুলায় মূল আরোকেব বাহ প্রয়োগ ব্যবস্থা ।

চর্মের পরাঙ্গ পুষ্টিয় পীড়া (Parasitic Diseases of the skin):
টিনিয়া টন্সুরান্স (Tinea Tonsurans); টিনিয়া কেরিয়ান (Tinea Carion);
টিনিয়া সার্সিনেটা (Tinea Circinata); টিনিয়া ফেবোসা, (Tinea Favosa);
টিনিয়া বারিকালার (Tinea Versicolor); মাথার উকুন জনিত অস্থখ (Pediculus capitis); চক্ষুর পাতার উকুন (Pediculus Palpebrarum);
শরীরে উকুন (Pediculus Vestimente) । এতত্ত্বি পায়ের আঙ্গুল এবং
উহার কাঁকে কাঁকে উকুন বা কীটের উদ্ভেজনায় দরুণ অস্থখ ইত্যাদিতে
সিপিরা, ক্যাক-কার্ক, সাল্ফ, হিপ-সাল্ফ, সাইলিসি, ব্রাই ব্যবস্থা ।

পাঁচড়া (Scabies, Itch) । হিপ-সাল্ফ, সাল্ফার । এতত্ত্বি মধ্যাহ্ন
এবং রাত্ৰিতে আহারের পর ৩৪ ফোঁটা করিয়া কডলিবার অয়েল (Cod-
liver oil) সেব্য ।

পোকা বা কীটের কামড় বা ছল ফুটান, বিছাটি ইত্যাদি
গায় লাগার দরুণ অস্থখ (Irritation caused by stinging of
insects and plants) । লেডাস্, রাস-টক্স, (এলিগাম্ সিপার (পেঁয়াজ)
স্থানিক প্রয়োগ), ক্যান্ফার, এপিস্, একন্, ল্যাকেস্ । এতত্ত্বি আর্ণিকা
এবং আর্টিকার বাহ প্রয়োগ ব্যবস্থা ।

বিষাক্ত ঘা (Poisoned wounds) । ল্যাকেস্, আন্ ।

বিবিধ প্রকারের অস্থখ

(MISCELLANEOUS DISEASES)

মেরুদণ্ডের কোণ বিশিষ্ট বিকৃতি (Angular Deformity
of the Spine) । ইহা এক অল্প চিকিৎসা সম্বন্ধীয় রোগ বিশেষ । ইহাতে
ক্যাক-কার্ক, ক্যাক-কন্, কন্-অন্, সাইলিসি, হিপ-সাল্ফ, আর্সাফিটিড,

মেজিরিয়াম্ ইত্যাদির আত্যন্তিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে ।
(গণ্ডমালার শীর্ষ দ্রষ্টব্য) ।

মেরুদণ্ড এক পাশে বাঁকিয়া পড়া (Lateral Curvature of the Spine) । ক্যাঙ্ক-ফস্, ক্যাঙ্ক-কার্ক্, ফস্-আস্, সাইলিসি, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্, নাক্স-বম্, আর্গিকা, রাস্-টল্‌। আর্গিকা লিনিমেন্টের বাহ্য প্রয়োগ দ্বারাও উপকার দর্শে ।

কুঁচ্কির সন্ধির গণ্ডমালা জনিত অস্থখ (Morbus Coxae-Scrofulous disease of the Hip joint) । বেণ্, একন্, কলোসিস্, হিপ্-সাল্‌ফ্, আস্, ক্যাঙ্ক-কার্ক্, সাইলিসি, ফস্ ।

গণ্ডবন্ধের পশ্চাৎভাগে কঠিন আব (Ganglion) । বেণ্-ফ্রিক্-আসিড্, ফাইটোলাকা, মেজিরিয়াম্, ।

শরীরে অতিরিক্ত পরিমাণে চর্বিবর সঞ্চয় হেতু অস্থখ (Obesity, Corpulence) । আহারের নিয়ম, অর্থাৎ আলু, মিষ্ট দ্রব্য, ছুধের সম এই কয় প্রকার দ্রব্যাদি না খাওয়া বা অতি, অল্প পরিমাণে খাওয়াই ভাল । রক্তঃরেধ হওয়ার দরুণও অনেক স্ত্রীলোকের শরীরে চর্বি হইতে দেখা যায় । অতএব রক্তঃবোধের অধায়ে যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে, লক্ষণ বিশেষে উহা ব্যবহার্য্য । ধ্বজভঙ্গ হওয়ার দরুণও পুরুষের শরীরে চর্বি হয় । অতএব উক্ত রোগের শীর্ষ দ্রষ্টব্য । শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে । মংস্ত্র যাত্ৰা উপকারী ।

বৃদ্ধ বয়স জনিত অস্থখ বা শরীর ক্ষয় (Old age, and Senile-decay) । ডিজিট্, আস্, ফস্, নাক্স-বম্, পডোফিলাম্, নাইট্রিক্-আস্, ফস্-আস্ ।

মদ্য পান জনিত অস্থখ (Alcoholism) । নাক্স-বামকা, জিকাম্ । (মদ্যোন্মত্ততার শীর্ষ দ্রষ্টব্য) ।

মাথার চুল, দাড়ি, গোঁপ, ভ্রু ইত্যাদি পড়িয়া যাওয়া (Alopecia) । ফ্লুয়োরিক্-আসিড্, ফক্‌ফরিক্-আসিড্, আস্, গ্রাক্ ।

ক্রোধ জনিত রোগ (Effects of Anger) । ক্যানোমিলা, আর্গিকা, ব্রাই, কলোস্, নাক্স-বম্ ।

চক্ষের পাতার আক্ষেপ জনিত অস্থখ (Blepharospasm)।
আগারিকাশ, কোডিয়া, ফাইসটিগ্‌মা, পাল্‌স্‌।

বাগী (Bubo)। নাইটিক্‌-আস্‌, কার্কো-আনিমেস্‌, মার্ক্‌, হিপ্‌-
সাল্‌ক্‌, সাইলিসি। এতদ্বিন্ন উপদংশ বা গরমীর ব্যারামের শীর্ষ
দ্রষ্টব্য।

• অস্থি ক্ষত বা অস্থি পচিয়া যাওয়া (Necrosis, Mortification
or ulceration of the bone)। ফুরোরিক্‌-আস্‌, ফন্‌-আস্‌, আনাফিটিজ্‌,
অরান্‌, ফফরাস্‌, সাইলিসি।

খিল ধরা (Cramps)। একন্‌, কুপ্রাম্‌, প্রাধাম্‌। এতদ্বিন্ন আক্ষে-
পের (Convulsions) শীর্ষ দ্রষ্টব্য।

দুর্বলতা (Debility)। ফফরিক্‌-আস্‌, আনাকার্ড্‌, কার্কো-বেজ্‌,
চায়না, কিউরেস্‌জার, হেলোনিয়াস্‌, বিরেট্‌-আল্‌ব্‌।

প্রলাপ (Delirium)। বেল্‌, হায়োস্‌। এতদ্বিন্ন মস্তিষ্কের অস্থ-
খের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

গিলিতে অশক্তি (Dysphagia)। কিউরেস্‌জার, ক্যালী-বাই।
• এতদ্বিন্ন গলার মধ্যে বেদনাদির অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রেম উন্মত্ততা (Erotomania, Love-madness)। পিক্রিক্‌-
আস্‌, এটিয়োলা, হায়োস্‌, ওরিগেনাম্‌, ফফরাস্‌, প্রাটিনা, ট্রায়ন্‌,
ট্যারেণ্টুলা।

চক্ষুর পেশীর অস্থখ। সিমিসিফ্‌, আগারিকাশ্‌, আর্ভেন্ট্‌-নাই-
টিক্‌, কষ্ট্‌, কোনারাম্‌, ইউফ্রেস্‌, জেলস্‌, লিলিয়াম্‌-টাইগ্রি, ফাইসটিগ্‌মা,
রাস্‌-টক্‌, সেনিগা।

উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার (Flatulence)। কার্কোলিক্‌-
আসিড্‌, কার্কো-বেজ্‌, লাইকোপডিয়াম্‌, নাক্স্‌-মক্‌, নাক্স্‌-বম্‌। এতদ্বিন্ন
অজীর্ণ রোগের শীর্ষ দ্রষ্টব্য।

• দমকা উত্তাপোত্ত্ব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল লাল-
বর্ণ হওয়া (Flushings)। আমিল্‌-নাইট্রেট্‌, বাবোরাণ্ডি, লাকেস্‌,
সাক্সেনেরিয়া, সাল্‌ক্‌।

ভয় খাওয়ার দরুণ অস্থখ (Effects of fright)। ইগ্‌নেস্, ককিরা, ওপিয়াম্ ।

রক্তোৎকাশি (Hæmoptysis)। আকালিকা-ইপিকা, একন্, ফেরাস্-মাসেট্, ইপিকাক্, লেডাম্, মিলিকোলিয়াম্ । এতদ্বির বন্ধাকাশের শীর্ষ দ্রষ্টব্য ।

রক্তস্রাব (Hæmorrhage)। একন্, আর্গিকা, হাইমেনেসিস্, ইপিকাক্, মিলিকোলিয়াম্, সাজুনেরিয়া ।

যকৃতে বেদনা (Hepatalgia)। আনন্-বিউন্ । এতদ্বির যকৃতেজ অস্থখের অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

হিক্কা (Hiccough)। সাল্‌ফ্-আস্, ক্যাম্প্, দিক্‌টা, মফ্, মাজ্-মফ্, বিরেট্-আব্, বেল্, হায়োস্, কার্বো-বেজ্, টাকিস্, ফফরাস্, ইগ্-নেস্, সাল্‌ফ্, একন্, আস্, ব্রাই, নাজ্-বম্, ল্যাকেস্, জিকাম্, কুগ্রাম্ ।

দ্রব্যাদি অর্ধেক দেখায় (Hæmiopœa)। অরাম্, লিথিয়াম্ ।

পারার অপব্যবহার জনিত অস্থখ (Hydrangyrosis)। অরাম্, হিপ্-সাল্‌ফ্, নাইট্রিক্-আস্, মেরিরিয়াম্ ।

অণ্ডকোষাধারের শোথ বা হাইড্রোসিল্ (Hydrocele)। গ্রীক্, আয়োড্, পাল্‌স্, রডোড্, এপিস্ ।

বক্ষশোথ (Hydrothorax)। এপিস্, আস্, রাস্টেজ্, ব্রাস্ বস্ত্রের রোগ দ্রষ্টব্য ।

সামান্য শূলবেদনা বা ইলিয়াস্ (Ileus)। বেল্, নাজ্-বম্, স্রাবাম্ ।

ধ্বজভঙ্গ (Impotence)। কস্-আস্, আগ্‌নাস্, পেলিনিয়াক্, এস্, নাজ্-বম্ ।

বহুব্যাপক সর্দি (Influenza)। আস্, ব্রোমিন্, ইউগেট্-পাক্, ক্যালী-বাই, রাস্টেজ্, আরালিয়া, ক্যাম্ফার, নাজ্-বম্, কস্, ব্রাই ।

স্তনের নিম্নদেশে বেদনা (Infra-Mammary pain)। মিরিসিক্, পাল্‌স্, রানান্ কুলান্ ।

অল্লেখ্যত (Ulceration of the Intestines)। মাক্-কর, ক্যালী-বাই । (অন্ত্র প্রদাহ এবং আশাশয়ের শীর্ষ দ্রষ্টব্য)।

সন্ধির অস্থি (Affections of the Joints)। সিরীস, গেডাম্, বার্কেক, পাল্‌স, সাবাইনা, সাইলিসি। এতদ্বির সন্ধিবাতির অধার দ্রষ্টব্য।

চক্ষুর জলাধারের প্রদাহ (Inflammation of the Lachrymal Sacs)। হিম্‌সাল্‌ক্, সাইলিসি, সাল্‌ক্, মার্‌ক্, এপিদ্‌।

* কণ্ঠমালীর তরুণ প্রদাহ (Acute Laryngitis)। ক্যালী-বাই, লাক্সেনেরিয়া, স্পঞ্জিয়া, আরালিয়া। (বাস বন্ধের অস্থির অধার দ্রষ্টব্য)।

কণ্ঠমালীর পুরাতন প্রদাহ (Chronic Laryngitis)। আর্জেন্ট-নাইট্রিক্, ক্যালী-বাই, ম্যাগনেসিয়াম্, সেগনিরিয়াম্, আরালিয়া। (বাসবন্ধের অস্থির অধার দ্রষ্টব্য)।

সীসা জনিত শূল বেদনা (Lead Colic)। আলুমেন, ওপিয়াম্। (শূল বেদনা বা অস্ত্রাক্ষেপের অধার দ্রষ্টব্য)।

লোকো মোটোর আটাক্সি (Locomotor Ataxy)। আর্জেন্ট-নাইট্রিক্, বেল্‌। (পক্ষ্মাতের অধার দ্রষ্টব্য)।

কোমরে বাতের বেদনা (Lumbago)। একন্, গিলিসিক্, আন্টি-টার্ট্, ব্রাই, ক্যালী-বাই, রাইটল্‌ক্, সাল্‌ক্। (বাত রোগের অধার দ্রষ্টব্য)।

কৃক্ষুসের শোথ (Edema of the Lungs)। আন্টি-টার্ট্, কক্ষুস।

কৃক্ষুস পচিয়া যাওয়া (Gangrene of Lungs)। ক্যান্‌।

অধিকপালিয়া মাথা ব্যাণা (Migraine, Hemicrania)। কার্বোলিক্-অ্যাস্, ব্রাই, ক্যাক্‌কার্ক্, ক্যাক্‌আসেট্, ককিয়া, সাইক্লে-মেন, আইরিস্, লাক্সেনেরিয়া, সিপিয়া, টোনাম্, থেরিডিয়ান্, বার্ক্যাকাম্, লিক্‌সাল্‌ক্। (এতদ্বির শিরঃ পীড়ার (Headache) অধার দ্রষ্টব্য)।

অস্থির কোমলতা (Mollities Ossium, Softening of the bones)। কক্ষুস।

শরীরের স্থানে স্থানে আবেল তায় ধমনির ক্ষীতি সহ চর্শ্ম রোগ (Molluscum)। সাল্‌ফার।

পেশীতে বেদনা (Myalgia)। সিমিসিক্, আর্গিকা। (পেশী-
বাতের অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

চক্ষুর তারার অস্বাভাবিক বিস্তৃতি (Mydriasis)। বেলা-
ডোনা।

মস্তিষ্ক এবং কসেরুক মর্জ্জা প্রদাহ (Myelitis)। অক্-
জালিক্-আস্, আস্, রাবাম্। (স্নায়বিক মণ্ডলীর অস্থ্য দ্রষ্টব্য)।

বোবায় ধরা (Night-mare)। ক্যালী-ব্রোম্।

শরীরের স্থানে স্থানে অস্থিতে আবেল ন্যায় ক্ষীতি
(Nodes)। অরাম্, মেজিরিয়াম্, টিলিজিয়া।

আহার বহা গলনালীর আক্ষেপ (Esophagismus)। নেজা।

অপটিক্ স্নায়ুর প্রদাহ (Optic neuritis)। পিক্রিক্-আস্, বেলে।

অণ্ডকোষ প্রদাহ (Orchitis, -Inflammation of the testes)।
জ্যামোমিল, হামামেলিস্, পাল্, রডোড্, স্পঞ্জিয়া। এতত্তির অণ্ডকোষের
শোধের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হৃৎস্পন্দন (Palpitation, of the Heart)। হাইড্রোসারেনিক্-
আস্, একন্ ককিয়া, আরোড্, মকাল্। এতত্তির হৃৎপিণ্ডের অস্থ্য এবং
অজীর্ণের শীর্ষ দ্রষ্টব্য।

প্যানক্রিয়াসের অস্থ্য (Diseases of the Pancreas)। আরোড্,
আইরিস্।

অস্থির আবরক কঠিন পর্দার প্রদাহ (Periostitis, -Inflammation
of the periosteum)। আসাকিটিভা, অরাম্, ক্যালী-বাই, ম্যাকেনাম্, মার্ক্,
মল্, মার্ক্-বিনায়োড্, মেজিরিয়াম্, ফফরাম্, কাইটোল্, সাইলিসি।

অস্বাভাবিক ঘর্ম (Morbid perspiration)। ফ্লোরিক্-আস্,
কস্-আস্, কার্কো-আনিমেল্, জ্যাবোরাকি, মার্ক্, ওপিয়াম্, পিটোল্,
ড্রাক্সাস্, সাইলিসি।

চক্ষে আলোক অসহ্য হওয়া (Photophobia)। সিমিসিক্,
আক্টি-টাইট, কোনায়াম্, নাক্স-বম্। এতত্তির চক্ষুর প্রদাহ ইত্যাদির
অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চুলে জটাৰ্বাধা (Plica-Polonica) । লাইকোপডিয়াস্, বিন্কা-মাইনার ।

গুহোর শ্লেষ্মিক বিল্লীর প্রদাহ (Proctitis,-Inflammation of the mucous membrane of the Rectum) । কল্‌চ্, কলিন্‌সনিয়া । (অর্শ রোগ এবং ভগন্যয়ের দীর্ঘ দ্রষ্টব্য) ।

চক্ষুর টেরিজিয়াস্ নামক অস্থখ (Pterygium) । রাটেন্‌হিয়া, সাল্‌ফ্, জিক্ ।

মুখে লাল উঠা (Ptyalism) । আয়োড্, আইরিস্, যাবোরাডি, মার্ক্ ।

পৃথ দ্বারা রক্ত বিসাক্ত হওয়ার দরুণ রোগ বা পাইমিয়া (Pyæmia) । আর্গিকা, আর্স্, চিমিনাম্-সাল্‌ফ্, চিনিলাম্-আর্স্, চায়না, আর্স্, হিপ্-সাল্‌ফ্, সাইলিনিস্ ।

মূত্রকোষের পেল্‌বিস্ (Pelvis) নামক অংশের প্রদাহ (Pyelitis, Inflammation of the pelvis of the kidneys) । ইউবা-আর্স্‌ই, ফক্‌রিক্-আর্স্, আর্স্ ।

সায়েটিক্ স্নায়ু-শূল (Sciatica) । একন্, আমন্-মিউর্, আর্স্, কলোস্, নেট্রাম্-সাল্‌ফ্, রানান্‌কুলাস্, রাস্-টল্, টিরিবিছ্ ।

আগুনে পুড়িয়া বা বন্‌সিয়া যাওয়া (Scalds) । ক্যাছারিসের স্থানিক প্রয়োগ ।

• যুমের ঘোরে চলিয়া বেড়ান বা নিয়মিত কাজ কর্ষ করা (Somnambulism) । ক্যাণী-ব্রোমাইড্ ।

কসের্কক মৰ্জ্জার অস্থখ (Affections of the Spinal-cord) । পিক্‌রিক্-আর্স্, আগারিকাক্শ্, বেল্, জেল্‌স্, নেজা, সিকেল্, টেলুরিয়াম্, বিরেট্-ব্রাইড্ ।

মস্তিষ্কের প্রদাহ (Phrenitis) । বেল্, বিরেট্-ব্রাইড্, হায়োস্, ষ্ট্রামিন্ ।

প্লাহার অস্থখ (Affections of the Spleen) । আগারিকাক্শ্, সিয়েনোথাস্, আর্সিনিক্, নাক্স-বন্ ।

তোতলামি (Stammering)। হায়োস, ট্রামন্।

শক্ত গ্রীবা (Stiff neck)। একন্, সিমিসিফ, ব্রাই, কল্‌জ্, ডাক্, রাস্টল্।

গুহের সঙ্কোচন বা অপ্রশস্ততা (Stricture of the Rectum)। কফিয়া, ফস্, পডোফ্, কলিমোনিয়া।

সাইনোবিয়াল্ ঝিল্লী প্রদাহ (Synovitis, Inflammation of the Synovial membrane)। এপিস্, ব্রাই, পাল্‌স্, রাস্টল্।

আব (Tumours)। ক্যাক্-কার্ক্, ইউকেলিপ্টাস্, হাইড্রাট্, ক্যালী-ব্রোমাইড্, সাইলিসি, ব্যারাইটা-কার্ক্।

পেটফাঁপা (Tympanitis)। আসাফিটিডা, কল্‌জ্, টায়ের্সেকাম্, কার্কো-বেজ্, লাটেকোপ্, আস্, নায়-বম্।

ইউরিয়া দ্বারা রক্ত বিযাক্ত হওয়ার দরুণ অস্থ বা ইউরিমিয়া (Uroemia)। কার্কোলিক্-আস্, ওপিয়াম্, ক্যাছ্, টিরিবিছ্, ক্যালী বাই।

নানাকারেণে শ্বাসরোধ বা ফাঁপড় হওয়া (Asphyxia, -Apnoea, Suffocation from different Causes)। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস উৎপাদনের উপায় অবলম্বনীয়।

ঠাণ্ডা লাগিয়া অবসন্নতা (Depression from Cold)। শ্বাস রোধ হওয়ার দরুণ অবসন্নতাকে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস উৎপাদন করার পর কার্কো-বেজ্, সিকেল্, ব্যবহার্য।

আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের কার্ষাবরোধ (Concussion of the brain)। আর্গিকা, বেল্, সিকুটা, ডিজিট্, জেল্‌স্, হায়োস্, ওপিডাম্, একন্।

আগুণে পোড়া এবং তদরুণ ক্ষত (Burns and Scalds)। ক্যাছ্, রাস্টল্, আটিকা, একন্, আস্, ক্যামোমিলা, চায়না, সাল্‌ফ্।

গায় কাঁচ ভাঙ্গা, কাঁটা, চোঁচ, ভাঙ্গা সূচী ইত্যাদি বিধিয়া থাকা (Foreignbodies)। কাঁচ ইত্যাদি বাহির করিয়া ফেলিয়া আর্গিকায় লেশন ক্ষতের স্থানে লাগাইবে। এছত্তির আর্গিকার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যবস্থা।

আঘাত লাগিয়া চামড়া ছিঁড়িয়া যা বা ক্ষত হওয়া (Wounds) ।
আর্পিকা, একন্, চারনা, (ক্যালেলুলার বাছ প্রয়োগ), হাইপারিকাম্,
ল্যাকেন্, লেডাম্ ।

হাড়ভাঙ্গা (Fracture, -Broken bone) । অঙ্গ চিকিৎসার সাহায্য
আবশ্যক । এতদ্ভিন্ন একন্, আর্পিকা, বেল্, ক্যাক্-কন্, কুটা, সিঙ্কাইটাম্,
ক্যাক্-কার্ক্, সাইলিস্, ইয়েস্ ইত্যাদির আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যবস্থা ।
আর্পিকার বাছ প্রয়োগ । কুপ্রাম্, হায়োস্, মেজিরিয়াম্, ফস্, আন্-
অয়োডাইড্ ও প্রয়োজন হইতে পারে ।

অস্থির সন্ধি স্থান ভ্রষ্ট হওয়া (Dislocation) । অঙ্গচিকিৎসার
সাহায্য আবশ্যক । হাড় ভাঙ্গার শীর্ষ দ্রষ্টব্য ।

অতিরিক্ত পরিশ্রম দ্বারা পেশীর দুর্বলতা বা অবসন্নতা
(Exhaustion of the muscles, -Fatigue) । আর্পিকা । এতদ্ভিন্ন আর্পিকা
ইত্যাদির বাছ প্রয়োগ ।

বিষাক্ত দ্রব্যাদি উদরস্থ হইয়া, বিষাক্ত হওয়া । বমন উৎপাদক
ঔষধ ব্যবহার্য । এতদ্ভিন্ন “নরল-চিকিৎসা” বা “চিকিৎসা সোপান” দ্রষ্টব্য ।

স্ত্রী-রোগ সমূহ

(DISEASES OF WOMEN)

গোঁথে প্রথম রজঃস্রাব (Retension of the Menses, -Amenor-
rhœa) । একন্, আর্স্, বেল্, ব্রাই, ককিউল্, পাল্, সিপিয়া, গ্রাক্, হেলি-
বোরাস্, ক্যালী-কার্ক্, ম্যাগ্নেনস্-কার্ক্, নেট্রাম্-মিউর্, সেনিসিয়ো,
সাল্ফ্, ফক্ষরাস্, বোরাক্ ।

হৃৎকিপাণ্ডু রোগ (Chlorosis, -Green-Sickness) । (১০৩৩
পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য) ।

রজঃরোধ (Amenorrhœa, Suppression of the Menses) ।
একন্, এপিস্, আর্স্, বেল্, ব্রাই ক্যাক্-কার্ক্, কষ্ট্, ক্যাথোমিলা, চারনা,

ককিউল্, কলোসিঙ্ক্, কোনাগাম্, ক্রোকাস্, ডাল্ফ্, জেল্‌স্, গ্রাফ্, ক্যালী-কার্ক্, লিলিয়াম্-টাইগ্রিনাম্, লাইকোপডিয়াম্, নাক্স-মফ্, ফক্ষরাস্, সিপিগা, সাল্‌ফ্, বিরেট্-আব্, পাল্‌স্, সেনিসিয়ো।

কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাধকের বেদনা (Dysmenorrhœa,-Painful Menstruation)। আমন্-আসেট্, আমন্-কার্ক্, এপিস্, বেল্, ক্যাক্টাস্, ক্যাক্-কার্ক্, কলোফিলাম্, ক্যামোমিলা, সিমিসিফ্, ককিউল্, কোনাগাম্, জেল্‌স্, হামামেলিস্, লিলিয়াম্, নাইটিক্-আস্, নাক্স-বম্, ফক্ষরাস্, ফাইটোল্, প্লাটিনা, পাল্‌স্, সিপিগা, সাল্‌ফ্, বাইবার্ণাম্, জাহ্‌ক্‌জিলাম্, সেনিসিয়ো।

প্রচুর বা অতিরিক্ত রজঃস্রাব (Menorrhagia,-Profuse Menstruation)। একন্, আপোসিনাম্, আমন্-কার্ক্, আস্, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, ক্যামোমিলা, চায়না, সিমিসিফ্, কোকাস্, ক্রোকাস্, ফেরাম্, ইগ্‌নেস্, আয়োড্, ক্যালী-কার্ক্, ক্রিয়াজু, ম্যাগ্‌নেস্-কার্ক্, নাক্স-মফ্, নাক্স-বম্, ফক্ষরাস্, প্লাটিনা, ক্রটা, সাবাইনা, সিকেল্, সিপিগা, সাল্‌ফ্, ট্রিলিয়াম্, আষ্টিলেগো, ক্যাক্-ফস্, সেনিসিয়ো।

শেষরজঃরোধ (Cessation, of the Menses,-Change of life,-Critical period)। ব্রাই, ককিউল্, ইগ্‌নেস্, পাল্‌স্, সিপিগা, সাল্‌ফ্, সিমিসিফ্, আমিল্-নাইটেট্, গ্লোনডেরন্, সাস্কুনেরিয়া, বেলিরিয়ান্।

জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia,-Uterine Hæmorrhage)। একন্, বেল্, বোবিষ্টা, ব্রাই, ক্যামোমিলা, চায়না, ক্রোকাস্, ফেরাম্, হামামেলিস্, হায়োস্, ইপিকাক্, বিন্কা-মাইনার, পাল্‌স্, সাবাইনা, সিকেল্, সিপিগা, সাল্‌ফ্। এতদ্বিন্ন প্রচুর বা অতিরিক্ত রজঃস্রাবের শীর্ষ দ্রষ্টব্য।

জরায়ু প্রদাহ (Metritis,-Inflammation of the Uterus)। একন্, এপিস্, আস্, বেল্, ব্রাই, ক্যাহ্, কলোস্, ক্যাক্-কার্ক্, ক্যামোমিলা, হায়োস্, ল্যাকেস্, মার্ক্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, রাস্‌টক্স্, সাবাইনা, সিকেল্।

ভিম্বকোষ প্রদাহ (Ovaritis,-Inflammation of the Ovaries)।

একন্, অস্, এপিস্, বেল্, ব্রাই, ক্যাষ্ট্, ক্যাঙ্ক্, কোনায়াস্, হামামেলিস্, হিপ্, সাল্, প্লাটিনা, পাল্, আরোড্, লিলিয়াম্ ।

ডিম্বকোষের কঠিনতা (Induration of the Ovaries) । অরাস্, গ্রাফ্ । এতদ্ভিন্ন ডিম্বকোষ প্রদাহের শীর্ষ দ্রষ্টব্য ।

ডিম্বকোষের শোথ (Ovarian Dropsy) । এপিস্, আরোড্, ল্যাক্কস্, লিলিয়াম্-টাইগ্রি, নেত্রা, প্যালেডিয়াম্, প্লাটিনা, পাল্, আষ্টি-লেগো, ক্যালী-ব্রোসাইড্ ।

ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল (Neuralgia of the Ovaries) । কলো-সিস্, সেনিসিয়ো । এতদ্ভিন্ন ডিম্বকোষ প্রদাহের শীর্ষ দ্রষ্টব্য ।

শ্বেত প্রদর (Leucorrhoea) । ইক্সুলাস্, আলুমিনা, আস্থা, আমন্-কার্ক্, আমন্-মিউর, অস্, বোবিষ্টা, ক্যাঙ্ক-কার্ক্, চায়না, ককিউল্, কোনায়াস্, কোপেইবা, কিউবেবা, গ্রাফ্, ইগ্, নেস্, ক্যালী-বাই, ফ্রিয়াজ্, ল্যাক্কস্, লাইকোপডিয়াম্, নাইট্রিক্ অস্, নাক্স-মক্, নাক্স-বম্, ম্যাগ্নেস্-মিউর, পডোফিলাম্, স্ট্রাইনা, সিপিরা, সাল্, জিকাম্, সিরেনোথাস্ ।

বন্ধাত্ব (Sterility) । বোরাক্স্, কোনায়াস্, আরোড্ ।

যোনিদ্বারের আক্কেপ (Vaginismus) । হামামেলিস্, প্লাশাম্, সাইলিসিয়া ।

যোনির প্রদাহ (Vulvitis) । সিপিরা, বেল্ ।

জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়া (Prolapsus Uteri, -Falling of the Uterus) । একন্, বেল্, আমন্-মিউর, অরাস্-মেট্, ক্যাঙ্ক-কার্ক্, কোনা-য়াস্, গ্রাফ্, ফেরাম্, অর্পিকা, হেলিবোয়াস্, হাইড্রাষ্ট্, লিলিয়াম্-টাইগ্রি, মার্ক্, নাইট্রিক্ অস্, ল্যাক্কস্, নাক্স-মক্, নাক্স-বম্, পডোফ্, পাল্, রাস্টক্স, সিপিরা, সাল্, সিকেল্, ষ্টানাম্ ।

জরায়ুর নানাপ্রকারের অস্থখ (Affections of the Uterus) । সিমিসিক্, আর্জেন্ট্-মেট্, অরাম্, বেল্, ফেরাম্, হেলোনিয়াস্, হাইড্রো-কোটাইল্, আরোড্, লিলিয়াম্, ম্যাগ্নেস্-মিউর, নেট্রাম্-ক্রেট্টে, সিকেল্, সিপিরা । এতদ্ভিন্ন পূর্বোন্নিখিত বহুস্ত্রাব সম্বন্ধীয় অস্থখের শীর্ষ দ্রষ্টব্য ।

গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদ্বেষ (Morning Sickness) ।

আলিট্রিস্, আণ্টি-ক্লড্, অস্, অসিনাইট্ অব্, কপার, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, ককিউল্, কলচ্, সাইক্রেয়েন্, ইপিকাক্, গোরিলিয়া, নাইট্রিক্-অস্, নাক্স-বম্, পিটোল্, পাল্‌স্, সিপিয়া, আণ্টি-টাইট্, বিব্রেট্-আব্, জিকাম্, ফফরাস্, নেটাম্-মিউর, ক্রিয়াক্সোট্, কার্বোনিক্-অস্।

গর্ভাবস্থায় শিরঃপীড়া এবং মাথাঘোরা (Head-ache and Vertigo during Pregnancy)। একন্, বেল্, নাক্স-বম্, সিপিয়া, পাল্‌স্, সিপিয়া। এতদ্ভিন্ন পূর্বোন্নিখিত মাথা ঘোরা এবং শিরঃপীড়ার দীর্ঘ দ্রষ্টব্য।

গর্ভাবস্থায় দন্তশূল (Tooth-ache during Pregnancy)। একন্, বেল্, ক্যাক্-কার্ক্, ক্যামোমিলা, মার্ক্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, সিপিয়া টাকিসেগ্রিয়া।

গর্ভাবস্থায় মুখে জল উঠা ও বুক জ্বালা * (Water-brash and heart-burn during Pregnancy)। নাক্স-বম্, ফফরাস্, পাল্‌স্, সিপিয়া, সালফ্, ক্যাপ্‌স্, মার্ক্, কার্বো-বেজ্, দ্বিজিবার।

গর্ভাবস্থায় বুকের পার্শ্বে বেদনা (Pain in the side during Pregnancy)। আণিকা, বেল্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, সিপিয়া।

গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ (Constipation during Pregnancy)। আণ্টি-ক্লড্, অস্, ব্রাই, ক্যামোমিলা, চায়না, ডাক্, লাইকোপ্, মার্ক্, পডোফ্।

গর্ভাবস্থায় যোনি দ্বারাদির চুলকানি (Pruritis-Itching of the privates during Pregnancy)। কার্বো-বেজ্, লাইকোপ্, মার্ক্, পাল্‌স্, সিপিয়া, সালফ্।

শিরার স্ফীতি ও বিস্তৃতি (Varicose veins during Pregnancy)। আণিকা, বেল্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, ক্যামোমিলা।

গর্ভাবস্থায় শরীরের স্থানে স্থানে খিলধরা (Cramps during Pregnancy)। বেল্, ক্যামোমিলা, হায়োস্, নাক্স-বম্, বিব্রেট্-আব্।

গর্ভাবস্থায় মূত্র ধারণে অশক্তি (Incontinence of urine during Pregnancy)। একন্, বেল্, কষ্ট্, পাল্‌স্, সালফ্।

গর্ভাশ্রাব (Abortion, -Miscariage) । একন্, আর্গিকা, বেল্, ক্যাল্ক-কার্ক, ক্যাহ্, কলোফিলাম্, ক্যামোমিলা, চায়না, ক্রোকাশ্, ফেরাম্, হ্যাঘোস্, ইগ্নেন্, ইপিকাক্, নাক্স-মক্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, রাস-টক্স্, সাবাইনা, সিকেল্, ক্যাহ্, সিপিয়া ।

গর্ভাশ্রায় স্তনের অসুখ (Affections of the Breasts during Pregnancy) । ক্যামোমিলা, গ্রাইটস্, ফাইটোল্, হাইড্রাট্, পাল্‌স্, সাল্‌ক্ ।

কৃত্রিম প্রসব বেদনা (False labor-pains) । একন্, বেল্, কফিয়া, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, কলোফিলাম্, ক্যামোমিলা ।

সন্তান প্রসব (Labor, -Child-birth) । একন্, বেল্, ক্যামোমিলা, সিমিসিক্, কফিয়া, জেল্‌স্, ইথেন্, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, পাল্‌স্, সিকেল্ ।

সন্তান প্রসব-উপলক্ষে আক্কেপ (Puerperal Convulsions) । একন্, আর্জেন্ট-নাইট্রিক্, বেল্, সিকুটা, কুপ্রাম্-মেট্, গ্লোনয়েন্, ইনাথ্, বেল্, ক্যামোমিলা, চায়না, ইপিকাক্, পাল্‌স্, সিকেল্ ।

প্রসবের পুর পেটে বেদনা (After-pains) । আর্গিকা, বেল্, জেল্‌স্, কলোফিলাম্, ক্যামোমিলা, সিমিসিক্, কফিয়া, কুপ্রাম্-আসেট্, ইথেন্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, সিকেল্, সিমিসিক্, জ্যাহ্‌ক্‌জিলাম্ ।

প্রসবের পর মূত্রাবরোধ (Retention of Urine after Delivery) । আর্গিকা, বেল্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্ । এতদ্ভিন্ন মূত্রাবরোধের নীর্থ লক্ষ্য ।

স্তনে দুগ্ধের সঞ্চারের দরুণ জ্বরাদি অসুখ (Milk-Fever &c) । একন্, বেল্, ক্যাল্ক-কার্ক, পাল্‌স্ ।

স্তনের প্রদাহ (Masitis. -Inflammation of the Mamme or breasts of Women) । একন্, আর্গিকা, বেল্, ব্রাই, হিপ্‌সাল্‌ক্, ফাইটোল্, সাইলিনি, গ্রাক্‌মার্ক্, ফফরাস্, হাইড্রাট্ ।

• স্তনে বেদনা (Mastodynia. -Pain in the Mamme or female breasts) । সিমিসিক্, কোনারাম্, ক্রোটন্, কেলোডিরাম্, ফাইটোল্ ।

প্রসবের পর পায়ের শিরাদির খেত ক্ষীতি (Milk-Jag. -

Phlegmasia Alba-Dolens)। একন্, আর্গিকা, বেল্, ব্রাই, রাস্টল্, আস্, ক্যাক্-কার্ক্, হামামেলিস্, পাল্‌স্, বিশ্বাথ্ ।

সূতিকা জ্বর (Child-bed Fever,-Puerperal Peritonitis)
(১০২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ।

প্রসবের পর কোষ্ঠবন্ধ (Constipation after Delivery)
ব্রাই, নাক্স-বম্, সাল্‌ফ্ ।

প্রসবের পর রক্ত বা লোকিয়া নিঃসরণ (Lochial Discharge)। একন্, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, পাল্‌স্, রাস্টল্, সিকেল্ ।

স্তনের বোঁটায় টাটানী বা ক্ষত (Sore-nipples)। ক্যাক্-কার্ক্, গ্রাফ্, হিপ্-সাল্‌ফ্, সাক্ ।

স্তনে ফোঁড়া (Mammary Abscess,-Gathered-Breast)। আর্গিকা, বেল্, ব্রাই, হিপ্-সাল্‌ফ্, ফফুরাস্, সাইলিসি, গ্রাফ্, মার্ক্ । এতদ্বিন্ন স্তনের প্রদাহের শীর্ষ দ্রষ্টব্য ।

সস্তান প্রসবের পর স্তনে দুগ্ধের অভাব বা অল্পতা (Agalactia)। একন্, আগ্নাস্, আসাকিটিডা, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, কার্কো-আনিমেল্, কষ্টিকাম্, ক্যামোমিলা, চায়না, ডাল্‌ফ্, ল্যাকেসিস্, মার্ক্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, রুম্, রাস্টল্, সিকেল্, সাল্‌ফ্, আটিকা ।

শিশুগণের পীড়া

(DISEASES OF CHILDREN.)

শিশুর চক্ষু প্রদাহ (Ophthalmia)। একন্, বেল্, ক্যাক্-কার্ক্, ক্যামোমিলা, মার্ক্-সল্, সাল্‌ফ্ ।

নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হওয়া (Obstruction of the nose,-Snuffles)। ক্যামোমিলা, ডাক্, নাক্স-বম্, আন্টি-টাইট্ ।

শিশুর কামল রোগ বা নেবা (Jaundice of Infants) । একন্, ক্যামোমিলা, চায়না, মার্ক্-সল্, নাজ্-বম্, ব্রাই, ডিজিট্, ক্রোটে-লান্, কফরাস্, মিরিকা-সেরিক্ ।

মুখে ঘা বা ক্ষত (Sore-mouth,-Aphthæ) । একন্, আস্ ক্যাক্-কার্ক্, ক্যামোমিলা, মার্ক্-সল্, নাইটিক্-আস্, সালফ্ ।

শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত হইয়া ফাটিয়া যাওয়া (Excoriations,-Chafing) । ক্যাক্-কার্ক্, কার্ক্-বেজ্, ক্যামোমিলা, গ্রাক্, লাইকোপডিয়াম্, সালফ্ ।

মূত্রাবরোধ (Retention of Urine) । একন্, নাজ্-বম্, পাল্‌স্, ক্যাহ্, টিরিবিহ্ ।

শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ (Costipation of Children) । ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, লাইকোপডিয়াম্, নাজ্-বম্, ওপিয়াম্, পডোফিলাম্ ।

শিশুর উদরাময় (Diarrhœa of Children) । একন্, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, ক্যামোমিলা, ডালুক্, ইপিকাক্, ম্যাগনেস্-কার্ক্, মার্ক্-সল্, পডোফিলাম্, সালফ্, রুম্, চায়না ।

শিশুর পেটকামড়াণী বা শূলবেদনা (Colic of Infants) । একন্, এলিয়াম্, বেল্, ক্যাক্-কার্ক্, ক্যামোমিলা, চায়না, সিনা, কলো-সিহ্, ইগ্নেস্, ইপিকাক্, লাইকোপডিয়াম্, নাজ্-বম্, পাল্‌স্, সেনা, বিরেট্-আহ্ ।

শিশুর স্তনের স্ফীতি (Swelling of the Breasts) । বেল্, হিগ্-সালফ্, সাইলিসি ।

শিশুর নিদ্রাশূন্যতা বা অস্থিরতা (Sleeplessness,-Restlessness of Infants) । ক্যামোমিলা, কফিয়া, ওপিয়াম্, একন্ ।

শিশুর ক্রন্দন (Crying of infants) । একন্, বেল্, ক্যামোমিলা, কফিয়া, নাজ্-বম্ । (শিশুর পেট কামড়াণী বা শূল বেদনার শীর্ষ দৃষ্টব্য ।

হিক্ (Hiccough,-Singultus) । বেল্, হায়োস্, ইগ্নেস্, সাইলিসি ।

মাথায় খুস্কী (Scurf of the Head) । সাল্‌ফ্‌ ।

আক্কেপ,-থেন্টনি (Convulsions, Spasms) । একন্, বেগ্, ক্যামোমিলা, সিনা, হায়োস্, ইগ্‌নেস্, ওপিয়াম্, ষ্ট্রামন্, সিকুটা, কুগ্রাম্-মেট্, জেলস্, ইপিকাক্, জিঙ্কাম্ ।

শিশুর দাঁত উঠার দরুন অসুখ (Troubles during Dentition, Teething) । একন্, এপিস্, বেগ্, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, ক্যামোমিলা, কফিয়া, গ্রাফ্, হায়োস্, ইগ্‌নেস্, ইপিকাক্, ম্যাগ্‌নেস্-কার্ক্, মার্ক্-সল্, নাক্স-বম্, পডোফিলাম্, সাইলিসি, সাল্‌ফ্‌ ।

শিশুর ওলাউঠা (Cholera Infantum, Summer Complaint) । একন্, এপিস্, আস্, বেগ্, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, কার্কো-বেজ্, ক্যামোমিলা, ইপিকাক্, ম্যাগ্‌নেস্-কার্ক্, মার্ক্-সল্, ফফুরিক্-আস্, পডোফিলাম্, পাল্‌স্, সিকেল্, সাল্‌ফ্‌, বিরেট্-অর্বি, এথুজ্, আন্টি-ফুড্‌ চায়না, সিনা, ক্রোটন, লরোসিরেসাস্, ফফুরাস্, নাক্স-মক্, নাক্স-বম্ ।

পেশীক্ষয় বা জীর্ণ শীর্ণ হওয়া (Marasmus, Atrophy) । আস্, বেগ্, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, চায়না, মার্ক্-সল্, নাক্স-বম্, ফফুরাস্, পাল্‌স্, ষ্ট্রাকিস্, সাল্‌ফ্‌ ।

কর্ণের পশ্চাৎভাগে ক্ষত (Soreness behind the Ears) । ক্যাক্-কার্ক্, গ্রাফ্, সাল্‌ফ্‌ । এভড্রিম্ শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত হইয়া ফাটিয়া যাওয়ার শীর্ষ দ্রষ্টব্য ।

শিশুর অস্ত্রবৃদ্ধি (Hernia of Infants) । অস্ত্র বৃদ্ধির শীর্ষ দ্রষ্টব্য ।

ঘামাচি (Heat-spots, Prickly-heat) । ক্যাক্-কার্ক্, গ্রাফ্, নাক্স-বম্, সাল্‌ফ্‌ ।

শিশুবালিকাগণের খেত প্রদর (Leucorrhœa of Children) । ক্যাক্-কার্ক্, গ্রাফ্, নাক্স-বম্, সাল্‌ফ্‌, সিনা ।

আক্রান্ত অঙ্গে স্পর্শজ্ঞান রহিততা বিশিষ্ট পক্ষাদাত (Anæsthesia) । একন্, ক্যানাবিস্-ইতিকা ।

ধমনির মধ্যাবরক পদার্থের মেদোপকৃষ্টতা (Atheroma) । ফফুরাস্ ।

হাত পায়ের আঙ্গুল একভাবে রাখিতে অশক্তি (Athe-
osis)। ট্রিকুরিয়া।

মূত্রে ইউরিয়ার আধিক্য (Azoturia)। কষ্টিকাম, মেনা।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা বা কনকনানি (Back-ache)। ক্যালী-কার্ক।

চক্ষুর কোরয়েড্ পর্দার প্রদাহ (Choroiditis)। ব্রাই, জেলস্,
ইপিঙ্ক, মার্ক-কর, শ্ৰাটোনাইন্।

গুহ্যদ্বার বা জননেন্দ্রিয়ে (পুরুষাঙ্গ যোনি ইত্যাদি)
কঠিন, বা আঁচিলের স্থায় শ্লেষ্মিক আব বা টিউমার (Condyloma)। নাইট্রিক অ্যান্ড, থুজা, সাবাইনা।

ছুঙ্কপোষা শিশুর গায় কুস্কুড়ী (Crusta Lactea)। ডাল্‌ক্,
বায়োলা-ট্রিক্, বিন্কা-মাইনার।

কক্ষ সাবরক ঝিল্লীর কোটরে পূয়ের সংকর (Empyema)। হিপার-মাল্‌ফ্।

উপস্থির অঙ্গ (Enchondroma)। রাইনিসিয়া।

চক্ষুর কর্ণিয়ার প্রদাহ (Inflammation of the Cornea)।
এপিস্, অরাম্।

চক্ষুর কর্ণিয়ায় ক্ষত (Ulceration of the Cornea)। আদিনিঙ্ক,
একন্ (আঘাত জনিত), অ'জেন্ট্-নাইট্রিক্, আর্নিকা, আসাকিটিডা,
অরাম্, ক্যাক্-কার্ক, ক্রাহ্, ক্যামোমিলা, চায়না, দিমিসিক্, কোকায়াম্,
ক্রোটন, ইউফেস্, হিপ্-মাল্‌ফ্, ক্যালী-বাই, মার্ক্, নাজ্-বম্, পাদ্‌স্।

কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea)। ক্যান্ডাবিস্-
শ্রাট, ইউফেস্, ক্যালী-বাই।

অস্থিবৃদ্ধি (Exostosis)। ক্যাক্-ফস্, কুয়ের-আস্, হেকলা-লাবা,
মার্ক-কর।

পুরুষাঙ্গ, যোনি ইত্যাদির বহির্দেশের ককট রোগ (Noma Pudendi)। আদিনিঙ্ক।

চক্ষুর রেটিনার প্রদাহ (Retinitis)। পিক্রিক-আল্, বেল্,
জেলস্, মার্ক-সল্, মার্ক-কর, শ্রাটোনাইন্।

চক্ষুর রেটিনা ছিন্ন হওয়া (Detached Retina)। অরাম, জেলন্স।

চর্মের স্কেচোন এবং সাদা কঠিনতা (Scleroderma)।
ব্রাইওনিয়া।

চক্ষুর স্কেলোটিকার প্রদাহ (Scleritis)। খুজা।

ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসার উপযোগী

রোগ সমূহ।

আঘাত লাগিয়া থেঁতুলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়া (Contusions and Bruises)। যদি আঘাত লাগিয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানেব চর্মের নীচে কাল্‌চে নীল বা কাল্‌চে রক্ত জমিয়া থাকে, উহার সঙ্গে সঙ্গে আঘাত প্রাপ্ত স্থান ক্ষীত হয় এবং উহার রক্ত পরিবর্তিত হইয়া বেগুনী, লাল বা হরিদ্রা বর্ণ হয়, তবে আঘাতের বাহ্য প্রয়োগ ব্যবস্থা। যদি শরীরের কোমলাংশে আঘাত লাগিয়া চামড়া ছিঁড়িয়া না যায়, তবে আঘাত প্রাপ্ত স্থানে গরম জলের সেক (Fomentation) দিয়া তৎপর ৫ ফোঁটা আঘাতের মূল আরোক, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উক্ত লোশন দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত স্থান ধোয়াইয়া দিবে। অথবা আঘাত প্রাপ্ত অংশ স্থতার কাপড়ের বন্ধনী (Bandage) দ্বারা বাঁধিয়া আঘাতের মূল আরোক ২০।৩০ ফোঁটা অঙ্ক পোয়া পরিষ্কার জলে মিশাই উক্ত লোশন দ্বারা বন্ধনী ভিজাইয়া রাখিবে এবং রেসমী মোমজমা (Oiled-silk) দ্বারা বন্ধনী বাঁধিয়া রাখিবে। ব্যাণ্ডেইজের কাপড় শুকাইয়া গেলেই উক্ত লোশন দ্বারা উহা পুনরায় ভিজাইয়া দিবে। আঘাত লাগিয়া যদি চামড়া ছিঁড়িয়া যায়, তবে আঘাতের মূল আরোক ১০ ফোঁটা অঙ্কপোয়া জলে মিশাইয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানে লাগাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চামড়া ছিঁড়িয়া গেলে আঘাত দ্বারা অনেক সময় উপকার না হইয়া বরং অপকার হইতে দেখা যায়, বিশেষতঃ যদি আঘাত প্রাপ্ত স্থানে জালা থাকে। কারণ, আঘাত একটা চর্মের অত্যন্ত উত্তেজক ঔষধ এবং সুস্থ চর্মে ইহা প্রয়োগেও অনেক সময়

বিসর্পের ভাষ্য প্রদাহযুক্ত ফুসুড়ী (Erysipelatous inflammatory Eruptions) প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এমতাবস্থার আণিকার পরিবর্তে ক্যালেন্ডুলার মূল আরোক ১০।১৫ ফোঁটা অর্দ্ধ পোয়া জলে মিশাইয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানে লাগাইবে। রোগী শিশু বা ছোট বালক বালিকা হইলে ৫।৬ ফোঁটা ক্যালেন্ডুলার মূল আরোক অর্দ্ধপোয়া জলে মিশাইয়া ব্যবহার্য। আঘাত প্রাপ্ত স্থান দিয়া রক্ত পড়িলে আণিকা অপেক্ষা ক্যালেন্ডুলা অধিক উপকারী।

চক্ষু বা মুখমণ্ডলের অথ কোন কোমলাংশে আঘাত লাগিলে উহার চিকিৎসা সম্বন্ধে চিকিৎসকের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। আঘাত লাগিয়া, বা চক্ষে বালি ইত্যাদি প্রবিষ্ট হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে বা চক্ষুর পাতা বা উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান কাল বর্ণ হইলে আণিকার মূল আরোক ৫ ফোঁটা অর্দ্ধ পোয়া পুরিফাড জলে মিশাইয়া চক্ষু ধোয়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থা দ্বারা অনেকের উপকার হয়, আবার অনেকের অপকারও হইতে দেখা যায়। অতএব এই প্রকার অশুদ্ধ বা ঘটনায় আণিকার বাহ্য প্রয়োগ বিষয়ে চিকিৎসকের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

আঘাত লাগিয়া পেশীর কঠিন অগ্রভাগ (Tendons) অথবা অস্থিসন্ধি বা অস্থির আবরক কঠিন পর্দা (Periosteum) আক্রান্ত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানে ক্রমাগত টাটানি, দুর্বলতা এবং প্রচাপনে বেদনা বা টাটনির উদ্বেক হইলে, অথবা আঘাত প্রাপ্ত অস্থির সন্ধির আবরক কঠিন পর্দা, পেশীর কঠিন অগ্রভাগ বা পেশী গুলি শক্ত হইলে এবং সঞ্চালনে উহাতে বেদনার উদ্বেক হইলে, অথবা আক্রান্ত সন্ধিগুলি যদি দুর্বল হয় এবং সঞ্চালনের সময় নেতিয়া পড়ে বা বেদনাযুক্ত হয় বা উহা সঞ্চালন করিতে কষ্ট অশুভ হয়, অথবা আঘাত প্রাপ্ত স্থান যদি থেঁতলিয়া যাইয়া আণিকা দ্বারা কোন উপকার না দর্শে এবং আঘাত যদি কতক দিনের পুরাতন আকার ধারণ করে, তবে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান একখানি স্ততার কাপড়ের বন্ধনী (Bandage) দ্বারা বাঁধিয়া ২০ ফোঁটা রাস্টফের মূল আরোক, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া এই প্রকারে প্রস্তুত করা লোশন দ্বারা বন্ধনী ভিজাইয়া রাখিবে যে পর্যন্ত আক্রান্ত স্থানের বেদনাদি সারিয়া না যায়।

আঘাত লাগিয়া যা এবং কাটা যা (Wounds and Cuts)। ছুরী দিয়া কাটা যা হইলে ক্যালেন্ডুলার মূল আরোক ১০ ফোঁটা ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া এই পরিমাণে প্রস্তুত করা লোশন দ্বারা বা ধোয়াইয়া দিয়া ঘায়ের হই মুখ একত্র করিয়া ক্যালেন্ডুলার আড্‌হিভিভ্‌ প্লাষ্টার (Calendula adhesive Plaster) লাগাইয়া যা বাঁধিয়া রাখিবে। রোগী শিশু বা ছোট বালক বালিকা হইলে, ৫ ফোঁটা ক্যালেন্ডুলা ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া ব্যবহার্য্য। যদি কাটা ঘায়ের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান খেঁতুলিয়া যায়, তবে আর্গিকার লোশন ব্যবহারের ব্যবস্থা চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় আর্গিকা ব্যবহার অত্যয় বলিয়া লেখক মনে করেন। কারণ, এই অবস্থায় আর্গিকার বায়ু প্রয়োগ দ্বারা অনেক সময় বিদূর্ণ বা ইরিনিপেল্যাসের স্থায় প্রদাহ (Erysipellatous inflammation) হইতে দেখা যায়।

বন্দুকের গোলাদি লাগিয়া যা (Gunshot-wounds)। ইহাতে ক্যালেন্ডুলার লোশন ব্যবহার্য্য। এই দুর্ঘটনার চিকিৎসার ভার কোন এক বিজ্ঞ বহুদর্শী অস্ত্রচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত।

আঘাত লাগিয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থান খেঁতুলিয়া যাওয়া, মোচড়াইয়া পড়া বা অতিরিক্ত বিস্তৃত হওয়া (Sprains and Strains)। ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত স্থানে আবড়ু খাবড়ু ক্ষত হয় এবং চর্মের নীচে রক্ত জমিয়া যায় ও তদ্রূপ আঘাত প্রাপ্ত স্থান অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত ও ক্ষীত হয় এবং প্রদাহযুক্ত ও ক্ষীত স্থানের মাংস যদি ছিঁড়িয়া যাওয়ার দরুন উক্ত স্থানের কঠিনতা বা অপেক্ষা অধিক বলিয়া অনুভূত হয়, তবে আঘাত প্রাপ্ত স্থানে গরম জল দ্বারা সেক দিয়া তৎপর আঘাত প্রাপ্ত স্থান বাইগেজ্‌ দ্বারা বাঁধিয়া ৫ ফোঁটা আর্গিকার মূল আরোক অর্দ্ধ পোয়া পরিষ্কার জলে মিশাইয়া এই লোশন দ্বারা উক্ত ব্যাণ্ডেইজ্‌ ভিজাইয়া রাখিবে। এই প্রকার অবস্থায়ও লেখকের মতে উল্লিখিত কারণে আর্গিকার লোশন ব্যবস্থা অনেক সময় অত্যয় বলিয়া বোধ হয়। উক্ত উপায়ে যদি অস্থির উপশম হয়, ভাল ; কিন্তু ৫৭ দিবস এই চিকিৎসা বা বিনা চিকিৎসায় যদি অস্থি না নাগে বা আশ্রয়ে আশ্রয়ে

শারে এবং তদরূপ আক্রান্ত স্থানের সন্ধি সঞ্চালনে বেদনার উদ্বেক হয় ও পেশীগুলি কঠিন হওয়ার দরুণ সঞ্চালন, বিস্তৃত করা বা সঙ্কোচনের সময় যদি বেদনার উদ্বেক হয়, আক্রান্ত সন্ধিগুলি হুর্ল হয়, চাপিলে যদি আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয়, অথবা আক্রান্ত অঙ্গের সাহায্যে যদি রোগী কোন প্রকারের ভারি বস্তু না তুলিতে পারে, অথবা আক্রান্ত স্থান সামান্য প্রচাপনে যদি বেদনায়ুক্ত না হয় এবং প্রবল প্রচাপনে যদি অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয়, তবে আক্রান্ত স্থান হুতার কাপড়ের ব্যাণ্ডেইজ (Bandage) দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে এবং রাস-টঙ্কের মূল আরোক ১৫২০ ফোঁটা অর্ধ পোয়া পরিকার জলে মিশাইয়া এই প্রকারে প্রস্তুত করা লোশন দ্বারা ব্যাণ্ডেইজ ভিজাইয়া রাখিবে। উক্ত হুতনার কুফল যদি ঘটনার অনেক দিন পর প্রকাশ পায়, তবে রাস-টঙ্ক আরো অধিক উপকারী। এমতাবস্থায় রুটার আভ্যন্তরিক এবং বাহ্য প্রয়োগে কএকটা রোগীর চিকিৎসার লেখক বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। কোন ভারি দ্রব্য তুলিতে যাইয়া যদি কোমরের পেশীগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া বেদনাদির উদ্বেক হয়, তবে প্রথমতঃ আণিকা এবং তৎপর রাস টঙ্ক উক্ত প্রকারে ব্যবহার্য। যদি উক্ত কারণে কোমরে বেদনা বা বাত (Lumbago or Rheumatism) ধরে, তাহা হইলেও আণিকা এবং রাস টঙ্ক ব্যবহার্য। রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে আণিকা বা রাস টঙ্ক মিশ্রিত তৈল বা লিনিমেন্ট (Anicated oil or Anicated Lini-ment) অধিক উপকারী।

অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের দরুণ ক্লান্তি জনিত অস্থখ (Fatigue and Over-exertion)। যদি অনেককণ বা অনেকদূর চলিয়া বেড়াইবার পর পায় বেদনা হয় এবং ফোঁকা পড়ে, তবে গরম জল করিয়া উহাতে ১ ড্রাম আন্ডাজ আণিকার মূল আরোক মিশাইয়া, আণিকা মিশ্রিত গরম জলে পা ঝাঁটু পর্য্যন্ত ১০।১৫ মিনিট ভিজাইয়া রাখিলে বাতনাদির অনেক উপশম হইতে দেখা যায়। ক্রিকেট বা অন্যান্য রকবের খেলা যাহাতে হাত পা এবং সমুদয় শরীর অতিরিক্ত পরিমাণে সঞ্চালিত হয়, তাহাতে বেদনায়ুক্ত অঙ্গ উক্ত প্রকারে ধোয়াইলে বিশেষ উপকার দর্শে। এতদ্বিধ আণিকায় ৩২ বা ৬৪ ডাঃ সেব্য। যদি আণিকা ব্যবহারের পর ৩।৪ দিন

পর্যাপ্ত বেদনাদি বর্তমান থাকে, তবে ১০।১৫ ফোঁটা রাস্ টক্সের মূল আরোক ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া এই লোশন বেদনাযুক্ত স্থানে লেপিয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এই অবস্থার রাস্ টক্স মিশ্রিত তৈল বা লিনিমেন্ট (Rhus-oil or Rhus Liniment) মালিস করিলেও উপকার হইতে পারে।

অনেক সময় নৌকায় দাঁড় মারিতে যাইয়া অনেকের হাতে ফোঁকা পড়ে বা ফোঁকা পড়ার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় ৫ ফোঁটা ক্যাথারিসের মূল আরোক ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে লেপিয়া দিবে। ইহা দ্বারা ফোঁকা পড়া নিবারিত হইলে বা ফোঁকা সারিয়া গিয়া বেদনাদি বর্তমান থাকিলে প্রথমতঃ আর্গিকা এবং তৎপর রাস্ টক্সের লোশন, বা উক্ত দুই ঔষধ মিশ্রিত তৈল বা লিনিমেন্ট ব্যবহার্য। যদি রসিব ঘষ লাগিয়া হাতের পাতার চামড়া ছিঁড়িয়া যায়, তবে ক্যালেন্ডুলার লোশন ব্যবহার্য।

কীটাদির কামড় জনিত অন্থথ (Stings of Insects)। বোলা (বল্লা), মোমাছি, মদা, ডাঁস, ছারপোকা, ভিমকল ইত্যাদিতে কামড়াইলে কামড়ান বা হল ফুটানের স্থানে আর্গিকার মূল আরোক লেপিয়া দিলে টাটানি ইত্যাদির অনেক উপশম হয়। কামড়ের স্থান ফুলিয়া উহাতে কুট কুটানি, চিড়িক্ মারা, টাটানি এবং জ্বালা থাকিলে আর্গিকার বাহু প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে একোনাইটের আত্যন্তরিক প্রয়োগ উপকারী। ফলাদি খাইবার সময় ঠোঁটের উপর কোন কীট কামড়াইলে বেলাডোনা এবং মার্কিউরিয়াদের আত্যন্তরিক প্রয়োগে উপকার দর্শে। এতদ্বিধ আর্গিকার বাহু প্রয়োগ ব্যবস্থা। যদি কীটাদির কামড়ের পরই কামড়ের স্থান লালবর্ণ ক্ষীত, উষ্ণ, বেদনাযুক্ত হয় এবং আবেগ ত্রায় ক্ষীত হইয়া উহাতে কুট কুট করে, অথবা চর্ম যদি কৌচকাইয়া উঁচু নিচু হয় এবং কোন কোন স্থানে লালবর্ণ এবং কোন কোন স্থানে সাদা হয়, অথচ চর্মে ফোঁকা বা ফুসুড়ী না হয় এবং চর্মে হাত বুলাইলে নির্মল অধুভূত হয়, তবে আটিকা ইউরেন্সের মূল আরোক ১০ ফোঁটা, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া কামড়ের স্থানে লেপিয়া দিলে অনেক উপকার দর্শে। একপ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ২।৩ বার লেপ দিলেই অন্থথ সারিয়া যায়।

গায় বিছাটি লাগিলে আর্গিকা ১৫ ফোঁটা, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে লেপিয়া দিবে। শিশু বা ছোট বালক বালিকার জন্য আর্গিকা ৫ ফোঁটা ২ কাঁচা জলে মিশাইয়া ব্যবহার্য্য।

অল্প চিকিৎসায় অনেক সময় অল্প দ্বারা কাটা বা দিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে পারে। এমতাবস্থায় ক্যালেন্ডুলার মূল আরোক ১৫।২০ ফোঁটা, এক ছটাক পরিমাণ পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উহাতে একখানী সূতার কাপড়ের নেক্‌ড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

অনেক সময় দাঁত তুলিয়া ফেলার পর দাঁতের গোড়া দিয়া অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইতে দেখা যায় এবং অনেক সময় রক্তস্রাব এত ভয়ানক আকার ধারণ করে যে উহার দরুন রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। এমতাবস্থায় আর্গিকার মূল আরোক ১০ ফোঁটা, ১ ছটাক পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উক্ত লোশন দ্বারা কুলকুচা করিলে বেদনাদি সারিয়া যায় এবং রক্তস্রাবও বন্ধ হয়। দাঁত তোলার পর অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে ক্যালেন্ডুলার মূল আরোক ১০ ফোঁটা, ১ ছটাক পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা কুলকুচা করিলেও রক্তস্রাব বন্ধ হয়। আর্গিকা বা ক্যালেন্ডুলার লোশন দিয়া কুলকুচা করার পর পরিষ্কার জল দিয়া মুখ ধুইয়া ফেলা উচিত।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠে সন্তান প্রসবের পর, অথবা অল্প দ্বারা সন্তান প্রসব করার পর, অনেক সময় জরায়ু ইত্যাদি জননেন্দ্রিয় প্রদাহযুক্ত হইতে দেখা যায়। অতএব উক্ত প্রকারে সন্তান প্রসবের পর আর্গিকার মূল আরোক ১৫ ফোঁটা অরুণোয়া ঈষৎ উষ্ণ জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা যোনি দ্বারাদি ধোয়াইয়া দিলে প্রদাহের আশঙ্কা থাকে না। অনেক সময় সন্তান প্রসবের পর যোনিদ্বার এবং শুষ্ক দ্বারের মধ্যবর্ত্তী পেরিনিয়াম্ (Perineum) নামিক স্থান ছিঁড়িয়া বা ফাটয়া যায়। এমতাবস্থায় একখানি সূতার কাপড়ের নেক্‌ড়া আর্গিকার মূল আরোকে ভিজাইয়া, আর্গিকাতে ভিজান নেক্‌ড়া খানি পেরিনিয়ামে দিয়া ব্যাণ্ডেইজ্ (Bandage) দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে এবং যোগ্যতম এক পাশে দুই পা একত্রিত করিয়া শোয়াইয়া রাখিবে। আর্গিকাতে জল না মিশাইলেও চলিতে পারে, কারণ, সন্তান প্রসবের পর যোনিদ্বার দিয়া যে রক্ত (Lochia) নিঃসৃত হয়, তাহাই স্নানের কার্য্য

করিয়া আর্গিকার তেজ কমাইয়া থাকে। যদি কষ্টে সন্তান প্রসবের পর যোনি ইত্যাদি ছিঁড়িয়া অধিক বা হয়, তবে আর্গিকার বাহ প্রয়োগ করা বিষয়ে চিকিৎসকের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। মৃত্যু প্রাপ্তী উহার দ্রুত বিশেষ কষ্ট পাইতে পারে। কারণ, আর্গিকার অপব্যবহারের দ্রুত অনেকের যোনি ছারাদিতে ইরিসিপেলাসের জ্বর ফুসুড়ী এবং উজ্জ্বলিত ক্ষত হইয়া প্রাপ্তী অনেক দিন কষ্ট পায়, লেখক এক্ষণে অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন।

কষ্টে প্রসবের দ্রুত সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর অনেক সময় শিশু মৃতবৎ হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় ২ সের জৈব উষ্ণ জলে ২০।৩০ কোঁটা পরিমাণ আর্গিকার মূল আরোক মিশাইয়া আর্গিকা মিশ্রিত উষ্ণ জৈব উষ্ণ জল দ্বারা মুখমণ্ডল ব্যতীত শিশুর সমুদয় শরীর ধোয়াইয়া দিয়া তৎপর জৈব উষ্ণ জলে শিশুকে পুনরায় ধোয়াইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

দন্তশূল (Tooth-ache)। যত পরিমাণ আর্গিকার মূল আরোক উষ্ণতে তত পরিমাণ পরিষ্কার জল মিশাইয়া উষ্ণ প্রকারে আর্গিকা মিশ্রিত জল ৪৫ মিনিট মুখের মধ্যে রাখিয়া ফেলিয়া দিলে দন্তশূলের অনেক আন্ত উপশম হয় এক্ষণে চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতে লেখক দন্ত শূলের অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়া দেখিয়াছেন। ইহা দ্বারা দন্তশূলের উপশম হয় বটে, কিন্তু উহার দ্রুত রোগীর মুখগহ্বর, গালগহ্বর, জিহ্বা, গুষ্ঠ এবং গলার মধ্যে জ্বালা, টাটানি, ক্ষলক্ষণ বোধ ইত্যাদি কতকগুলি বাতনা থাকিয়া যায়। অনেক সময় উহার দ্রুত মুখে যাও হইতে দেখা যায় বাহা দন্তশূল অপেক্ষাও রোগীর পক্ষে চতুর্গুণ কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। অতএব এইক্ষেপে দন্তশূলে উষ্ণ প্রকারে আর্গিকার বাহ প্রয়োগ করিবার সময় লেখক বিশেষে সাবধান হইয়া থাকেন। ২০ কোঁটা আর্গিকার মূল আরোক অর্ধপোয়া জলে মিশাইয়া কুঁচুা করিলেই ভাল হয়। কুঁচুা করিয়া পরিষ্কার গরম জল দ্বারা মুখ ধুইয়া ফেলা উচিত।

চোঁঠ কাটা (Cracked-lips)। ইহাতে আর্গিকটেড্ সিরেট্ (Arnicated Cerate) ব্যবহার্য। কতক পরিমাণ আর্গিকটেড্ সিরেট্ হাতের আঙ্গুলের মাথায় লইয়া চোঁটের কাটা স্থানে প্রাতে ও বৈকালে

মানস করিবে। কি প্রকারে সিরেট্ প্রস্তুত করিতে হয় তাহা হানাত্তরে লিখিত হইয়াছে। গ্লিসিরোল্ অব্ আর্নিকা বা ক্যালেন্ডুলাতোও (Glycerol of Arnica or Calendula) বিশেষ উপকারী।

হাতফাটা (Chapped hands)। ২০০০ ফেঁটা আর্নিকার মূল আরোক, ২ কাঁচা পরিমাণ পরিষ্কার বা চূষান জলে মিলাইয়া এইরূপে মিশ্রিত লোশন দ্বারা হাত ধোয়াইয়া তৎপব প্রতিদিন ফাটা স্থানে আর্নিকেটেড্ সিরেট্ (Arnicated Cerate) লাগাইবে। ইহাতেও গ্লিসিরোল্ অব্ আর্নিকা বা ক্যালেন্ডুলা বিশেষ উপকারী।

কড়া একং পায়ের বুন্ধাঙ্গুলীর প্রদাহ ও তদ্রূপ উহার সন্ধি ইত্যাদির কঠিনতা (Corns and Bunions)। আঁটা জুতার পরার দরুণ উক্ত উভয় অস্থায়ি হয়, বিশেষতঃ কড়া। যদি কড়া আরম্ভ হওয়ার সময় আর্নিকার লোশন দ্বারা আক্রান্ত আঙ্গুলে নেকড়া জড়াইয়া রাখা যায়, তবে কড়া কঠিন হইতে পারে না। যদি কড়া কঠিন হয়, তবে রাত্রিতে শয়ন করিবৃ্ত্তির সময় এক স্থানি ধারাল ছুরি দিয়া কড়া কাটিয়া আর্নিকার লোশনে নেকড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত আঙ্গুল বাধিয়া রাখিবে। আর্নিকার মূল আরোক ২০ ফেঁটা, জল ২ কাঁচা, এই পরিমাণে প্রস্তুত করা লোশন ব্যবহার্য। প্রাতঃকালে লোশনের নেকড়া স্থানি ফেলিয়া দিয়া আক্রান্ত আঙ্গুল উষ্ণজল দ্বারা ধোয়াইয়া আর্নিকেটেড্ স্টিকিং প্লাষ্টার (Arnicated sticking plaster) দ্বারা আঙ্গুল জড়াইয়া বাধিয়া রাখিবে। ইহা দ্বারা আঙ্গুলে ঘর্ষণ লাগিতে পারে না এবং তদ্রূপ কড়াটা শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া যায়। যদি কড়া কাটিবার সময় অসাবধানতা বশতঃ রক্ত পড়ে, তবে আর্নিকেটেড্ প্লাষ্টার কাটা ঘা লাগাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা চিকিৎসা বিদ্যুৎক গ্রাফে দেখিতে পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় লেখকের মতে ক্যালেন্ডুলা প্লাষ্টার এবং ক্যান্ডেলুলার স্টোশন ব্যবহার করাই উচিত। যদি জুতার চাপাদি লগ্নিয়া পায়ের বুন্ধাঙ্গুলী প্রদাহবৃত্ত, ক্ষীত এবং কঠিন হয়, তবে ইহাতে কড়ার দ্বারা আর্নিকার লোশন এবং আর্নিকা প্লাষ্টার ব্যবহার্য।

চাপা লাগিয়া বা জলাদিতে ভিজিয়া আঙ্গুল, পায়ের পাতার তলা, আঙ্গুলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রদাহ বা চিল্বেইন

(Chilblain)। ইহাতে অনেক সময় পায়ের পাতার তলা, আঙ্গুলের তলা ও উহার ফাঁকে ফাঁকে, পায়ের গোড়াড়িতে ফোঙ্গার ছায় ফুসুড়ী এবং ঘাওঁহর এবং ফুসুড়ী গুলি অত্যন্ত চুলকায়ে। রোগের প্রারম্ভে আক্রান্ত স্থান কঠিন চক্চকে, লালবর্ণ, উজ্জ্বল এবং অনেক সময় ক্ষীত হয় ও অত্যন্ত চুলকায়ে। এমতাবস্থায় আর্গিকা লোশন ব্যবহার্য। আর্গিকার লোশন ঈষৎ উষ্ণ করিয়া দিলে ভাল হয়। প্রতিদিন রাত্রে শয়ন করিবার সময় আর্গিকার লোশন দ্বারা আক্রান্ত পা ধোয়াইয়া শয়ন করা উচিত। অনেক সময় আক্রান্ত আঙ্গুলের সন্ধিগুলি কঠিন, উষ্ণ, লাল বর্ণ ও প্রদাহযুক্ত হইয়া ক্ষীত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কুট্‌কুটানি, হুড়্‌হুড়ী এবং চুলকানির উদ্বেক হয় ও ফোঙ্গার ছায় জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ী প্রকাশ পায়। এমতাবস্থায় রাস্টক্স লোশন বা রাস্টক্স মিশ্রিত তৈল ব্যবহার্য। আর্গিকা লোশনের ছায় রাস্টক্স লোশনও ব্যক্তিতে শয়ন করিবার সময় ব্যবহার্য। যদি উক্ত লক্ষণ গুলির সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত স্থানে ক্ষীতি না থাকে বা কম থাকে, তবে আর্গিকার লোশন বা আর্গিকা মিশ্রিত তৈল আর্গিকা এবং রাস্টক্সের ছায় ব্যবহার্য। যদি রোগের প্রথমাবস্থায় আক্রান্ত স্থানে ফোঙ্গা পড়ে বা ফোঙ্গা পড়ার উপক্রম হয়, ক্যান্সারাইডিসের মূল আরোক ৫ ফেঁটা অর্ধ পোয়া জলে মিশাইয়া উষ্ণ দ্বারা উল্লিখিত অঙ্গাঙ্গ ওবধের ছায় আক্রান্ত স্থান ধোয়াইয়া দিবে। যদি ফোঙ্গাগুলি ফাটিয়া যাইয়া গভীর ক্ষত হয়, তবে কষ্টিকামের লোশনে হতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া নেকড়া ধানি আক্রান্ত স্থানে বান্ধিয়া রাখিবে।

কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া ঘা হওয়ার দরুণ বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্ (Traumatic Erysipelas)। ইহাতেও আর্গিকা লোশন উপকারী। আর্গিকার মূল আরোক ৫ ফেঁটা, ২ কুঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া ঘায়ে লাগান উচিত। এ সকল ঘায়ে আর্গিকার লোশনের মাত্রা উক্ত মাত্রা অপেক্ষা অধিক হইলে অপকার হওয়ার সম্ভাবনা। যদি আক্রান্ত স্থানে ফোঙ্গার ছায় ফুসুড়ী প্রকাশ পায়, তবে আর্গিকা অপেক্ষা রাস্টক্স অধিক উপকারী।

বাতরোগ বা বৃহৎ সন্ধিবাত (Rheumatism)। খেঁতলিয়া

গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে এবং অস্থিসন্ধি স্থান ভ্রষ্ট (Dislocation) হইলে ঘেঁষপ হয়, পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরে সেক্রপ বেদনা; পরিশ্রম করার পর ক্রান্ত হইলে ঘেঁষপ হয়, বাহু এবং পায়ে সেক্রপ বেদনা ও কখন কখন আক্রান্ত স্থান লালবর্ণ ও স্ফীত হয় এবং আক্রান্ত অঙ্গে পক্ষাঘাতের দ্বায় কঠিনতা, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমান থাকে। এমতাবস্থায় আর্গিকা এবং রাস্টেঞ্জ মিশ্রিত তৈল বা লিনিমেন্ট ব্যবহার্য। ক্ষুদ্র সন্ধিবাতাক্রান্ত বৃহৎ সন্ধিবাতো (Rheumatic Gout) উক্ত দুই ঔষধ ব্যবহার্য। যদি বৃহৎ সন্ধি বা ক্ষুদ্র সন্ধিবাতো পেশী এবং পেশীর অগ্রভাগে কঠিনতা এবং বেদনা থাকে, আক্রান্ত স্থান সঞ্চালনেই যাহার উদ্বেক বা বুদ্ধি হয়; অথবা আক্রান্ত সন্ধি, বিশেষতঃ পায়ের পাতার সন্ধি, অধিক আক্রান্ত হইয়া সোজা অবস্থায় থাকিলে, বাঁকাইলে এবং গুটান অবস্থায় থাকিলে বা সোজা করিবার সময় যদি অত্যন্ত খাতনীর উদ্বেক হয়; অথবা বেদনা এবং কঠিনতার দরুণ যদি আক্রান্ত সন্ধি ইত্যাদি সঞ্চালন করিতে না পারা যায়, তবে রাস্টেঞ্জ মিশ্রিত লোশন বা তৈল ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। •

ক্ষুদ্র সন্ধিবাত বা গাউট্ (Gout)। সুস্থ শরীরে আর্গিকা সেবনে সন্ধি গুলিতে ঘেঁষপ অস্থখাদি হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ হানিম্যুনের মেটরিয়া মেডিকা পিউরাতে (Hahnemann's Materia Medica Pura) পাঠ করিয়া ক্ষুদ্র সন্ধিবাতো যে আর্গিকা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে আমরী রোগ চিকিৎসায় ইহা অপেক্ষা রাস্টেঞ্জ দ্বারা অধিক উপকার পাইয়া থাকি। ইহা একটি ধাতুগত রোগ বিশেষ। অতএব ইহাতে বাহ্য প্রয়োগের ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগও প্রয়োজন হইয়া থাকে। আক্রান্ত সন্ধি উষ্ণ, কঠিন, স্ফীত এবং উজ্জ্বল হওয়া আর্গিকা ব্যবহারের কতকগুলি প্রাকৃতিক লক্ষণ। অতএব এই রোগে আর্গিকার লোশন, আর্গিকা মিশ্রিত তৈল বা লিনিমেন্ট সকলই উপকারী।

• অনেক সময় আর্গিকা, রাস্টেঞ্জ ইত্যাদি উল্লিখিত ঔষধ গুলির অপব্যবহারের দরুণ অনেকের অনেক রকমের অস্থখ হইতে দেখা যায়। একরূপ ঘটনা অতি বিরল নহে। প্রত্যেক সময় যে স্থানে আর্গিকা প্রয়োগ করা হয়,

১৯৯৪ রোগ চিকিৎসার সহায়কারী আনুষঙ্গিক উপায় ।

সেহান ফীত, উষ্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া আক্রান্ত স্থানে কুটকুটানি এবং বেদনার উদ্বেগ হয়, অথবা রাস্টক্স ব্যবহারের পর ফোঁকার জ্বর জলপূর্ণ ফুঁকুটী প্রকাশ পায়। এমতাবস্থায় ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর আক্রান্ত স্থানে উষ্ণ জল দ্বারা সেক দিলে উক্ত লক্ষণাদি শীঘ্র শীঘ্র দূরীভূত হয়। অথবা উষ্ণ জল দিয়া সেক দিলে যদি উক্ত লক্ষণাদি ১২ ঘণ্টার মধ্যে দূরীভূত না হয়, তবে কুবিদীক কাম্ফার জলে মিশাইয়া উক্ত জল দ্বারা আক্রান্ত স্থান ধোয়াইয়া দিবে এবং উক্ত ঔষধের ২।১ ফোঁটা পরিষ্কার চিনিতে মিশাইয়া সেবন করাইবে।

রোগ চিকিৎসার সহায়কারী আনুষঙ্গিক উপায় ।

সেক দেওয়া (Fomentations)। ইহা লোভ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে স্থানিক প্রদাহে উষ্ণ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা প্রণালীর বিধান সঙ্গত। এই উষ্ণ প্রয়োগ কোন প্রকারের ঔষধ দ্বারা করা উচিত নহে। গরম জল ও ফ্লানেল কাপড় দ্বারাই করা উচিত। দুই প্রকারে সেক দেওয়া বাইতে পারে। (১) আর্দ্র সেক (Moist Fomentation)। উষ্ণ জলে ফ্লানেল কাপড় ভিজাইয়া নিঙ্ড়াইয়া আক্রান্ত স্থানে সেক দেওয়াকে আর্দ্র সেক দেওয়া বলা যায়। (২) শুষ্ক সেক (Dry Fomentation)। কাঠের কয়লার আগুনে ফ্লানেল কাপড় গরম করিয়া আক্রান্ত স্থানে সেক দেওয়া, অথবা আক্রান্ত স্থানের উপর ১ বাসি ফ্লানেল কাপড় ৪।৫ ভাজ করিয়া রাখিয়া একপানি মাটির সরার কাঠের কয়লায় আগুণ লইয়া সরার তলা গরম হইলে আক্রান্ত স্থানে বিছান ফ্লানেল কাপড়ের উপর সরার তপ্ত তলা বারম্বার লাগাইবে। এই প্রকার সেক দেওয়াকেই শুষ্ক সেক দেওয়া বলে।

পুল্টিস্ (Poultices)। ফোঁড়া, ব্রণ ইত্যাদি হইলে ময়দা, তিসি ইত্যাদি দিয়া পুল্টিস্ প্রয়োগেই ফোঁড়াদি মিলাইয়া বাইতে পারে। আবার ফোঁড়াদিতে পুঁথ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে পুল্টিসে পুঁথ শীঘ্র শীঘ্র

রোগ চিকিৎসার সহায়কারী আনুষঙ্গিক উপায় । ১০৯৫

উৎপন্ন হয় এবং উহার দ্রুত অনেক সময় অল্প চিকিৎসার সাহায্য ব্যতীতও ফোঁড়াদি আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। দ্রুতত্রেণে পচা ধরিলে ময়দা বা তিসির সঙ্গে কয়লায় মিহি গুঁড়া মিশাইয়া পুল্‌টিস্‌ দিলে বা অধিক পচিতে পারে না এবং যায় পচা থাকিলে উহা দ্রুত হ্রাস ও যায় দুর্গন্ধ হইতে পারে না। ঠাণ্ডা জলে হস্তার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থানে নেকড়া খানি ব্যাণ্ডেজ্‌ দ্বারা বাধিয়া রাখিবে এবং উক্ত স্থানে যেন ঠাণ্ডা বাতাস না লাগিতে পারে সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবে। এই প্রকার ঠাণ্ডা জল প্রয়োগকে জল পুল্‌টিস্‌ বলে। স্থানিক প্রদাহ, ফোঁড়া, ত্রণ, অস্থির আবরক কঠিন পর্দা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির আবরক কঠিন পর্দার প্রদাহ, আঙ্গুল হাড় (Whitlow), সকল প্রকারের ফোঁড়ার প্রথম-বিস্তার, যখন পুঁথ না হয় ইত্যাদিতেই জল পুল্‌টিস্‌ ব্যবহার্য্য।

পিচ্‌কারী দেওয়া (Injections)। অনেক সময় অস্ত্রের একপাশ অবস্থা হইয়া দাঁড়ায় যে উহার দ্রুত বাহ্যের বেগ হয়, অথচ অস্ত্রের একপাশ ক্ষমতা থাকে না যত্বেই অস্ত্রের রুদ্ধ মূলগুলি বৃহীত হইতে পারে। এমতাবস্থায় রোগীর বয়স ও স্বাস্থ্য হিসাবে অর্দ্ধপোয়া হইতে অর্দ্ধসের জৈব উষ্ণ জল দ্বারা গুহ দ্বার দিয়া পিচ্‌কারি দিলে অস্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত মল গুলি অনায়াসে নির্গত হইয়া যায়। কোন প্রকারের ঔষধ মিশ্রিত জল দ্বারা গুহ দ্বার দিয়া পিচ্‌কারী দেওয়া অর্হিত।

স্নান (Baths)। নবগ্রস্থ শিশুগণের স্নান সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। মাতৃগর্ভে শিশুগণ উষ্ণাবস্থায় থাকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া শিশুর শীতবোধ হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে ধোয়ানও নিতান্ত আবশ্যক। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে জৈব উষ্ণ জলে স্নান করান উচিত। স্নান করাইয়া তাহাদিগের শরীর ভালরূপে মুছিয়া ভালরূপে গায় কাপড় দিয়া রাখিবে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৭৪ দিন পর হইতেই শিশুকে টাটকা কাঁচা জলে (রৌদ্রের উত্তাপে জল কতকক্ষণ রাখিয়া) প্রতিদিন স্নান করাই উচিত। স্নান করানোর সময় ২১ মিনিটের অধিক শিশুকে জলে রাখিবে না। স্নান করাইয়া গা ভাল করিয়া মুছাইয়া দিয়া গায় কাপড় দিয়া রাখিবে। এইরূপ কাঁচা জলে প্রতিদিন স্নান করাইলে শিশুর শরীর

১০৯৬ রোগ চিকিৎসার সহায়কারী আনুষঙ্গিক উপায়।

ভাল থাকে, সে ভাল খায়, সুস্থশরীরে ঘুমায় এবং সহজে বা সামান্য কারণে ভাটার সন্ধি ইত্যাদি অসুখ হইতে পারে না। গরমের মাসে শিশুগণকে প্রাতে ৯১০ টার সময় স্নান করাইয়া বৈকালে গায়ে গা মুছাইয়া দিলে ভাল হয়। যুবা যুবতীর পক্ষেও প্রতিদিন কাঁচা টাটকা জলে স্নান বিশেষ উপকারী। আহারের পূর্বেই স্নান করা উচিত। আহারের পর বা ভরা পেটে স্নান করা অসঙ্গত। সুস্থ শরীরের গরম জলে স্নান স্বাভাবিক হয়। কিন্তু শরীর দুর্বল হইলে ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান মন্দ নহে। অতি প্রত্যবে স্নান অনিষ্ট কর, বিশেষতঃ দুর্বলের পক্ষে। বেলা ৯১০ টার পূর্বে স্নান করা অসুচিত। শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, বিশেষতঃ গ্রীষ্ম কালে, প্রতি দিন প্রত্যবে ৫৬ টার সময় কাঁচা টাটকা জল দ্বারা মাথা ধোয়াইবে এবং শরীর ভাল রূপে মুছিয়া ফেলিবে। তৎপর ৯১০ টার সময় কাঁচা টাটকা জলে স্নান করিবে। ডুব দিয়া (অবগাহন) স্নান মন্দ নহে। বৈকালে ৪।৫ টার সময় প্রত্যবে স্নান মাথা ধুইয়া এবং গা মুছাইয়া ফেলা উচিত। বাহাদিগের যন্ত্রিকের অসুখের দ্রুত রাত্রিতে নিদ্রাভ্রাণ হয় না, রাত্রিতে শয়ন করার পূর্বে কাঁচা জল দ্বারা মাথা ধোয়ান এবং শরীর মুছিয়া ফেলা বিশেষ উপকারী। স্নান করার পর খালি বা আত্ম গায় প্রবল বাতাসে থাকা অসুচিত।

স্নান করার পর, আহারের অন্ততঃ ১ ঘণ্টা পূর্বে, স্নান চালনা মন্দ নহে। ইহা পরিণামক কার্যের অনেক সাহায্য করে।

পরিশিষ্ট ।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগেই হউক, বা বাহ্য প্রয়োগেই হউক, রোগের প্রতিকারার্থে যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করা যায়, তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে ঔষধ বলা যাইতে পারে। এই হিসাবে আহাৰাদির নিয়ম পালন, ব্যায়াম বা অনাদির চালনা, জল বায়ু পরিবর্তন ইত্যাদিকেও ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে প্রকৃত পক্ষে শেষোক্ত নিয়মাদি রোগ চিকিৎসার আনুষঙ্গিক উপায় বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত। অনেক রোগ আছে যাহা অন্ত্রচিকিৎসা ভিন্ন আরাম হয় না। অতএব অন্ত্রচিকিৎসাকেও ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। অন্ত্রচিকিৎসাসম্বন্ধীয় রোগেই বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ঔষধের উৎপত্তি হয়। এই উৎপত্তি ভেদে ঔষধগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) গাছ, কতৃ, গাছ ও পাতাদি, ফল, ফুল, পাতা, বাকল, শিকড়, ডাঁটা ইত্যাদি উদ্ভিদ ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। একো নাইট্, বেলাডোনা, হায়োসায়েরাস্ ইত্যাদি উদ্ভিদ ঔষধের উদাহরণ। (২) ধাতু ও তদ্ব্যবহৃত দ্রব্য যাহা পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকে পার্থিব ঔষধ বলিতে পারা যায়। অরাম্, ফেরাম্, সোইলিসিয়া ইত্যাদি পার্থিব ঔষধের উদাহরণ। (৩) জাস্তব ঔষধ, অর্থাৎ এই সকল ঔষধ গভ, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির দেহ হইতে উৎপন্ন হয়। ক্যান্থারাইডিস্, সিন্‌পিয়া, কান্‌কো-আনি-মেলিস্ ইত্যাদি জাস্তব ঔষধের উদাহরণ। এতদ্ভিন্ন জল, বায়ু, উত্তাপ, ইলেক্ট্রিসিটি (Electricity), গ্যাল্বানিজম্ (Galvanism), ম্যাগনেটিজম্ (Magnetism) ইত্যাদিকেও ভৈষজ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। প্রথম উক্ত তিন শ্রেণীর ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগের বিবরণ মূল গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বলা হইয়াছে যে ঔষধের ব্যবহার বা প্রয়োগ দুই প্রকার। (১) আভ্যন্তরিক প্রয়োগ; (২) বাহ্য প্রয়োগ। ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগের বিবরণ মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। কেবল বাহ্য প্রয়োগের উপযোগী কতকগুলি ঔষধের

১০৯৮ বাহ্য প্রয়োগের ঔষধের ব্যবহার বিচার।

ব্যবহারবিধি নিয়ে লিখিত হইল। অনেকের একরূপ বিশ্বাস যে হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসার ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ নিষিদ্ধ। তাঁহাদের এই বিশ্বাসটা ভ্রম মূলক। কারণ, ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা সমস্ত সময় এক উপকার পাওয়া যায় যে, উহা বলিয়া শেষ করা যায় না। রোগ আরাম করাই যদি চিকিৎসার উদ্দেশ্য হয়, তবে যে উপায়েই হউক, রোগ বাহাতে সহজে, নির্ভীক্রে এবং সম্পূর্ণরূপে আরাম হইতে পারে সে বিধিরেই দৃষ্টি রাখা চিকিৎসকের সর্ব প্রধান কর্তব্য। অল্প চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অনেক রোগ কোন ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যতীত বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা সহজে সারিয়া যায়, লেখক একরূপ অনেক দেখিয়াছেন। ঔষধের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ ব্যতীত আরো কতকগুলি আনুষঙ্গিক উপায় আছে বাহা অবলম্বন করিলে রোগ আরাম সম্পূর্ণরূপে হঠক বা না হউক, রোগের যন্ত্রণাদির বে আশু উপকার হয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ফোড়া, স্থানিক প্রদাহ ইত্যাদি অনুরে পুলটিস্, ফোমেটেডন্, মস্তিষ্ক রক্তাধিক্যের উপশমের জন্য মাথায় জল বা বরফাদির বাহ্য প্রয়োগ, জল পান ইত্যাদি উক্ত আনুষঙ্গিক উপায়ের উদাহরণ।

বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ। একোনাইট্, আণিকা, নৈলিস্-পেরেনিস্, কার্কোলিক্-অসিড্, নাইট্রিক্-অসিড্, ইকুলাস্-হিপোক্যাষ্টেনাম্, বেভাডোনা, ট্রাইওনিয়া, ক্যাগেডুলা, ক্যাছারিস্, কার্কো-বেজিটেবিলিস্, কষ্টিকাম্, হামামেলিস্-বাজিনিকা, হাইড্রাষ্টিস্-ক্যান্ডেডেনিস্, লেডাম্-পেলাষ্টি, মার্কিউরিয়াম্-বিনায়োডাইড, ফাইটোলাকা-ডিকাণ্ড্রা, বাস্-টাক্সিকোডেণ্ড্রাম্, কুটা-গ্রাবিয়েলেল্, সিম্ফাইটাম্, সাল্ফার, গুজা অক্সিডেন্টালিস্, আটিকা-ইউরেন্স্, বিরেটাম্-বিরাইড্, বোরাক্স ইত্যাদি ঔষধের বাহ্য প্রয়োগই সচরাচর অধিক হইয়া থাকে। এই সকল ঔষধ ব্যবহারের বিশেষ বিবরণ নিয়ে লিখিত হইল।

একোনাইট্-নেপেলাস্ (Aconite Nap.)। কোন অঙ্গে আঘাত লাগিয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানে বেদনাদি হইলে আণিকার বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা যদি না সারিয়া পুরাতন আকার ধারণ করে, তবে ইহা অথবা রাপটক্স ব্যবহার্য। একোনাইট্-নেপেলাসের গাছের সমুদয় অংশ দ্বারা প্রস্তুত করা

মূল আরোকের ৫ হইতে ২০ ফোঁটা, ১ আউন্স অগ্নি অয়েল মিশাইয়া অক্লান্ত স্থানে প্রাতে ও বৈকালে মালিশ করিবে। রাস তৈল মিশ্রিত অগ্নি অয়েল ও আক্রান্ত স্থানে একোনাইট মিশ্রিত তৈলের ভ্রায় ব্যবহার্য। প্রথম রোগে অনেক সময়, প্রধানতঃ রাত্রিতে, পুরুষাঙ্গ খাড়া হয় এবং তদ্রূপ রোগী অত্যন্ত যাতনা ও অন্তঃকণ্টকিয়া থাকে। এমতাবস্থায় একোনাইটের মূল আরোক, ৫ হইতে ১০ ফোঁটা, ১ আউন্স পরিষ্কার জলে মিশাইয়া ঔষধ মিশ্রিত উক্ত জলে একখানি সরু সূতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় নেকড়া বানি পুরুষাঙ্গে জড়াইয়া রাখিলে উক্ত যাতনার অনেক উপশম হইতে দেখা যায়। ফুফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pleurisy), কৃত্রিম ফুফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pleurodynia) এবং ফুফুস প্রদাহ (Pneumonia) ইত্যাদি ফুফুস বা বুকের অস্থখে বুক বেদনা বা ঝান কষ্ট হইলে একোনাইটের মূল আরোক মিশ্রিত অগ্নি অয়েল বুকের উপর মালিশ করিলে যাতনার অনেক আশু উপশম হইতে দেখা যায়। ঔষধ মিশ্রিত তৈল ব্যতীত অত্র এক প্রকারের মালিশ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহাকে লিনিমেন্ট (Liniment) বলে। এতদ্বির একোনাইটের আভ্যন্তরিক প্রয়োগও ব্যবহৃত।

আর্নিকা মন্টেনা (Arnica Montana)। কোন অঙ্গ বা শরীরের কোন অংশে আঘাত লাগিয়া ঋতুতলিয়া গেলে, মোচড়াইয়া পড়িলে, বা অস্থির সন্ধি স্থান ভ্রষ্ট (Dislocation) হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত। আঘাত পাওয়া মাত্রই এই ঔষধের ৫ ফোঁটা, ১ আউন্স জলে মিশাইয়া উহাতে একখানি সরু সূতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থান উক্ত নেকড়া দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে। আঘাত প্রাপ্ত স্থানের চর্ম ছিঁড়িয়া বাইরা কত হইলে আঘিকার বাহ্য প্রয়োগে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। উহা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত স্থানে বিদগ্ধব প্রদাহ (Erysipelatous inflammation) হইতে পারে। একরূপ ঘটনা লেখক অনেক স্বক্ষে দেখিয়াছেন। অনেক সময় পুরাতন আকারের রাত রোগে (Chronic Rheumatism) আর্নিকা

* বাহ্য প্রয়োগের উপযোগী ঔষধ মিশ্রিত তৈল (Medicated oil), লোশন (Lotion) এবং লিনিমেন্ট (Liniment) প্রস্তুত ও প্রয়োগের নিয়মাদি পশ্চৎ লিপিত হইবে।

১১০০ বাহ্য প্রয়োগের ঔষধের ব্যবহার বিচার

মিশ্রিত তৈল * মালিস, একোনাইট্ বা রান্টল্ মিশ্রিত তৈলের মালিস্ অপেক্ষা অধিক উপকারী। উল্লিখিত রোগে আর্নিকার লিনিমেন্ট ও (Liniment) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকের আর্নিকার বাহ্য প্রয়োগ সহ্য হয় না। এমতাবস্থায় আর্নিকার পরিবর্তে বেলিস্-পেরেগিস্ আর্নিকার জায় ব্যবহার্য্য। আর্নিকার অপব্যবহার দ্বারা অনিষ্ট হইলে ক্যাম্ফার বা স্পিরিট্ লোশন দ্বারা ক্রাক্রাস্ত স্থান ধুইয়া ফেলিবে।

কার্বোলিক্ আসিড্ (Carbolic Acid)। ইহা পচা ঘায়েই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ঘায়ের দুর্গন্ধ নিবারণ করে এবং ঘায়ের পচন কার্য্যেব সহায়কারী জাত্তব বিষেয় মূল ধ্বংশ করে। রোগের জাত্তব বিষ যাহা বহির্কীয়ুতে উড়িয়া বেড়ায় বা ময়লা নর্দামাদিতে থাকে, কার্বোলিক্ আসিডে তাহা বিনষ্ট হয়। একজুই বড় বড় নগবে রাস্তার ময়লাযুক্ত স্থান এবং নর্দামার কার্বোলিক্ আসিড্ ঢালিয়া দেওয়া হয়। হাঁসপাতালেও উক্ত কারণে কার্বোলিক্ আসিড্ বিস্তৃতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পচা ঘায়ের চিকিৎসায় ইহা দুই প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বধাঃ—(১) কার্বোলিক্-লোশন্ (Carbolic-lotion)। ইহা দ্বারা পচা ঘা ধোয়ান হয় এবং উক্ত লোশনে স্নতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া ঘাষে লাগাইলে ঘায়ের পচা দূর্বীভূত হয়। সামান্য রকমের পচা ঘায় প্রতি আউন্স্ জলে ৫ গ্রেইন্ বা ৫ ফোঁটা হইতে ১৫ গ্রেইন্ বা ১৫ ফোঁটা কার্বোলিক্ আসিড্ ব্যবহার্য্য। দুই ত্রণ বা পৃষ্ঠাঘাতে প্রতি আউন্স্ জলে ৫ গ্রেইন্ বা ৫ ফোঁটা হইতে ১৫ গ্রেইন্ বা ১৫ ফোঁটা কার্বোলিক্ আসিড্ ব্যবহার করা যাইতে পারে (২) কার্বোলিক্ অয়েল্ বা কার্বোলিক্ আসিড্ মিশ্রিত তৈল (Carbolic-oil)। পচা কমিয়া যাইয়া বা কতক পরিমাণে পরিষ্কার হইলেই কার্বোলিক্-অয়েল্ ব্যবহার্য্য। ইহা দ্বারা ঘায়ের টাটানি বা চড়্‌চড়াণির অনেক উপশম হয় এবং ঘা শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া যায়। ঘা যেমন পরিষ্কার হইতে থাকে, কার্বোলিক্ লোশন বা কার্বোলিক্ অয়েলে কার্বোলিক্ আসিডের পরিমাণ

* মালিষের ঔষধেব জন্য জলপাইঘের তৈল বা অলিভ্ অয়েল্ই (Olive-oil) সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কমাইয়া দেওয়া উচিত, নতুবা উহা দ্বারা উপকার না হইয়া বা অধিক উত্তেজিত হয় এবং তদ্রূপ বা সহজে বা শীঘ্র শুকাইতে পারে না । বা পরিকার হইয়া আসিলে প্রতি আউন্স ওলিভ্ অয়েলে ৫ ফেঁটার অধিক কার্বো-লিক্ আসিড্ মিশান অমুচিত্ত। যে সকল পচা ঘায় কার্বো-লিক্ আসিড্ ব্যবহৃত হয়, সে সকল ঘায়ে ক্যালিপ্সুলাও ব্যবহার্য্য। ক্যালিপ্সুলার প্রয়োগ পশ্চাৎ লিখিত হইল। অসাবধানতা বশতঃ কার্বো-লিক্ আসিডের অতিরিক্ত প্রয়োগে রোগী বিষাক্ত হইয়া মস্তিষ্ক এবং অন্ত্রায় বস্ত্রের রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। এমতাবস্থায় ইহার প্রতিবেদক ঔষধ ব্যবস্থা।

নাইট্রিক্ আসিড্ (Nitric Acid)। পুরুষাঙ্গ বা যোনিদ্বারে গর-মীর ঘায়ে ইহার বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ৫ ফেঁটা আদত (Strong) নাইট্রিক্ আসিড্, ২ আউন্স চূয়ান জলে (Distilled Water) মিশাইয়া লোশন প্রস্তুত করিয়া আক্রান্ত স্থান বা ঘায়ে লাগাইবে। আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে, সজে সজে নাইট্রিক্ আসিডের উক্ত প্রকারে বাহ্য প্রয়োগ করিয়া গরমার ব্যারাম আক্রান্ত অনেক রোগীর চিকিৎসায় লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

ইক্ষু লাস্ হিপোক্যাস্টেনাম্ (Eseylus Hippocastanum)। ইহার বাহ্য প্রয়োগে অন্তর্কলী বিশিষ্ট অঙ্গ অর্শরোগে (Internal blind piles) বিশেষ উপকার দর্শে, অনেক রোগীর চিকিৎসায় ফল দেখিয়া লেখক একরূপ স্থির করিয়াছেন। ৫ ফেঁটা ইক্ষুলাসের মূল আরোক, ১ আউন্স ওলিভ্ অয়েলে মিশাইয়া, মলভ্যাগের পূর্বে ও উহার পর শুষ্ক ও শুষ্কবারে আঙ্গুল দ্বারা উক্ত মিশ্রিত তৈল লাগাইতে হয়। ইহা দ্বারাই, যতদূর রোগ অগ্রাম হওয়ার সম্ভাবনা, আরাম হইয়া থাকে। বাহ্য প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগও উপকারী। অর্শরোগে ইহার উপকারীতার বিষয় মূল গ্রন্থের ৩৬৬ পৃষ্ঠার “বাবহার” শীর্ষ দ্রষ্টব্য।

বেলাডোনা (Belladonna)। ইহার বাহ্য প্রয়োগে কোঁড়া বা প্রদাহযুক্ত স্থানের বেদনা টাটানির অনেক উপশম হইতে দেখা যায়। যে প্রকার বাতের অরূপ আক্রান্ত গ্রন্থি শুষ্ক ক্ষীণ ও লালবর্ণ হয়, তাহাতে বেলাডোনা মিশ্রিত তৈল বা গিনিমেণ্ট্ (Belladonna-oil of Belladonna)

Liniment) মালিস করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ফোঁড়া বা ত্রণের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান লালবর্ণ হইয়া অত্যন্ত টাটাইলে বেলাডোনার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক তুপি দ্বারা ফোঁড়া দ্বিতে লেপিয়া দিলে বেদন টাটানির অনেক উপশম হয়। ফোঁড়া দ্বিতে বেদনাদি নিবারণ ক্ষমতা অনেক চিকিৎসক বেলাডোনা প্লাষ্টারও (Emp. Bell.) লাগাইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যদিচ লেখক এই প্রকার প্লাষ্টার লাগাইবার পক্ষপাতী নহেন, তথাপি ইহার ঐকি প্রকারে ব্যবহারে যে অনেক সময় বিশেষ উপকার দর্শে তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি রোগী অত্যন্ত দুর্বল ও জীর্ণ জীর্ণ হয়, তবে এই প্রকার প্লাষ্টার ব্যবহারের দরুণ বেলাডোনা দ্বারা বিবাক্ত হইয়া মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ার ভয় অনেক গুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। অক্ল এবং বেলাডোনা প্লাষ্টার ব্যবহার সম্বন্ধে চিকিৎসকের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। হপিকফ, স্বরভঙ্গ বা স্বরশূন্যতা, কঠিন শুককাশি, প্রদাহযুক্ত গ্রন্থি, কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থি প্রদাহে ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক বা লিনিমেন্ট মালিস অত্যন্ত উপকারী।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা (Bryonia Alba)। ইহা বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সন্ধি-বাত রোগে বিশেষ উপকারী। ইহার লিনিমেন্ট বা ইহা মিশ্রিত তৈল প্রস্তুত করিয়া আক্রান্ত সন্ধিতে মালিস করিতে হয়।

ক্যালেন্ডুলা (Calendula)। ইহার ব্যবহার অনেকটা কার্ভো-লিক্‌ অসিডের ভায়। পচা ঘাঘের চিকিৎসার ইহার লোশন এবং তৈল বিশেষ উপকারী। ইহা কাটা ঘাঘের পক্ষেও বিশেষ উপকারী। ইহা কুট্টা ঘাঘের রক্তপ্রাণ এবং ঘাঘে পুঁথি হওয়া নিবারণ করে। প্রদাহযুক্ত বিকচের ঘাঘের (Eczematous inflammatory ulcers) চিকিৎসায় ইহার বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কোচ দ্বিহার রাক্ষের অধীনস্থ উচ্চ শ্রেণীস্থ কোন একটা কর্ণ চারির উক্ত প্রকারের একখানি ঘাঘের চিকিৎসায় লেখক আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন। উক্ত রোগীর চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ লণ্ডনস্থ, ইংরেজী ১৮৮৯ সনের অক্টোবর মাসের হোমিওপ্যাথিক ওয়ার্ল্ড (Homoeopathic World, for October 1889) নামক চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্রিকায় লেখক লিখিত যে প্রবন্ধ

প্রকাশিত হইয়াছে, সুবিধা হইলে পাঠক মহাশয়গণ উহা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। পচাবৃত্ত বা, বায়ের কেন্দ্র স্থান উন্নত এবং উহার চতুর্দিক নিম্ন ও উহার ধার উন্নত এবং আবড় বাবড় ইত্যাদি লেখকের মতে ক্যালেলুলা ব্যবহারের কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষণ। যে পর্য্যন্ত ঘার পচা থাকে, সে পর্য্যন্ত এই ঔষধের লোশন (Lotion) এবং পচা কাটিয়া বাঁড়িয়া বা পরিষ্কার হইয়া গেলে ক্যালেলুলা মিশ্রিত তৈল ব্যবহার্য। ছোট ব্রণ বা পৃষ্ঠাঘাতের চিকিৎসার ইহার বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই রোগে ক্যালেলুলা কার্বোলিক অসিড অপেক্ষাও অধিক উপকারী।

ক্যান্থারিস (Cantharis)। ইহার ২য় দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহার্য। আলোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীতে কোন স্থানে ফোঁড়া (Blister) পড়াগের অভিপ্রায়ে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আঙুলে পুড়িয়া গেলেও ফোঁড়া পড়ে। অতএব আঙুলে সামান্য রকমে পুড়িয়া যাইয়া পোড়া স্থানে ফোঁড়া পড়িলে ইহার লোশন বা তৈল ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে।

কার্বো-বেজিটেবিলিস (Carbo-Vegetabilis)। কাঠের কয়লার পচা নিবারণ করে এবং পচা দূরীভূত করে। অতএব পচা ঘার (ছোট ব্রণ বা পৃষ্ঠাঘাতে (Carbuncle) যেরূপ হইয়া থাকে) কাঠের কয়লার মিহি বা নির্মল গুঁড়া ময়দা বা তিসির সঙ্গে মিশাইয়া পুণ্ডিল লুগাইলে ঘরে পচা ধরিতে পারে না, উহাতে দুর্গন্ধ হইতে পারে না এবং বা শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া থাকে।

কক্টিকাম্ (Causticum)। ইহার ২য় দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহার্য। আঙুলে পুড়িয়া যাইয়া পোড়া স্থানে বক্রি গভীর রকমের বা হইয়া পুশী গুলিও আক্রান্ত হয় এবং পোড়া স্থানের নিকটবর্তী স্থান গুলিও আক্রান্ত হয়, তবে ইহার বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

হামামেলিস্ বার্জিনিকা (Hamamelis Virginica)। শিরার ক্ষীণতা, অণু কোষের শিরাদির প্রদাহে ইহার বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। ৫ ফোঁটা মূল আরোক, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া

১১০৪ বাহ্য প্রয়োগের ঔষধের ব্যবহার বিচার।

এই লোশনে স্থতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইয়া রাখিবে।

হাইড্রাস্টিস্ ক্যান্ডেন্সিস্ (*Hydrastis Can.*)। আব (Tumours), পচাযুক্ত ক্ষত, স্তনের প্রদাহ, ক্ষীতি এবং বিবৃদ্ধি, কৰ্কট রোগের প্রদাহ ও ক্ষীতিতে ইহা বিশেষ উপকারী। ৫ ফোঁটা মূল আরোক ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উহাতে একখানি স্থতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইয়া রাখিবে। স্তনের গ্রন্থি প্রদাহ এবং ক্ষীতিতে উক্ত প্রকারে প্রস্তুত করা লোশন লাগাইয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন। পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগে (Gleet), ৫ ফোঁটা মূল আরোক এক ছটাক পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উক্ত জল দ্বারা মূত্র নালীতে পিচ্কারী দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

লেডাম্ পেলাস্ট্রি (*Ledum Palustre*)। সন্ধিবাতে সন্ধি শুলি উষ্ণ ও ক্ষীতি হইলে, অথবা ক্ষুদ্র সন্ধিবাতে যদি পায়ের বুন্ধাঙ্গুলী আধক আক্রান্ত হয়, তবে এই ঔষধ মিশ্রিত তৈল মালিসে বিশেষ উপকার দর্শে। পা এবং পায়ের পাতার ক্ষীতি এবং কীটাদির কামড়ের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারী।

মার্কিউরিয়াস্ বিনায়োডাইড্ (*Mercurius Biniodide*)। ইহার মলম প্রস্তুত করিয়া প্ৰীহাতে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। এগ্রেইণ্ বিনায়োডাইড্ অব্ মার্কিউরি এক ছটাক শুকরের পরিষ্কৃত চৰ্কিতে বথানিয়মে মিশাইয়া প্ৰীহার উপর মালিস করিবে।

ফাইটোলাকা ডিকান্ড্রা (*Phytolacca Decandra*)। গলার মধ্যে অস্থখ, ডিপথিরিয়ায় ত্রায় গলার মধ্যে শিথিলতায় ইহার মূল আরোক ১৫ হইতে ২০ ফোঁটা, ১ এক ছটাক জলে মিশাইয়া এই প্রকারে ঔষধ মিশ্রিত জল দ্বারা কুলী (Gargle) করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

রাস্ টক্সিকোডেন্ড্রন (*Rhus Toxicodendron*)। বাতরোগে যদি পেশী ও পেশীর কঠিন অগ্রভাগ (Tendons) আক্রমণ করে, সন্ধিবাতে এবং কোমরে বাতের বেদনার (Lumbago) এই ঔষধ মিশ্রিত তৈল মালিসে বিশেষ উপকার দর্শে। আঘাত লাগিয়া যদি পেশী, পেশীর কঠিন অগ্রভাগ,

অস্থি সন্ধির আবরক কঠিন পর্দা (Ligaments) এবং অস্থি ও উপাস্থির আবরক কঠিন পর্দা আত্মভাবিকরূপে বিস্তৃত হয় বা মোচড়াইয়া পড়ে এবং তদ্রূপ যদি আঘাত প্রাপ্ত স্থান বা উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে বেদনাদি অনুভূত হয়, তবে ইহা মালিস করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। তরুণ আকারের বেদনাদিতে যেমন আণিকা দ্বারা উপকার দর্শে, আঘাত প্রাপ্ত স্থানের অনেক দিন পর আক্রান্ত স্থানে বেদনা হইলে রাস্টল্‌ দ্বারাও সেরূপ উপকার দর্শে।

রুটা গ্রাবিয়োলেন্স (Ruta Graveolens)। আঘাত লাগিয়া হাত পায়ের পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থির সন্ধির অস্থ্য বা উহার বাতাক্রান্ত পক্ষাঘাতে রুটা বিশেষ উপকারী। আঘাত লাগিয়া অস্থির সন্ধি অচল (Anchylosed) হইলে ইহার বাহ ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহার মিশ্রিত তৈল বা লিনিমেন্ট এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগও ব্যবস্থা।

সিম্ফাইটাম্ (Symphitum)। ইহা ব্যবহারে ভাঙ্গা হাড় জুড়িয়া যায় এই বিশ্বাসে পূর্বকালের লোকেরা ইহা ব্যবহার করিতেন। ইদানিস্থানও হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে এই ঔষধের বাহু প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়। ইহার মিশ্রিত তৈল বা লিনিমেন্ট ব্যবহার্য। বাহু প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ইহার ঝর বা ঝর ডাইলুশন সেব্য।

সাল্‌ফার বা গন্ধক (Sulphur)। খোস পাচড়ার সাল্‌ফারের মূল আরোক মিশ্রিত অলিভ্‌ অয়েল্‌ বা সাল্‌ফার মিশ্রিত লিনিমেন্ট অথবা গন্ধকের মিহি গুঁড়া মাখন বা নারিকেল তৈলে মিশাইয়া পাচড়ার লাগাইলে উপকার দর্শে। এক আউন্স্‌ ওলিভ্‌ অয়েল্‌ বা লিনিমেন্টে ১০ ফেঁটা হইতে ১ ড্রামও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ২ কাঁচা মাখন বা নারিকেল তৈলে ১০ হইতে ২০ গ্রেইন্‌ গন্ধকের মিহি গুঁড়া মিশাইয়া ব্যবহার্য।

থুজা অক্সিডেন্টেলিস (Thuja Occidentalis)। ইহার মূল আরোক আঁচিলে লাগাইলে আঁচিল সারিয়া যায়। অনেক সময় মৈত্রিক্‌ আঁবি বা ফেঁটকে (Condylomata or mucous tubercles) ইহার মূল আরোকের ১০ ফেঁটা, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইলে উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

১১০৬ বাহু প্রয়োগের ঔষধের ব্যবহার বিচার।

আটিকা ইউরেন্স্ (*Urtica Urens*)। মোমাহি, বোল্ডা (ঝন্টা), পিপড়া, মশা, ডাঁস ইত্যাদি কামড়াইলে ইহার মূল আরোকের ৫ হইতে ১০ ফোঁটা, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া কামড়ের স্থানে লাগাইলে অনেক উপকার দর্শে। আঙুণে পুড়িয়া পোড়া স্থানে ফোঁকা না পড়িয়া যদি উক্ত স্থান লালবর্ণ ও বেদনায়ুক্ত হয়, তবে উহাতে উক্ত পরিমাণে লোশন প্রস্তুত করিয়া বা ২ কাঁচা খাঁটি তিলের তৈলে ৫ হইতে ২০ ফোঁটা মূল আরোক মিশাইয়া পোড়া স্থানে লেপিয়া দিলে উপকার দর্শে। এতদ্ভিন্ন চিলব্লেইন্ (*Chilblain*) নামক অল্পখে আটিকা মিশ্রিত তিলের তৈল লাগাইলেও বিশেষ উপকার পাইতে দেখা যায়।

বিরেট্রাম্ বিরাইড্ (*Veratrum Viride*)। বিদর্প বা ইরিসিপেলাসে (*Erysipelas*) এবং বদন্ত রোগে ইহার বাহু প্রয়োগ বিশেষ উপকারী। ৫ হইতে ২০ ফোঁটা মূল আরোক, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া আক্রান্ত স্থান ধোয়াইয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বদন্ত রোগে আক্রান্ত স্থান গুলিতে চুনকান্নি এবং চড়্‌চড়াণি থাকিলে বিরেট্রাম্ বিরাইডের মূল আরোক ৫ হইতে ২০ ফোঁটা তিলের তৈলে মিশাইয়া তুলি দ্বারা লেপিয়া দিলে উক্ত উপজ্বরের অনেক উপশম হইতে দেখা যায়।

বোরাক্স্ (সোহাগ্) (*Borax*)। মুখের মধ্যে বা হইলে সোহাগার থৈ করিয়া উহার ২১১ গ্রেইন ৫১০ ফোঁটা মধুর সঙ্গে মিশাইয়া মুখে লাগাইয়া দিবে। এই প্রকারের মুখে ঘার সোহাগার থৈ ও মধুর বাহু প্রয়োগের উপকারীতা এতদ্দেশে জীলোকেরাও জানেন।

বাহু প্রয়োগের জন্ত নিম্ন লিখিত আকারে মালিসের ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা, (১) গ্লিসিরোল্ (*Glycerol*) ; (২) মলম বা অণ্টিমেন্ট্ (*Ointments*) ; (৩) লিনিমেন্ট্ (*Liniments*) ; (৪) লোশন্ (*Lotions*) ; (৫) ওপোডেলডক্স্ (*Opodeldocs*) ; (৬) সিরেট্ (*Serates*) ; (৭) পিচ-কার্বী দেওয়ার উপযোগী ঔষধ বা দ্রব্য (*Injections*)। মালিসের এই সকল ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্ত যে সকল দ্রব্যাদি প্রয়োজন, তাহার নাম নিম্নে লিখিত হইল। যথা:—

(১) শুকরের পরিষ্কৃত চর্বি বা এডেপ্ প্রিপেরেটাস্ (*Adeps Præ-*

paratus,-Prepared Lard) ; (২) গোধূম নির্মিত ময়দাদি বা ষ্টার্চ (Amylum,-Starch) ; (৩) স্নিগ্ধ আলবা বা সাদা মোম (Cera Alba,-White Wax) ; (৪) স্টিটেসিয়ারাম্,-স্পার্মেসিটাই (Cetaceum,-Spermaceti) ; (৫) গ্লিসেরিন্ (Glycerine) ; (৬) ওলিয়ারাম্ আমিগডালী,-আমোণ্ড্ অয়েল্ বা বাদামের তৈল (Oleum Amygdalæ,-Almond-oil) ; (৭) ওলিব্ অয়েল্ বা জলপাইয়ের তৈল (Oleum Olive,-Olive oil) ; (৮) রেক্টিফাইড্ ও প্রুফ্ স্পিরিট্ (Rectified and Proof spirits) ; (৯) স্ত্রাপো আনিমেলিন্ বা কার্ড্ সোপ্ (Sapo Animalis,-Curd Soap) ; (১০) স্ত্রাপো ডুরাস্ বা হার্ড্ সোপ্ (Sapo Durus,-Hard Soap) ; (১১) স্ত্রাপো মোলিস্ বা সফ্ট্ সোপ্ (Sapo Mollis,-Soft Soap) ; (১২) চূরান জল (Distilled Water) । এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করা বী ক্রয় করা সকল সময়ে সুবিধা জনক নহে। অতএব উক্ত দ্রব্যাদি কোন একক বিবস্ত্র উৎসাহনয় হইতে ক্রয় করিয়া রাখা উচিত ।

(১) গ্লিসিরোল্ (Glycerole) : যে ঔষধের গ্লিসিরোল্ প্রয়োজন, সেই ঔষধের যথা পরিমাণ মিশ্রিত গ্লিসেরিন্কে সেই ঔষধের গ্লিসিরোল্ বলে। যথা, গ্লিসেরিনের সঙ্গে যথাপরিমাণ আর্নিকার মূল আরোক মিশাইলে উক্ত মিশ্রিত গ্লিসেরিন্কে গ্লিসিরোল্ অব্ আর্নিকা (Glycerole of Arnica) বলে। ইহা আলকোহল্ (Alcohol) এবং জলে সহজে দ্রব হয় বলিয়া ইহা বিগলিত করিয়া ইহা দ্বারা লিনিমেন্ট্ (Liniments), লোশন্স্ (Lotions) এবং পিচ্কারী (Injections) দেওয়ার ঔষধ সহজে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ঔষধের মূল আরোকের ৫ হইতে ৩০ ফোঁটা এবং কখন কখন ১ ড্রামও রোগের ক্রমস্থানুসারে ২ কাঁচা গ্লিসেরিনের সঙ্গে মিশ্রিত করা যাইতে পারে। মূল আরোকের পরিমাণ সৰ্ব্বদা চিকিৎসকের বিশেষ বিবেচনা করা উচিত, কারণ, যে রোগে ঔষধের মাত্রা কম হওয়া উচিত, তাহাতে মাত্রা অধিক হইলে উপকার না হইয়া অপকার হওয়ার সম্ভাবনা এবং যে রোগে ঔষধের মাত্রা অধিক হওয়া উচিত তাহাতে মাত্রা কম হইলে উহা দ্বারা কোনও উপকার দর্শে না। আর্নিকা, রাস্টক্, আর্টিকা, ক্যাছারাইডিস্, কটিকাস্,

১১০৮ মালিসের ঔষধ প্রস্তুতের নিয়মাবলী।

মার্কারি ইত্যাদির বাহ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে চিকিৎসকের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

(২) মলম বা অয়েন্টমেন্ট (Ointment)। মলম অনেক রকমে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা,-(১) কেবল শূকরের চর্বি দ্বারাও প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু এই প্রকারে প্রস্তুত করা মলম শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া বাইরা উহাতে বিক্রী উগ্র গন্ধ হয়। শূকরের পরিষ্কৃত চর্বি ২ কঁাডার, ৫ হইয়া ৩০ ফোঁটা (অর্থাৎ চিকিৎসক যে পরিমাণ দিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন) প্রয়োজনীয় ঔষধ মিশাইয়া এক খানি খলে লইয়া ভালরূপে ঘুঁটিলে মলম প্রস্তুত হয়। যে ঔষধের মলম প্রয়োজন শূকরের চর্বিতে সেই ঔষধই মিশাইতে হয়। যথা, যদি কেহ আর্নিকার মলম ব্যবস্থা করেন, তবে শূকরের পরিষ্কৃত চর্বিতে যথা পরিমাণ আর্নিকার মূল আরোক মিশাইতে হয়। প্রয়োজনীয় ঔষধ যে পরিমাণ ব্যবহার করা উচিত তাহা চিকিৎসককে বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিয়া উচিত। (২) আঙ্গুয়েন্টাম্ সিটেনিয়াই (Unguentum Cetaei)। স্পার্মেটি (Spermaceti) ৫ আউন্স, সাদা মোম (White wax) ২ আউন্স, এবং আমোন্ড অয়েল বা বাদামের তৈল (Almond oil) এক পাইন্ট কোন এক পাত্রে একত্রে মিশাইয়া পাত্রটি স্পিট্‌ লাম্পের উপর ধরিয়া জ্বাল দিয়া ফুটাইয়া গালাইবে। উক্ত প্রযুক্তি গলিয়া গেলে ঐ পাত্রটি আগুনের তাত হইতে সরাইয়া একখানি পরিষ্কার কাঠের কাটি দিয়া বারম্বার ঘাঁটিবে যে পর্যন্ত ঠাণ্ডা না হয়। (৩) সিরেটাম্ সিম্প্লেক্স, -সিম্পেল্‌ সিরেটাম্ (Ceratum Simplex, -Simple Cerates)। যদি গাঢ় বা কঠিন মলম বা সিরেট প্রয়োজন হয়, তবে স্পার্মেটি (Spermaceti) ৩ আউন্স, সাদা মোম (White wax) ৩ আউন্স, ওলিভ অয়েল (Olive oil) ১৪ আউন্স একটা পাত্রে লইয়া পাত্রটি ফুটন্ত গরম জলের উপর বসাইয়া বারম্বার তৈল ঝাঁটিয়া দিবে এবং মোমাদি গলিয়া গিয়া কতক ঠাণ্ডা হইলে যে ঔষধের মলম প্রয়োজন সেই ঔষধ ক্রমে ক্রমে মোমাদি মিশ্রিত। তৈলে মিশাইয়া সজোরে বারম্বার ঘাঁটিবে যে পর্যন্ত ঠাণ্ডা না হয়। (৪) আঙ্গুয়েন্টাম্ সিম্প্লেক্স বা সিম্পেল্‌ অয়েন্টমেন্ট (Unguentum Simplex, -Simple Ointment)। সাদা মোম (White wax

২ আউন্স, শূকরের পরিষ্কৃত চর্বি (Prepared lard) ৩ আউন্স, আর্থোপ.
অয়েল্ বা বাদামের তৈল (Almond oil) ৩ আউন্স, কোন' একটা পাত্রে
একত্র কুরিয়া পাত্ৰটি ফুটন্ত গরম জলের উপর রাখিবে এবং উক্ত উপায়ে
মামাদি ভালরূপে গলিয়া গেলে পাত্ৰটি গরম জলের উপর হইতে সরাইয়া
বারম্বার সজোরে ঘাটিবে যে পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা না হয়। (৫) গ্লিসেরিনাম্
গামিলাই (Glycerinum Amyli)। ইহা গ্লিসেরিন্ অব্‌ ষ্টার্চে (Glycerine
starch) প্রস্তুত হইয়া থাকে। গোধূমের ময়দা (Strach) ১ আউন্স,
গ্লিসেরিন্ (Glycerine) ৮ আউন্স, একত্রে লইয়া সজোরে বারম্বার ঘাটিবে যে
পর্য্যন্ত উক্ত দুই পদার্থ ভালরূপে মিশ্রিত না হয়। এই প্রকার ময়দা মিশ্রিত
গ্লিসেরিন্ একখানি চিনের থালায় লইয়া উহা ক্রমে ক্রমে ২৪০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত
উত্তাপে তাতাইবে এবং বারম্বার সজোরে ঘাটিবে যে পর্য্যন্ত ময়দার কণা
গুলি গলিয়া আঠা বাঁজিয়া পোঁদের স্তায় না হয়। এই প্রকারের মলমে
প্রয়োজনীয় ঔষধের ১ ভাগ ৯ ভাগ মলমে, ১ ড্রাম ঔষধ হইলে
উহাতে ৯ ড্রাম মলম মিশাইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩) লিনিমেন্টা বা লিনিমেন্ট (Linimenta, Liniment)।
ঔষধ মিশ্রিত ওলিভ্ অয়েল্কেই সফ্টসোপ লিনিমেন্ট বলা যায়। যথা ওলিভ্
অয়েলে যথা পরিমাণ আর্গিকার মূল আরোক মিশাইলে উক্ত মিশ্রিত তৈলকে
আর্গিকা লিনিমেন্ট বলা যাইতে পারে। আবার অনেক সময় সফ্ট সোপ্
(Soft soap) ৬০ আউন্স, ফ্রক্ স্পিরিট্ ২৪ আউন্স (অথবা এই পরিমাণে)
কেতন একটা পাত্রে লইয়া স্পিরিট্ সল্যাম্পের উপর পাত্ৰটি ধরিয়া ফ্রক্
স্পিরিটে সফ্ট সোপ্ গালাইবে। যে ঔষধ লিনিমেন্ট প্রয়োজন হইবে
সেই ঔষধের ১ ভাগ ৯ ভাগ উক্ত প্রকারে সফ্ট সোপ্ মিশ্রিত ফ্রক্ স্পি
(১ ড্রাম প্রয়োজনীয় ঔষধের মূল আরোক ৯ ড্রাম সফ্ট সোপ্ মিশ্রিত
ফ্রক্ স্পিরিট্ বা এই পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লিনিমেন্ট প্রস্তুত করিবে।

(৪) লোশন্স্ (Lotions)। (১) যে ঔষধের লোশন প্রয়োজন
সেই ঔষধের মূল আরোকের ১ ভাগ ৯ ভাগ চূয়ান জলে (১ ড্রাম মূল
আরোক, ৯ ড্রাম চূয়ান জল এই পরিমাণে) মিশাইয়া লোশন প্রস্তুত করিতে
হয়। যথা আর্গিকার দশমিক পরিমাণের লোশন কেঁচ চাহিলে আর্গিকার মূল

১১১• মালিসের ঔষধ প্রস্তুতের নিয়মাবলী ।

আরোক ১ ড্রাম, ৯ ড্রাম চূরান জলে মিশাইয়া দিতে হয়। প্রয়োজনীয় ঔষধের মূল আরোক ১ ভাগ, ৯৯ ভাগ চূরান জলে মিশাইয়া শতভাগ পরিমাণের লোশন প্রস্তুত করিতে হয়। এতদ্বিরোগের অবস্থায় ঔষধের মাত্রা অধিক বা কমও করা যাইতে পারে। (২) যে ঔষধের লোশন প্রয়োজন সেই ঔষধ মিশ্রিত গ্লিসেরিন (Glycerole) যত পরিমাণ উইহার ৪ হইতে ৯ ভাগ পরিমাণ চূরান জলে মিশাইয়াও লোশন প্রস্তুত হইতে থাকে। (৩) ১ ভাগ ঔষধের মূল আরোক, ৯৯ ভাগ ডাইলুট স্পিরিট মিশাইয়াও লোশন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(৫) ওপোডেল্ডক্স (Opodeldocs)। সাদা কার্ড সোপ (White curd soap) ৪৫ আউন্স, রেকটিকাইড স্পিরিট ১৫ আউন্স, চূরান জল ৯ আউন্স দ্বারা এই প্রকারের মালিসের ঔষধ প্রস্তুত হয়। স্পিরিট ল্যাপ্পার মুহ উত্তাপ দ্বারা চূরান জল কার্ড সোপ গলাইয়া উহাতে ক্রমে ক্রমে রেকটিকাইড স্পিরিট এবং ঔষধের ওপোডেল্ডক্স প্রয়োজন সেই ঔষধের মূল আরোক যথা পরিমাণে মিশাইতে হয়। সচরাচর ১ ভাগ মূল আরোক, ৯ ভাগ ওপোডেল্ডক্স (এই পরিমাণেই) মিশাইতে হয়। আর্বিকা এবং রাস-টক্স এই দুই ঔষধের ওপোডেল্ডক্সই সচরাচর অধিক প্রস্তুত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৬) সিরেট্‌স্ (Cerates)। ইহাও এক প্রকারের মলম বিশেষ ইহার প্রস্তুতের নিয়মাদি ১১০৮ পৃষ্ঠায় মলমের শীর্ষে দ্রষ্টব্য।

(৭) পিচকারী দেওয়ার উপযোগী ঔষধ (Injections)। ঔষধ দ্বারা দিয়া পিচকারী দেওয়া সম্বন্ধে পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। জীলো-কোষোনি দ্বারা এবং মূত্রনালী ও পুরুষের মূত্রনালী দিয়া পিচকারী দেওয়ার বিবরণই এই শীর্ষে লিখিত হইতেছে। যে ঔষধ দ্বারা পিচকারী দিতে হইবে তাহার অর্দ্ধ আউন্স, গ্লিসেরিন ১৫ আউন্স, চূরান জল ২ আউন্স এই পরিমাণে মিশ্রিত ঔষধ দ্বারা জীলোকের ষোনি দ্বারা দিয়া পিচকারী দেওয়ার জন্য ডাক্তার লাড্‌লান্ (Dr. Ludlam) ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এইপ্রকারে মিশ্রিত ঔষধের চা খাওয়ার এক চাম্‌চ পরিমাণ ঔষধ কতক পরিমাণ (৯ পাইন্ট হইলে ভাল হয়) কুহ্ম কুহ্ম গরম জলে মিশাইয়া

প্রযোজ্য। কেবল হাইড্রাস্টিসের কাত (Infusion of Hydrastis) ব্যতীত সমুদয় ঔষধেরই ১ আউন্স, এক পাইন্ট জলে মিশাইয়া সূত্রনালী দিয়া পিচ-কারী দেওয়া যাইতে পারে।

রোগ প্রবণ আকার ধারণ করিলে ব্যবস্থা পত্র দ্বারা কোন ঔষধালয় হইতে ঔষধ আনাইয়া রোগীকে ঔষধ সেবন করাইতে যে কাল বিলম্ব হয়, উহার মধ্যেই রোগ সংক্রান্তিক আকার ধারণ করায়দকণ রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে। অবিলম্বে অনেক সময় এমন ঔষধালয় নিকটে পাওয়া যায় যাহার প্রস্তুত করা ঔষধের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। এমনত-
হার্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেরই আভ্যন্তরিক এবং বাহ্য প্রয়ো-
গের উপযোগী নিম্ন লিখিত অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ গুলি সহ একটা মেহগুনী
কাঠের বাক্স সঙ্গে করিয়া রোগীকে দেখিতে যাওয়া উচিত।

ঔষধের নাম	ডাইলুশন	ঔষধের নাম	ডাইলুশন
হাইড্রে সায়েনিক আসিড্	৩, ৬	চায়না	১, ৩, ৬, ১২, ৩০, ২০০
মেরিয়ারটিক আসিড্	১, ৩, ৬	সিনা	১, ৩, ৩০, ২০০
হাইট্রিক আসিড্	১, ৩, ৬, ১২, ৩০, ২০০	ককিউলাম-ইণ্ড	৬
ফরিক আসিড্	১, ৩, ৬, ১২, ৩০, ২০০	কফিয়	৩, ৬, ৩০
কোনাইট্ রাডিক্স্	৩, ১, ৩, ৬	কলিকাম্	৩, ৩, ৬, ৩০
পলিটমোনিয়াম্-টাট্	৩, ৬, ১২	কলোসিস্	৩, ৬, ৩০, ২০০
পলিটমোনিয়াম্-ক্লড্	৬	কুক্রাম্ মেটেলিকাম্ ও ক্রমের গুঁড়া,	
প্লুস্ মেলিকিকা	৩, ৬, ৩০	এবং	৬, ১২, ৩০ ডাঃ
ফা মণ্টেরা	৩, ৩, ৬, ৩০, ২০০	ডিজিটালিস্	১, ৩, ৬
ফনিকাম্ আৰাম্	৩, ১২, ৩০, ২০০	ডু সিরি	৩, ১, ৩
ফিস্টিয়া	৩, ১, ৩	ডাল কেমেরা	৬, ৩০
গোডোনা	৩, ৬, ১২, ৩০, ২০০	ইউপেটোরিয়াম্ পার্কোলিয়েটাম্	১, ৩
ইওনিয়া আৰ্জা	৩, ৬, ১২, ৩০	ফেরাম্ মেটেলিকাম্ ও ক্রমের গুঁড়া,	
গ্যাকেরিয়া-কার্ক	৬, ১২, ৩০, ২০০	এবং	৬ ডাঃ
গ্যাবিস্-স্টাট্	৩, ১, ৩, ৩০, ২০০	জেল সিমিয়াম্	৩, ১, ৩, ২০০
গ্যাবিস্	৩, ৬, ৩০, ২০০	গ্রাফাইটিস্	৬, ৩০
গ্যাবিস্-জিটেবিলিস্	৬, ১২, ৩০, ২০০	হামামেলিস্ বার্জিনিকা	১, ৩, ৬
গ্যামোনিয়া	৬, ১২, ৩০	হিপার সাং ফিউরিস্ ও ক্রমের গুঁড়া,	
গুটা বিয়োনা	৬, ১২, ৩০, ২০০	এবং	১, ১২, ৩০ ডাঃ
মিসিকিউগা রেসিমোয়া	৩, ৬, ১২, ৩০	হাইড্রাস্টিস্	১, ৩, ৬, ৩০

ঔষধের নাম	ডাইলুশন	ঔষধের নাম	ডাইলুশন
ইগ্‌নেসিয়া	৩, ৬, ১২, ৩০, ২০০	পাল সেটিল	১২, ৩০, ২০০
আয়োডিন	৩, ৬, ১২, ৩০	রাস্টক্স	৩, ৬, ১২, ৩০
ইপিকাকিউএনা	৩, ৬, ১২, ৩০	গ্লাবাইনা	৩, ৬, ১২, ৩০
আইরিস্ বাসিকালার	৩, ৬	সিকেল্ কর্ণুটাম্	৩, ৬, ৩০, ২০০
ক্যালী বাইক্রেমিকাম্	৩, ৬, ১২, ৩০	সিপিগ্ল	৬, ১২, ৩০, ২০০
ল্যাকেসিস্	৬, ১২, ৩০	সাইলিসিয়া	৬, ১২, ৩০
লাইকোপডিয়াম্	৬, ১২, ৩০, ২০০	স্পাইজেলিয়া	৬, ১২, ৩০
মার্কিউরিয়াস্ ক্রোসাইবাস্	৩, ৬, ৩০, ২০০	স্পঞ্জিয়া ৩ ক্রমের গুঁড়া এবং	৩, ৬, ৩০, ২০০
ঐ সল্ ৩ ক্রমের গুঁড়া,		ষ্টাফিসেগ্রিয়া	
এবং ৬, ১২, ৩০, ২০০ ডাঃ		সাল্ ফার	৩, ৬, ১২, ৩০, ২০০
ঐ বিনায়োডাইড্		টিরিবিস্থিনা	৩, ৬, ৩০
৩ ক্রমের গুঁড়া, এবং ৬, ১২, ৩০ ডাঃ		টিউক্রিয়াম্	৩, ৬, ৩০
নাল্ বমিকা	৬, ১২, ৩০, ২০০	থুজা	৬, ১২, ৩০, ২০০
ওপিয়াম্	৬, ১২, ৩০, ২০০	বিরেটাম্ আল্ বাম্	৬, ১২, ৩০
ফক্সাস্	৩, ৬, ১২, ৩০, ২০০	বিরেটাম্ বিরাইড্	১, ৩, ৬
পডোফিলাম্	৩, ৬, ১২, ৩০	ক্লোরাম্ মিটেলিকাম্	৬, ১২, ৩০

বাহ্য প্রয়োগের জন্ত মূল আরোক এবং ডাইলুশন।

আর্গিকা মণ্টেনী	৩	কষ্টিকাম্	২ ডাইলুশন
একোনাইট্ নেপেলস্	৩	ক্যাস্টোরিস্	২ ঐ
ক্যালেলুলা অফিসিনেলিস্	৩	থুজা	
রাস্টক্সিকোডেণ্ডন	৩	বিরেটাম্ রিরাইড্	
হামামেলিস্ বাজিলিকা	৩	সিম্ফাইটাম্	
হাইড্রাস্টিস্ ক্যানিডেন্সিস্	৩	বেলাডোনা	
লেডাম্ পেলাট্রী	৩	নাইট্রিক্ অ্যাসিড্	(আদত)
স্যাটিকা ইউরেন্স্	৩	কার্বোলিক্ অ্যাসিড্	(আদত)
কটী	৩	বেলিস্ পেয়েনিস্	